



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

593

K7

EXCHANGE
EP 23 1913



С. Кравковъ.

UC-NRLF



QB 75 381

ИЗСЛѢДОВАНІЯ

ВЪ ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНІЯ РОЛИ

МЕРТВАГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА


ВЪ ПОЧВООБРАЗОВАНИИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1911.

EXCHANGE



EX LIBRIS

С. Кравковъ.

Кравков
"

ИЗСЛѢДОВАНІЯ

ВЪ ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНІЯ РОЛИ

МЕРТВАГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

ВЪ ПОЧВООБРАЗОВАНИИ.

ИЗДАНО ПО
ПРЕДЪПРИЯТИЮ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28.

1911.

S 593

K7



EXCHANGE

70. 1780
1780. 1780

По опредѣленію Физико-Математическаго Факультета Императорскаго
С.-Петербургскаго Университета печатать разрѣшается.

Деканъ Профессоръ *В. Шимкевичъ*.

Оглавление.

Предисловіе	СТРАН. V—IX
ГЛАВА I. О водных свойствах мертвых растительных остатков	1
<p>Влагоемкость различных растительных остатковъ. (Работы Krutsch'a, Heiden'a, Ebermayer'a, Wollny, Riegler'a и др.). Изслѣдованіе на влагоемкость образцовъ лѣсной подстилки изъ различныхъ кварталовъ Велико-Анадольскаго лѣса, Екатеринославской губ. Вліяніе состава насажденія и возраста его. Количество накапливающейся подстилки въ различныхъ кварталахъ Велико-Анадольскаго лѣса. Роль лѣсной подстилки лиственныхъ лѣсовъ въ процессахъ увлажненія почвы. Лѣсная подстилка изъ подъ хвойныхъ насажденій. Влагоемкость ея. Роль этой подстилки въ процессахъ увлажненія почвы подъ хвойными лѣсами. „Степной войлокъ“. Влагоемкость его. Роль „войлока“ въ процессахъ увлажненія степныхъ почвъ.</p> <p>Водопроводимость лѣсныхъ подстилокъ изъ подъ лиственныхъ и хвойныхъ насажденій. Водопроводимость „степного войлока“.</p> <p>Испаряемость всѣхъ этихъ объектовъ.</p> <p>Капиллярныя свойства ихъ.—Общія соображенія.</p>	
ГЛАВА II. Растительные остатки, какъ источникъ перегнойныхъ соединений въ почвѣ	66
<p>Процессы образованія и накопленія въ почвѣ перегнойныхъ веществъ. Работы Рупрехта, Костычева, Заломанова, Докучаева и др. Изученіе растворимыхъ въ водѣ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, какъ главнаго и непосредственнаго источника гумусообразованія. Работы въ этой области Леваковского, Норре—Seuier'a, Слезкина и Кравкова. Процессы отщепленія изъ свѣжихъ и разлагающихся растительныхъ объектовъ водно-растворимыхъ органическихъ соединений. Вліяніе на эти процессы различныхъ комбинацій t° и увлажненія (опыты съ березовыми листьями, со степнымъ сѣномъ и хвоей ели). Ближайшее изслѣдованіе химиче-</p>	

скаго состава и свойствъ водныхъ вытяжекъ изъ разлагающихся, при различныхъ вѣшнихъ условіяхъ, растительныхъ матеріаловъ (опыты съ клевернымъ сѣномъ). Кислотность этихъ вытяжекъ. Содержаніе въ послѣднихъ гуминовой, креновой и апокреновой кислотъ. Анализъ азотистыхъ соединений. Опытъ съ поглощеніемъ и закрѣпленіемъ растворимыхъ органическихъ соединений, извлекаемыхъ изъ растительныхъ остатковъ, различными типами почвъ. Попытки искусственно вызвать „реградационныя“ явленія въ различныхъ генетическихъ типахъ почвъ.

ГЛАВА III. Растительные остатки, какъ источникъ въ почвѣ воднорастворимыхъ соединений вольнаго характера. 171

Вліяніе различныхъ t° на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ (опыты съ листьями клена). Спеціальныя опыты съ очень высокой и очень низкой t° (опыты съ березовыми листьями). Вліяніе на процессы отщепленія водно-растворимыхъ минеральныхъ соединений — попеременнаго замораживанія и оттаиванія разлагающихся растительныхъ остатковъ. Вліяніе различной степени увлажненія на процессы минерализаціи (опыты съ листьями клена). Вліяніе на эти процессы хлороформа (опыты съ клевернымъ сѣномъ). Вліяніе различныхъ сочетаній t° и влажности на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ (опыты съ березовыми листьями и со степнымъ сѣномъ).

ГЛАВА IV. Растительные остатки, какъ источникъ деградационныхъ явленій въ почвѣ. 225

Литература этого вопроса. Вліяніе химическаго состава растительныхъ остатковъ на процессы деградациі (опыты съ листьями дуба и суглинистымъ черноземомъ). Процессы оподзоливанія поверхностныхъ горизонтовъ у суглинистыхъ и супесчаныхъ почвъ. О процессахъ деградациі въ различныхъ типахъ почвъ (опыты съ суглинистымъ черноземомъ, съ деградированнымъ черноземомъ, съ сѣрымъ лѣснымъ суглинкомъ и съ подзолистой суглино-супесью).

Выводы 266

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Различные растительные остатки, въ видѣ отмирающихъ ежегодно листьевъ, стеблей, корней и пр., попадающіе на поверхность почвы и въ верхніе горизонты ея, должны быть признаны однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ почво-образованія—въ силу того, что объекты эти принимаютъ самое близкое и непосредственное участіе во всѣхъ физическихъ и химико-біологическихъ процессахъ, совершающихся въ почвѣ. Дѣйствительно, скопляясь часто на дневной поверхности послѣдней въ видѣ мертвого растительнаго покрова, и являясь, такимъ образомъ, какъ бы посредствующимъ звеномъ между верхними горизонтами почвы—съ одной стороны, и атмосферой—съ другой, объекты эти не могутъ, конечно, не играть, прежде всего, весьма важной роли въ явленіяхъ физическаго характера, происходящихъ въ почвѣ: процессы распредѣленія въ послѣдней влаги, тепла, степень проницаемости ея для воздуха и пр.,—все это такія явленія, которыя находятся въ непосредственной связи съ количествомъ и характеромъ накапливающейся растительной массы. Комбинація же всѣхъ упомянутыхъ физическихъ явленій не можетъ, въ свою очередь, не отражаться и на ходѣ цѣлаго ряда химическихъ, а тѣмъ болѣе—біологическихъ процессовъ, совершающихся въ почвѣ.

Несравненно однако существеннѣй и разнообразнѣй рисуется намъ непосредственное участіе мертвыхъ растительныхъ остатковъ въ химизмъ почвы: процессы разложенія ихъ съ выдѣленіемъ такихъ энергичныхъ агентовъ вывѣтриванія, какъ CO_2 и цѣлый рядъ другихъ органическихъ и минеральныхъ кислотъ, отщепленіе различныхъ зольныхъ соединений при процессахъ минерализаціи растительныхъ остатковъ, вымываніе всѣхъ этихъ продуктовъ въ почву, рядъ сложнѣйшихъ реакцій обмѣна, происходящихъ въ этой послѣдней при упомянутыхъ „иллювіальныхъ“ явленіяхъ, процессы растворенія этими продуктами составныхъ частей почвы, или, наоборотъ, закрѣпленія послѣдней части притекающихъ растворовъ, и пр. и пр.,—все это такіе процессы, которые часто могутъ послужить исходной причиной даже полного метаморфоза данной почвенной единицы, какъ опредѣленнаго типа.

Едва-ли имѣется необходимость указывать, наконецъ, на ту роль, которую играютъ отмирающіе растительные остатки въ біологическихъ процессахъ, совершающихся въ почвѣ. Достаточно только указать на то, что присутствіе разлагающейся органической массы въ почвѣ представляетъ собой наилучшую арену для развитія микроскопической флоры,—чтобы представить, въ какомъ широкомъ масштабѣ должны происходить при этомъ въ поверхностныхъ горизонтахъ почвы разнообразные процессы гніенія, броженія, разложенія и т. п., вызываемые жизнедѣятельностью микроорганизмовъ.

Ближайшее изученіе всѣхъ упомянутыхъ выше физическихъ и химико біологическихъ процессовъ, происходящихъ въ почвѣ, — при непосредственномъ и ближайшемъ участіи разлагающихся растительныхъ остатковъ, должно представлять собой, въ силу сказаннаго, одну изъ важнѣйшихъ страницъ какъ научнаго теоретическаго

почвовѣдѣнія, такъ и земледѣлія, будучи неразрывно и тѣсно связано съ вопросомъ о плодородіи почвъ.

Если мы обратимся теперь къ литературѣ всѣхъ этихъ вопросовъ, то убѣдимся, что степень разработанности и выясненности ихъ — далеко не соотвѣтствуетъ тому значенію, которое имѣютъ всѣ эти вопросы для почвовѣдѣнія и агрономіи. Какъ мы въ томъ убѣдимся изъ послѣдующаго изложенія, довольно подробно-разработанной является лишь одна сторона даннаго обширнаго вопроса, а именно — вліяніе мертваго растительнаго покрова на физическія свойства почвы. Работы Ebermayer'a, Wollny, Ramann'a и др. даютъ въ этой области часто исчерпывающій матеріаль.

Но если мы обратимъ вниманіе на химическую сторону даннаго вопроса, то часто можемъ убѣдиться въ полномъ почти отсутствіи экспериментальной разработки даже и наиболѣе общихъ, кардинальныхъ, сторонъ его. Разсмотрѣніе въ дальнѣйшемъ соотвѣтствующей литературы подтвердить намъ справедливость этого положенія.

Эти соображенія и заставили меня, много лѣтъ назадъ, подвергнуть послѣдовательному и систематическому изученію этотъ интересный и важный вопросъ — о роли мертвыхъ растительныхъ остатковъ въ химизмѣ почвы. Первые мои работы въ этой области произведены были подъ непосредственнымъ руководствомъ и по мысли Prof. E. Ramann'a (Мюнхень), которому и считаю своимъ непремѣннымъ долгомъ выразить здѣсь глубокую благодарность. Дальнѣйшія изслѣдованія производились въ Агрономической Лабораторіи С.-Петербургскаго Университета.

Въ разработкѣ затрагиваемыхъ вопросовъ суще-

ственную помощь, въ смыслѣ накопленія аналитическаго матеріала, оказали мнѣ мои ученики — тѣ студенты-сотрудники, которые работали послѣдніе годы подъ моимъ руководствомъ въ Агрономической Лабораторіи С.-Петербургскаго Университета. Нѣкоторымъ же изъ нихъ, какъ, напр., гг. Аболенскому, Петрову и Розову поручена была и самостоятельная разработка нѣкоторыхъ, небольшихъ, вопросовъ въ этой области. Цѣнные также результаты для моей задачи добыты въ нашей Лабораторіи оставленнымъ при Университетѣ Б. Н. Одинцовымъ. Всѣмъ упомянутымъ лицамъ считаю необходимымъ выразить здѣсь свою искреннюю признательность.

Я далекъ, конечно, отъ мысли считать добытые результаты окончательными, или сколько-нибудь исчерпывающими данный, можно сказать, необъятный вопросъ. Почти полнымъ отсутствіемъ, однако, какихъ-либо предшествующихъ экспериментальныхъ работъ въ области большинства вопросовъ, затрагиваемыхъ тремя послѣдними главами настоящей работы, я хотѣлъ бы оправдать всю, хорошо сознаваемую мною самимъ, неполноту и незаконченность сообщаемыхъ данныхъ. Кромѣ того, описательное почвовѣдѣніе, какъ извѣстно, настолько далеко ушло въ настоящее время впередъ отъ экспериментальнаго, что сплошь и рядомъ приходится цѣлый рядъ, даже основныхъ, почвенныхъ вопросовъ рѣшать, за неимѣніемъ опытной разработки ихъ, — путемъ лишь логическихъ, умозрительныхъ предположеній. Съ этой точки зрѣнія — экспериментальную разработку многихъ вопросовъ почвовѣдѣнія, хотя бы даже въ общихъ схематическихъ чертахъ, нельзя не признать въ настоящее время настоятельно необходимой.

Прежде чѣмъ приступить теперь къ изложенію добытыхъ данныхъ — я считаю своей непрѣмной обязан-

ностью выразить Физико-Математическому Факультету С.-Петербургскаго Университета глубочайшую благодарность за ту матеріальную поддержку, которая была мнѣ оказана въ дѣлѣ печатанія настоящей работы.

С.-Петербургъ,
Сентябрь 1911 г.

ГЛАВА I.

О водных свойствах мертвых растительных остатков.

Влагоемкость различных растительных остатков. (Работы Krutsch'a, Heiden'a, Ebermayer'a, Wollny, Riegler'a и др.) Изслѣдованіе на влагоемкость образцовъ лѣсной подстилки изъ различныхъ кварталовъ Велико-Анадольскаго лѣса, Екатеринославской губ. Вліяніе состава насажденія и возраста его. Количество накапливающейся подстилки въ различныхъ кварталахъ Велико-Анадольскаго лѣса. Роль лѣсной подстилки лиственныхъ лѣсовъ въ процессахъ увлажненія почвы. Лѣсная подстилка изъ-подъ хвойныхъ насажденій. Влагоемкость ея. Роль этой подстилки въ процессахъ увлажненія почвы подъ хвойными лѣсами. „Степной войлокъ“. Влагоемкость его. Роль „войлока“ въ процессахъ увлажненія степныхъ почвъ.

Водопроницаемость лѣсныхъ подстилокъ изъ-подъ лиственныхъ и хвойныхъ насажденій. Водопроницаемость „степного войлока“.

Испаряемость всѣхъ этихъ объектовъ.

Капиллярныя свойства ихъ. Общія соображенія.

Различные растительные остатки, въ видѣ отмирающихъ ежегодно стеблей, вѣтвей, листьевъ и пр., накаплиются иногда на поверхности почвы, какъ извѣстно, въ весьма значительныхъ количествахъ. Такой мертвый растительный покровъ („лѣсная подстилка“ — въ лѣсахъ, „степной войлокъ“ — на поверхности дѣйственныхъ степныхъ почвъ и т. п.), являясь какъ бы посредствующимъ звеномъ между всѣми явленіями, совершающимися въ окружающей атмосферѣ — съ одной стороны, и сложнымъ комплексомъ разнообразныхъ процессовъ, которыми живутъ дневные горизонты почвы — съ другой, —

долженъ быть признанъ однимъ изъ важнѣйшихъ моментовъ, опредѣляющихъ, прежде всего, характеръ и интенсивность физическихъ явленій, совершающихся въ почвѣ. Колебанія окружающей среды, осадки и т. п. — всѣ эти атмосферическія явленія лишь постольку могутъ отражаться на ходѣ физическихъ процессовъ, совершающихся въ почвѣ, поскольку они встрѣчаютъ въ покрывающемъ почву мертвомъ растительномъ покровѣ себѣ союзника или, наоборотъ, антагониста.

Однако, для того, чтобы ближе подойти къ рѣшенію этого вопроса и возможно полнѣе уяснить себѣ значеніе мертвого растительнаго покрова въ ходѣ физическихъ процессовъ, совершающихся въ почвенной средѣ, — необходимо предварительно подвергнуть анализу самый объектъ изученія — съ точки зрѣнія физическихъ свойствъ его самого: насколько быстро и полно въ состояніи онъ проводить черезъ себя выпадающую атмосферную влагу, въ какой мѣрѣ способенъ онъ предохранять почву отъ испаренія, въ какихъ количествахъ способенъ онъ задерживать въ себѣ воду, какова его теплоемкость и теплопроводность и пр. и пр. Только изучивши предварительно эти свойства растительнаго мертвого покрова, — возможно будетъ подойти и къ рѣшенію болѣе общаго вопроса, — роли этого объекта вообще въ распредѣленіи въ почвенной средѣ влажности, тепла и другихъ атмосферныхъ агентовъ.

Самая методика изслѣдованія физическихъ свойствъ растительныхъ остатковъ не представляетъ собой, быть можетъ, особыхъ затрудненій ¹⁾, но цифры этихъ анализовъ, даже по отношенію къ одному и тому же растительному объекту, должны получаться, разсуждая а priori, часто совершенно разнородныя. Дѣйствительно, въ какой степени измельченія взять тотъ или

¹⁾ Впрочемъ — какихъ-либо опредѣленныхъ нормъ въ этомъ отношеніи до сихъ поръ совершенно еще не выработано; въ частности — по отношенію къ методу опредѣленія тепловыхъ свойствъ этихъ объектовъ (ихъ теплоемкости, теплопроводности и т. п.) въ литературѣ не имѣется даже и указаній.

другой матеріалъ, въ какой стадіи разложенности, какъ плотно лежитъ этотъ объектъ въ природныхъ условіяхъ, каковъ его химическій составъ (что находится въ свою очередь въ прямой и тѣсной зависимости отъ физико-химическаго состава почвы, создавшей этотъ растительный объектъ, отъ условій погоды, и т. д.) и пр.,—все это такія условія, которыя не могутъ, конечно, не играть существенной роли въ измѣненіи, то въ ту, то въ другую сторону, физическихъ свойствъ (влагоемкости, водопроводимости, воздухопроницаемости, теплоемкости и т. п.) того или другого растительнаго объекта. Съ этой точки зрѣнія мнѣ представляется значительно болѣе естественнымъ и цѣлесообразнымъ подвергать изученію со стороны ихъ физическихъ свойствъ, — не различные растительные остатки, взятые въ отдѣльности (напр. листья дуба, березы, хвою ели, солому того или другого злака и т. п.), и отсюда дѣлать тѣ или другія обобщенія, а остановиться на подробномъ изученіи въ этомъ отношеніи естественныхъ скопленій отмершихъ растительныхъ остатковъ, которыя (скопленія) намъ приходится наблюдать въ различныхъ физико-географическихъ районахъ подъ различными растительными формаціями. Изученіе этихъ объектовъ въ томъ видѣ, какъ даны они намъ самой природой, позволить намъ ближе уяснить себѣ ту роль, которую играютъ они, при естественныхъ условіяхъ, въ процессахъ почвообразования. Конечно, природа даетъ намъ въ этомъ отношеніи слишкомъ много самыхъ разнообразныхъ комбинацій (съ точки зрѣнія состава мертваго растительнаго покрова, его мощности, степени разложенности и т. д.), чтобы можно было бы рассчитывать на возможность скорого и всесторонняго изученія даннаго вопроса,—съ этой точки зрѣнія нельзя, конечно, отрицать важности и даже необходимости изслѣдованія и отдѣльныхъ ингредіентовъ, входящихъ въ составъ того или другого покрова и, на основаніи комбинированія свойствъ этихъ отдѣльныхъ ингредіентовъ, составлять въ каждомъ случаѣ болѣе

или менѣе опредѣленныя заключенія, — но несомнѣнно, что непосредственное изученіе того или другого мертваго растительнаго покрова, какъ опредѣленнаго типа, — представить собой значительно болѣе глубокий интересъ.

Между тѣмъ, если мы обратимся къ литературѣ даннаго вопроса, то убѣдимся, что, несмотря на довольно обширный имѣющійся матеріалъ, все же громадное большинство изслѣдователей оперировало именно съ отдѣльными растительными объектами (съ листьями той или другой древесной породы, съ соломой различныхъ злаковъ и т. п.) и слишкомъ мало обращало вниманія на естественные комплексы, а если и подвергало изслѣдованію также и эти послѣдніе, то имѣя почти всегда въ виду лишь тотъ объектъ, который скопляется въ лѣсахъ въ формѣ „лѣсной подстилки“, оставляя безъ вниманія другія аналогичныя образованія. Укажу, напр., что такъ называемый „степной войлокъ“, скопляющійся на поверхности дѣйственныхъ степныхъ почвъ и играющій такую важную роль въ генезисѣ послѣднихъ, остается до сихъ поръ, можно сказать, совершенно не изученнымъ — если не считать отрывочнаго указанія на нѣкоторыя физическія свойства этого объекта, приведеннаго въ одной изъ моихъ давнихъ работъ ¹⁾).

Главной задачей моей настоящей работы, какъ я оговорился въ предисловіи, является изученіе мертваго растительнаго покрова, какъ фактора, опредѣляющаго химическіе процессы, совершающіеся въ почвѣ, но въ виду того, что у меня накопился въ настоящее время довольно большой матеріалъ по отношенію къ упомянутому объекту и со стороны оцѣнки его какъ физическаго фактора почвообразованія — я считаю необходимымъ въ I-й главѣ привести предварительно всѣ полученныя мною въ этомъ направленіи данныя, — тѣмъ

¹⁾ С. Кравковъ. „Изслѣдованія надъ нѣкоторыми физическими свойствами чернозема дѣйственной степи, 1900, стр. 19—21.

болѣе что они находятся часто въ тѣсной связи съ нѣкоторыми положеніями, высказываемыми и въ послѣдующихъ главахъ.

Отношеніе различныхъ растительныхъ остатковъ къ водѣ.

А. Влагоемкость.

Какъ извѣстно, лишь послѣ достиженія полного насыщенія водой тотъ или другой объектъ бываетъ въ состояніи пропускать черезъ себя избытокъ непоглощаемой болѣе влаги. Установить размѣры этого насыщенія по отношенію къ мертвому растительному покрову является, конечно, крайне важнымъ. Зная влагоемкость этого матеріала мы напередъ можемъ предвидѣть, какую роль играетъ тотъ или другой покровъ въ передачѣ почвеннымъ горизонтамъ ниспадающей атмосферной влаги. При очень высокой влагоемкости этого объекта мы можемъ встрѣтиться, напр., съ такимъ случаемъ, когда все количество атмосферныхъ осадковъ цѣликомъ задержится имѣющимся покровомъ и не проникнетъ въ почву и т. д.

Данныя Kruttsch'a ¹⁾ показываютъ, что растительные остатки обладаютъ именно этой громадной влагоемкостью. Буковые, напр., листья въ состояніи поглощать до 441,55% воды, хвоя ели — 308,83%, сосны — 221,35%, и т. п. Heiden ²⁾, изслѣдовавшій солому различныхъ злаковъ, какъ подстилочный матеріалъ въ скотныхъ дворахъ, нашелъ, что солома пшеницы способна въ теченіе 24 часовъ поглощать 225,8% воды отъ своего вѣса, солома ржи — 241,4%, овса — 213,6% и солома гороха — до 280,9%.

¹⁾ Chemischer Ackersmann, 1863, S. 16.

²⁾ Lehrbuch der Düngerlehre, 1868, II Bd, S. 48.

Boussingault ¹⁾ даетъ слѣдующія цифры:

поглотили воды (въ теченіе 24 час.).		%
Солома пшеницы		220
„ ячменя		285
„ овса		228
„ рапса		200
Опавшіе дубовые листья		162
Верескъ		100

По Heinrich'y ²⁾:

		%
Влагоемкость ржаной соломы, разрыванной на куски въ 5 см. дл. =	265	
„ „ „ „ „ „ „ 1 „ „ =	270	
„ „ „ „ „ „ „ 3/4 „ „ =	380	
„ листьевъ граба	395	
„ „ бука	210	
„ „ дуба	245	
„ „ березы	300	
„ хвои лиственницы	300	
„ свѣжей, зеленой хвои сосны	12	
„ мха (Нурпш) высушеннаго	425	

и т п.

Нѣтъ, конечно, необходимости приводить другія, болѣе или менѣе аналогичныя данныя, полученныя другими изслѣдователями (см. напр., Breitenlohner ³⁾, Wolff ⁴⁾ и др.).

Мы перейдемъ прямо къ тѣмъ обширнымъ и подробнымъ изслѣдованіямъ въ этой области, которыя были произведены Ebermayer'омъ ⁵⁾. На основаніи большого количества анализовъ различныхъ растительныхъ остатковъ, взятыхъ при томъ изъ различныхъ мѣстностей, авторъ даетъ слѣдующія среднія цифры, выражающія водоудерживающую силу этихъ объектовъ:

¹⁾ Жирарденъ—Навозы и прочія животныя удобрения, 1871, стр. 109.

²⁾ O. Lemmermann—Die Düngerlehre, 1901, S. 47.

³⁾ ibid.

⁴⁾ ibid.

⁵⁾ E. Ebermayer, — „Die gesammte Lehre der Waldstreu“, 1876, S. 176, 177. Также—Табл. VI а.

	%
Влагоемкость мха (различные виды Нурпим) . . .	= 282,74
„ соломы ржи	= 274,6
„ листьевъ бука	= 232,7
„ хвои ели	= 150,3
„ хвои сосны	= 142,6
„ папоротника	= 259,1
„ вереска	= 130,7

Необходимо при этомъ оговориться, что, употребляя для анализа однородные объекты, но взятые изъ различныхъ мѣстностей, Ебермайер находилъ не малыя колебанія въ найденныхъ величинахъ; такъ влагоемкость, напр., листьевъ бука колебалось между 195⁰/₀ и 252⁰/₀; хвои ели—между 128⁰/₀ и 190⁰/₀; хвои сосны — между 121⁰/₀ и 167⁰/₀, а мха — даже между 237⁰/₀ и 334⁰/₀ ¹⁾. Чтобы конкретнѣй представить эти огромныя количества задерживаемой растительными остатками воды, авторъ вычислилъ ²⁾ на основаніи вышеприведенныхъ цифръ, что лишь годовое количество опадающей листвы — въ букетномъ, напр., лѣсу, въ состояніи на пространствѣ 1 гектара задержать въ себѣ, такимъ образомъ, до 129 гектолитровъ воды, въ еловомъ—54,2 гектолитра, въ сосновомъ—48,9 гектолитровъ и т. д. (принимая во вниманіе, что годовое количество опадающей листвы въ букетномъ лѣсу равняется приблизительно 4000 kgr. на 1 гектаръ, въ еловомъ—3300 kgr., и въ сосновомъ также 3300 kgr.).

Имѣя же въ виду, что атмосферная вода, прежде чѣмъ достигнуть лѣсной подстилки, перехватывается на дорогѣ еще кронами деревьевъ, и притомъ въ весьма значительныхъ количествахъ (по изслѣдованіямъ того же автора—до 25⁰/₀—32⁰/₀ общаго количества выпадающей надъ лѣсомъ влаги)—

¹⁾ Такія большія колебанія въ полученныхъ цифрахъ, выражающихъ влагоемкость мха, объясняются, главнымъ образомъ, тѣмъ, что авторъ оперировалъ то съ чистымъ мхомъ, то съ мхомъ, къ которому была примѣшана въ разныхъ количествахъ хвоя ели, сосны и пр.

²⁾ Ebermayer, l. c., с. 178.

приходится признать, что лишь весенняя талая вода, накапливающаяся въ лѣсахъ, да ливни, въ состояніи оказать существенное содѣйствіе въ увлажненіи лѣсной почвы.

Riegler ¹⁾ въ своей прекрасной работѣ, касающейся роли лѣсной подстилки въ увлажненіи почвы, приводитъ слѣдующія среднія цифры влагоемкости различныхъ растительныхъ объектовъ:

I. Мохъ.			
	%	%	%
<i>Leucobryum vulgare</i>	= 990 (minim.	953—maxim.	1041)
<i>Sphagnum acutifolium</i>	= 482 (" 465	" 512)
<i>Thuidium tamariscinum</i>	= 407 (" 402	" 416)
<i>Eurhynchium piliferum</i>	= 383 (" 362	" 403)
<i>Hylacomium triquetrum</i>	= 284 (" 282	" 286)
<i>Polytrichum formosum</i>	= 192 (" 177	" 204)

II. Листья.			
Листья бука	= 227 (" 196	" 253)
" то же зеленые	= 148 (" 141	" 163)
" дуба	= 152 (" 119	" 182)
" граба	= 147 (" 123	" 171)

III. Хвоя.			
Хвоя лиственницы	= 134 (" 114	" 156)
" ели	= 126 (" 112	" 140)
То же (зеленая).	= 57 (" 53	" 62)
" пихты	= 122 (" 104	" 132)
" черной сосны	= 119 (" 111	" 137)

и т. д.

Wollny ²⁾, считая болѣе правильнымъ и цѣлесообразнымъ выражать величину водоудерживающей силы того или другого растительнаго объекта въ % по отношенію къ опредѣленному объему, а не вѣсу его (какъ то дѣлали предыдущіе изслѣдователи, почему послѣдніе, по мнѣнію Wollny, и получали такія разнородныя данныя по отношенію даже къ одному и

¹⁾ Riegler.—Beiträge zur Lehre von den Moosdecken und von der Waldstreu (Forschungen aus dem Gebiete der Agrikulturphysik, III, 1880, S. 97—98).

²⁾ Wollny.—Untersuchungen über die Wasserkapazität und das Verdunstungsvermögen verschiedener Streumaterialien (Forschungen... etc., VII, 1884, S. 309—318).

тому же объекту), изслѣдовалъ въ этомъ отношеніи цѣлый рядъ растительныхъ остатковъ и получилъ слѣд. результаты:

Всѣ 8 литровъ весьма плотно утрамбованнаго матеріала:		Влагоемкость.		
Въ воздушно- сухомъ состо- яніи.	Въ состояніи насыщенномъ водой.	въ % по отношенію къ вѣсу.	въ % по отношенію къ объему.	
	gr.	gr.		
Торфъ	934	7091	658,13	76,96
Ржаная солома	1054	3621	304,46	32,09
Горохов. „	793	3620	356,49	35,34
Мохъ (Нурпим).	746	3799	409,25	38,16
Листья бука	1232	4393	256,57	39,51
„ дуба	1202	4109	241,84	36,34
Хвоя ели	1563	4080	161,04	31,46
„ сосны	1119	3438	207,24	28,99

Сравнивая эти цифры съ цифрами, выражающими влагоемкость взятыхъ одновременно для опыта суглинка (влагоемкость котораго выражалась всего 31,36%, и песка—13,99% по отношенію къ вѣсу), мы снова убѣждаемся въ способности мертвыхъ растительныхъ остатковъ впитывать и удерживать въ себѣ, дѣйствительно, громадныя количества воды.

Изложенными работами исчерпываются тѣ, болѣе или менѣе систематическія, свѣдѣнія, которыя намъ извѣстны относительно влагоемкости различныхъ растительныхъ остатковъ. Правда, изучая литературу, касающуюся вообще изслѣдованія физическихъ свойствъ этихъ матеріаловъ ¹⁾ мы не разъ встрѣчаемся съ такими данными, которыя имѣютъ то или другое отношеніе и къ интересующему насъ сейчасъ вопросу; но въ виду того, что работы эти не прибавляютъ рѣшительно ничего новаго или интереснаго къ выводамъ Ebermayer'a, Wollny и Riegler'a, и, въ большинствѣ случаевъ, даютъ намъ лишь отрывочныя въ этой области свѣдѣнія—мы на нихъ и не останавливаемся. Укажу только, что и всѣ изложенныя нами выше работы, не говоря уже про крайнюю разнорѣчи-

¹⁾ Литература эта будетъ сообщена нѣсколько ниже.

вость сообщаемых ими цифръ, по своимъ результатамъ, имѣютъ слишкомъ отдаленное отношеніе къ тѣмъ явленіямъ, которыя мы наблюдаемъ въ природѣ при естественныхъ условіяхъ. Дѣйствительно, оперируя каждый разъ съ отдѣльными частями тѣхъ или другихъ растительныхъ остатковъ (съ листвою различныхъ древесныхъ породъ, съ соломой различныхъ злаковъ и т. п.), тщательно очищая эти объекты отъ постороннихъ примѣсей, различнымъ образомъ ихъ размельчая, просѣивая ихъ часто даже черезъ сита—съ цѣлью получить вполнѣ однородный матеріалъ ¹⁾ и пр. и пр.—мы получаемъ въ результатѣ такія данныя, которыя едва-ли непосредственно приложимы къ уясненію явленій, совершающихся въ природѣ—при естественныхъ условіяхъ. Между тѣмъ, какъ на это я указалъ еще выше, изслѣдованіе водныхъ свойствъ именно естественныхъ скопленій, наблюдаемыхъ нами подъ различными растительными формаціями — и представляетъ собой наибольшій, какъ теоретическій такъ и практический, интересъ ²⁾.

Я теперь и перейду къ изложенію тѣхъ данныхъ, которыя получены были мною при массовомъ изслѣдованіи различныхъ видовъ лѣсной подстилки, а также „степного войлока“ со стороны ихъ влагоемкости. Что касается лѣсной подстилки,

¹⁾ См., напр., Wollny—Forschungen... etc., VII, 1884, S. 314.

²⁾ Когда настоящая работа была изготовлена уже къ печати, я ознакомился съ изслѣдованіями надъ мертвымъ растительнымъ покровомъ Henry („Faculté d'imbibition de la couverture morte du sol des forêts“, 1904). Цитируемый авторъ анализировалъ на влагоемкость нѣкоторые виды лѣсной подстилки также въ естественномъ ихъ видѣ; при этомъ онъ нашелъ весьма крупныя цифры;—такъ, еловая, напр., подстилка поглотила, по его наблюденіямъ, до 415% воды (по вѣсу), а буковая—до 538% (ср. мои данныя, приведенныя ниже). См. также новую книгу Henry „Les sols forestiers“ (1908), въ которой цитируемый авторъ удѣляетъ довольно большое вниманіе и лѣсной подстилкѣ (гл. II—V, VII—X); необходимо однако замѣтить, что въ этой части названная книга является почти лишь переложеніемъ извѣстнаго труда Wollny („Die Zersetzung der Organ. Stoffe“... etc., 1897).

то главный матеріалъ собранъ былъ мною въ районѣ Велико-Анадольскаго лѣсничества во время моихъ тамъ работъ въ теченіе лѣта 1906 и 1907 гг. Районъ этотъ тѣмъ интересенъ, что при собираніи матеріала можно было въ самомъ широкомъ масштабѣ разнообразить и характеръ насажденій и возрастъ ихъ и пр. — при совершенно идентичныхъ почвенныхъ и климатическихъ условіяхъ.

Какъ извѣстно, Велико-Анадольскій лѣсъ (Маріупольскаго у. Екатеринославской губ.) представляетъ собой сплошной, искусственно-разведенный лѣсъ, занимающій въ одномъ главномъ массивѣ свыше 1600 десятинъ отъ вѣка безлѣсной черноземной степной почвы. Этотъ грандіозный опытъ облѣсенія степи, опытъ „смѣлаго насилія“ надъ природой былъ произведенъ по порученію М-ва Государ. Имуществъ въ 1843 г. и послѣдующіе годы г. ф. Граффомъ.

Почва Велико-Анадольской дачи, въ своихъ поверхностныхъ горизонтахъ, по изслѣдованіямъ проф. П. А. Земятченскаго ¹⁾, покрыта тяжелымъ глинистымъ черноземомъ, мощность котораго колеблется отъ 0,74—до 1 м., съ содержаніемъ перегноя отъ 6⁰/о до 8⁰/о.

Механическій анализъ по способу Osborn'a показываетъ, что количество „песка“ не поднимается выше 16⁰/о и падаетъ иногда до 6⁰/о. На основаніи химическихъ анализовъ—валового и 10⁰/о солянокислой вытяжки—проф. П. А. Земятченскій находитъ возможнымъ отнести Вел.-Анад. черноземъ, какъ по общему содержанію наиболѣе важныхъ питательныхъ

¹⁾ Болѣе подробно—см. Проф. П. А. Земятченскій—Велико-Анадольскій Участокъ. „Тр. Экспедиціи“, III, 1894 г.

Рядъ статей Г. Н. Высоцкаго—въ „Трудахъ Экспедиціи“ и въ „Почвовѣдѣніи“.

Степановъ — Почва и грунтъ В.-Анад. Лѣсничества... etc. („Журн. Оп. Агрономіи“. 1905 г.).

С. Кравковъ—Химическія свойства почвъ и грунтовъ В.-Анад. Лѣсничества... etc. („Труды Экспедиціи“ 1907 г. и „Журн. Оп. Агр.“ 1908).

веществъ, такъ и по количеству цеолитовъ — къ типу богатыхъ. Только бросается въ глаза изслѣдователю сравнительно малое количество въ немъ фосфорной кислоты.

Въ виду того, что во время моихъ работъ въ предѣлахъ Бел.-Анад. лѣсничества въ моемъ распоряженіи находилась небольшая лабораторія (при домикѣ наблюдателя въ 24 кварталѣ), я имѣлъ возможность опредѣлять влагоемкость собраннаго матеріала тутъ же, на мѣстѣ. Самый методъ опредѣленія заключался въ слѣд.: тотъ или другой мертвый покровъ осторожно собирался руками, чтобы не затронуть верхняго горизонта почвы (обычно — онъ довольно аккуратно и легко сдирается). Крупные сучья и вѣтви не принимались въ расчетъ, такъ какъ распределяются они на поверхности почвы крайне неравномѣрно. Собранный матеріалъ высушивался нѣкоторое время на воздухѣ и опредѣленное вѣсовое количество его (обычно—200 gr.) помѣщалось въ очень широкую объемистую стеклянную банку, въ которой укладывались различные объекты всегда до опредѣленной черты, т.-е. занимали всегда болѣе или менѣе одинаковый объемъ. Послѣ этого въ банки съ изслѣдуемымъ объектомъ наливалась до краевъ въ избыткѣ вода и на этомъ уровнѣ она поддерживалась все время опыта. Спустя 48 часовъ ¹⁾ отверстіе банокъ затягивалось въ 2—3 слоя марлей, и путемъ послѣдующаго переворачиванія ихъ кверху дномъ, достигалось стеканіе изъ нихъ избыточной, не поглощенной воды. Когда стекала послѣдняя капля воды, матеріалъ вмѣстѣ съ банкой взвѣшивался. Операція повторялась до достиженія изслѣдуемымъ матеріаломъ постояннаго вѣса.

Въ виду того, что черезъ марлю всегда проходили въ стекающую жидкость мелкіе обрывки и т. п.,—эти послѣдніе собирались, по окончаніи опыта, путемъ фильтрованія жид-

¹⁾ Предварительными опытами было установлено, что обычно уже спустя 24—30 часовъ достигается полная влагоемкость растительными остатками.

кости черезъ грубый фильтръ, послѣ чего эти остатки присоединялись къ изслѣдуемому матеріалу.

Приводимыя ниже цифры — представляютъ собой среднее изъ 2-хъ опредѣленій. Полученные результаты сведены мною въ слѣдующей таблицѣ:

№ кварталовъ. Составъ насажденія.	Годъ посадки.	Влагоемкость подстилки въ ‰ къ возд.—сух. вещ. Среднее изъ 2-хъ опредѣленій.
кв. 5. Дубъ, ясень, ильмъ, кленъ остр. и др.	1846—1849 г.	738,9
кв. 13. Ясень, ильмъ, кленъ остр.	1860 г.	668,2
кв. 1. Кленъ тат., акація желт.	1876—1879 г.	580,0
кв. 8. Дубъ, ильмъ, ясень		561,9
кв. 12. (а, в) Акація бѣлая		598,3
„ „ (б) Кленъ тат.		549,9
кв. 18. Тат. кленъ, желт. ак.		601,0
кв. 24. Ильмъ, ясень, кленъ остр.	1886—1889 г.	573,8
кв. 61. Ильмъ, ясень, кленъ остр., дубъ		501,7
кв. 65. Ильмъ, ясень, акац. желт.		472,8
кв. 71. Ильмъ, ясень, кленъ остр.		499,6
кв. 74. Ильмъ, ясень		463,9

Разсматривая ближе эти цифры—мы можемъ подмѣтить слѣдующее: во-1-хъ, ощутительной разницы между величинами, выражающими влагоемкость подстилки подъ различными древесными породами (разумѣя пока лиственные породы)—при прочихъ, болѣе или менѣе равныхъ, условіяхъ (напр., возраста и т. п.) не замѣчается; во-2-хъ, чѣмъ старше насажденіе—тѣмъ выше влагоемкость имѣющейся въ немъ лѣсной подстилки, и въ-3-хъ, бросается въ глаза вообще громадная водоудерживающая сила лѣсной подстилки, взятой въ болѣе или менѣе естественномъ видѣ, — особенно же наиболѣе разложенныхъ образцовъ ея: цифры эти значительно превосходятъ данныя, сообщаемыя Ebermayer'омъ, Wollny и др. относительно влагоемкости отдѣльныхъ частей различныхъ растительныхъ объектовъ.

А) Что касается перваго, сдѣланнаго нами обобщенія, то

надо полагать, что таковое мы можем пока допустить лишь благодаря сравнительно небольшому количеству имѣющагося у насъ въ рукахъ цифрового матеріала—съ одной стороны, съ другой—благодаря вообще неточности существующей методики опредѣленія влагоемкости того или другого объекта. Несомнѣнно, что если подвергнуть специально изслѣдованію данный вопросъ и собрать по возможности огромный матеріалъ, касающійся влагоемкости лѣсной подстилки подъ различными насажденіями, то, при прочихъ, конечно, равныхъ условіяхъ, вѣроятно удастся и здѣсь подмѣтить какое-либо правильное отношеніе. Дѣйствительно, различныя древесныя породы имѣютъ различную форму и устройство поверхности опадающей листвы, (что обусловливаетъ большую или меньшую плотность ихъ расположенія на поверхности лѣсной почвы), различный химическій составъ ея и пр. и пр.; все это, конечно, должно налагать свою особую печать на величину, выражающую влагоемкость того или другого объекта. Необходимо однако оговориться, что исканіе этихъ правильныхъ соотношеній должно встрѣтить на своемъ пути очень много крупныхъ затрудненій: не забудемъ, напр., что химическій составъ листвы у одной и той же древесной породы можетъ сильно варіировать въ зависимости отъ условій погоды даннаго года, отъ физико-механическаго и химическаго состава почвы и т. д., а всѣ эти условія въ природѣ могутъ комбинироваться самымъ разнообразнымъ образомъ. Такимъ образомъ—лишь при громадномъ количествѣ массовыхъ наблюденій, при самыхъ разнообразныхъ природныхъ условіяхъ, — можемъ мы надѣяться на установленіе и въ этой области какихъ-либо правильныхъ законностей.

В) Зависимость между возрастомъ насажденія и величиной водоудерживающей силы накопившейся въ немъ подстилки выступаетъ изъ приведенныхъ цифръ, наоборотъ, довольно рельефно. Объяснить эту зависимость надо, главнымъ образомъ, тѣмъ,

что въ болѣе старыхъ насажденіяхъ, мы имѣемъ дѣло и съ болѣе разложеной формой подстилки.

Чтобы убѣдиться въ томъ, что тотъ или другой растительный объектъ, по мѣрѣ своего разложенія, повышаетъ свою влагоемкость, я произвелъ слѣдующій опытъ.

Въ кв. 13-мъ (см. описаніе его выше), въ которомъ мертвый покровъ весьма мощно развитъ, мною были собраны какъ листья непосредственно съ деревьевъ, такъ и образцы подстилки по слоямъ и затѣмъ всѣ эти объекты изслѣдованы на влагоемкость. Результаты получились слѣдующіе:

Описаніе изслѣдуемаго матеріала.	Влагоемкость въ % къ возд.—сух. веще- ству. Среднее изъ двухъ опредѣленій.
1) Листья, собранныя въ концѣ іюля въ зеленомъ состояніи съ деревьевъ (ясень, пльмъ, кленъ)	320,1
2) Листья, собранныя съ самой поверхности мертваго покрова. Имѣютъ видъ блѣдный, дряблый, легко рвутся въ рукѣ. Представляютъ собой, повидному, остатки прошлогодняго листопада.	497,9
3) Образецъ подстилки, взятой съ глубины приблизительно 4 сант. съ поверхности. Полуразложившаяся темная масса. Можно еще съ трудомъ различить отдѣльныя части отмершихъ растений: черешки листьевъ и т. п.	723,7
4) Образецъ подстилки, взятой съ глубины приблизительно 11 сант. Однородная, рыхлая черная масса .	892,8

Такимъ образомъ, дѣйствительно, по мѣрѣ разложенія растительныхъ остатковъ, влагоемкость ихъ правильно повышается. Этимъ и надо себѣ объяснить замѣченный нами фактъ значительно болѣе высокой водоудерживающей силы, которою обладаетъ лѣсная подстилка въ болѣе старыхъ насажденіяхъ.

С) Обсуждая, наконецъ, вообще тѣ весьма крупныя цифры, которыя характеризуютъ водоудерживающую силу мертваго растительнаго покрова, накапливающагося въ лѣсахъ, невольно рождается цѣлый рядъ вопросовъ, связанныхъ съ лѣсной

подстилкой, какъ посредникомъ между выпадающими атмосферными осадками и лежащей подъ этой подстилкой почвой.

Дѣйствительно, если мертвый растительный покровъ въ состояніи удерживать въ себѣ такое громадное количество воды, то, спрашивается, не является ли онъ весьма серьезнымъ антагонистомъ по отношенію къ выпадающимъ надъ лѣсомъ атмосфернымъ осадкамъ, не давая возможности, въ силу своей высокой влагоемкости, извѣстной части этихъ осадковъ проникнуть въ почву? Не являлось ли бы съ этой точки зрѣнія рациональнымъ—систематическое, хотя бы частичное, удаленіе изъ лѣса накопляющейся подстилки? Не способствуетъ ли послѣдняя, такимъ образомъ, обѣднѣнію лѣсной почвы по отношенію къ влагѣ? И т. д.

Все это вопросы, которые логически вытекаютъ изъ разсмотрѣнія вышеприведенныхъ цифръ. Попытаемся дать теперь полученнымъ нами результатамъ болѣе конкретный смыслъ, перенеся эти лабораторныя данныя въ природу.

Прежде всего посмотримъ, какое количество осадковъ выпадаетъ въ данной мѣстности въ теченіе года. Данныя г. Адамова ¹⁾, собранныя за 9 лѣтъ, показываютъ, что въ предѣлахъ Мариупольскаго Лѣсничества (находящагося рядомъ съ Велико-Анадольскимъ) выпадаетъ въ теченіе года, въ среднемъ, 400,3 мм. осадковъ, распредѣляясь по отдѣльнымъ мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ:

	mm.		mm.
въ январѣ	20,4	въ іюлѣ	49,7
„ февралѣ	25,7	„ августѣ	44,6
„ мартѣ	24,3	„ сентябрѣ	27,2
„ апрѣлѣ	26,5	„ октябрѣ	23,8
„ маѣ	47,5	„ ноябрѣ	20,5
„ іюнѣ	57,3	„ декабрѣ	32,8

Перечисляя годовое количество выпадающихъ осадковъ, выражающееся, какъ мы видѣли, цифрой въ 400,3 мм., на вѣсъ,

¹⁾ „Факторы плодородія русскаго чернозема“, 1904, стр. 54.

мы приходимъ къ заключенію, что въ данной мѣстности на пространствѣ 1 десятины выпадаетъ осадковъ въ теченіе года около 3.840.000 kgr. Необходимо однако отмѣтить, что до поверхности почвы достигаетъ далеко не все количество выпадающихъ осадковъ. Часть послѣднихъ, какъ извѣстно, задерживается листвою и вѣтвями деревьевъ и возвращается затѣмъ путемъ испаренія обратно въ атмосферу. Исслѣдованія Ебермайер'а ¹⁾ и др. показали, что лиственный лѣсъ средняго возраста задерживаетъ своей кроной, въ среднемъ, до 20% выпадающихъ осадковъ. Что касается хвойныхъ деревьевъ, то послѣднія, согласно Ебермайер'у, могутъ задерживать значительно большія количества воды—иногда до 45%. По даннымъ же А. Bühler'а ²⁾ густое насажденіе, напр., пихты можетъ на своей кронѣ оставить даже до 80% всѣхъ выпадающихъ осадковъ

Принимая во вниманіе довольно чахлый видъ большинства Вел. Анад. посадокъ, правильнѣй будетъ измѣрять количество задерживаемыхъ послѣдними осадковъ въ 12%—15% ³⁾. Исходя изъ этихъ цифръ, мы можемъ принять, что въ описываемомъ районѣ до поверхности мертваго растительнаго покрова доходитъ осадковъ ежегодно около 3.264.000 kgr. (рассчитывая на 1 дес.).

Обратимся теперь къ количеству скопляющейся лѣсной подстилки, на основаніи данныхъ, полученныхъ мною для Велико-Анадольскаго лѣса. Въ виду того, что въ русской литературѣ имѣются въ этой области лишь самыя скудныя и

¹⁾ Ebermayer. „Einfluss der Wälder auf die Bodenfeuchtigkeit“... etc. 1900, s. 4—5.

См. также Mathieu—Météorologie comparée agricole et forestière, 1878; Hoppe—Regenmessung unter Baumkronen, 1896 и др.

²⁾ A. Bühler—„Die Niederschläge im Walde“—(Mitt. d. Schw. Centralanstalt f. d. forst. Vers., Bd. II).

³⁾ См. Г. Н. Высоцкій. „Біологич. почвенныя и фенологич. наблюденія“... etc. 1901 и 1902 г. Также—П. В. Отоцкій „Грунтовныя воды“, 1905, стр. 291.

отрывочныя свѣдѣнія, я приведу здѣсь весь, имѣющійся у меня довольно обширный по этому вопросу матеріалъ, тѣмъ болѣе, что данныя эти пригодятся намъ и для послѣдующаго изложенія.

Но прежде посмотримъ, какія цифры даетъ въ этомъ отношеніи Ебермайеръ для Баварскихъ лѣсовъ ¹⁾. На основаніи его многочисленныхъ наблюденій можно сдѣлать слѣдующее заключеніе объ ежегодномъ отпадѣ листьевъ (въ kgr. на гектаръ въ воздушно-сухомъ состояніи):

Порода.	Возрастъ насажденія.	Количество опадающей ежегодно листьвы.
		kg.
Букъ	30—60 лѣтъ.	4182
"	60—90 "	4094
"	болѣе 90 "	4044
Ель	30—60 "	3964
"	60—90 "	3376
"	болѣе 90 "	3273
Сосна	20—50 "	3397
"	50—75 "	3491
"	75—100 "	4229

Общее же количество накапливающейся подстилки въ буковомъ, напр., лѣсу, по изслѣдованіямъ того же автора, равняется, въ среднемъ, 10417 kgr. (на гектаръ), въ еловомъ—13857 kgr. и въ сосновомъ—18279 kgr. Такимъ образомъ, количество подстилки въ буковомъ лѣсу лишь въ $2\frac{1}{2}$ раза больше ежегоднаго отпада (другими словами около 40% ежегодно разлагается), въ еловомъ—приблизительно въ 4, и въ сосновомъ—въ $4\frac{1}{2}$ раза.

Что касается ежегоднаго отпада листьевъ въ Велико-Анадольскомъ лѣсу, то цифры получены были мною значительно меньшія по сравненію съ вышеприведенными ²⁾. На кварта-

¹⁾ Ebermayer. Die gesammte Lehre der Waldstreu, 1876, s. 44—49.

²⁾ Что объясняется, конечно, довольно чахлами вѣдомъ вообще Велико-Анадольскихъ посадокъ.

лахъ №№ 26 (ильмъ, ясень 1881 г.), 25 (ильмъ, ясень 1879 г.) и 17 (ильмъ, ясень, дубъ, клень 1877) были выдѣлены мною въ 1906 г. небольшія дѣлянки и на послѣднихъ въ серединѣ лѣта была счищена вся лѣсная подстилка. По окончаніи листопада съ этихъ дѣлянокъ собраны были опавшіе листья, высушены на воздухѣ и взвѣшены. Получены слѣдующія данныя (я перечисляю ихъ прямо на 1 десятину):

	kg.
На кв. 26	1884
„ „ 25	2304
„ „ 17	1620

Въ среднемъ, слѣдовательно, мы можемъ считать, что на пространствѣ 1 десятины ежегодно отпадаетъ около 1936 kg. листьев ¹⁾.

Значительно большій матеріалъ имѣется у меня по другому вопросу, а именно, какъ велико общее количество накопившейся подстилки въ различныхъ кварталахъ (различнаго возраста и различнаго состава насажденій) Вел. Анад. лѣса ²⁾.

Совершался количественный учетъ подстилки слѣдующимъ образомъ: на пространствѣ 1 кв. арш. собиралась вся подстилка вплоть до верхнихъ горизонтовъ почвы. Въ расчетъ не принимались только слишкомъ крупныя сучья и вѣтви. Послѣ основательной просушки — образцы были взвѣшены.

Полученныя данныя я прямо перечисляю на площадь 1 десятины (въ круглыхъ цифрахъ).

¹⁾ См. С. Кравковъ—„Химич. свойства почвъ и грунтовъ Вел. Анад. Лѣсничества etc... стр. 39.

²⁾ Считаю необходимымъ выразить глубокую признательность г. Завѣдующему Мариупольскимъ Опытнымъ Лѣсничествомъ Д. В. Померанцеву за любезное содѣйствіе по доставленію мнѣ этихъ свѣдѣній.

Вѣсь лѣсной подстилки, взятой на пробныхъ площадкахъ въ кварт. №№ 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 53, 58, 59 и 33 Велико-Анадольской казенной дачи.

Кварталы и участки.	Составъ насажденія.	Вѣсь подстилки въ кгт. (на проц. 1 дес.).
кв. 13, уч. а	Ясень, Ильмъ, Кленъ остр.	12978
около купальни		
кв. 16, уч. а	Бѣлая акація	10080
" " уч. в	Бѣлая акація (1874 г.)	15700
кв. 17, уч. е	Тат. клень съ примѣсю дуба	12840
" " уч. ж	Остр. клень (1877 г.), ильмъ, ясень . . .	10160 ¹⁾
" " уч. з	Густая желтая акація	17100
" " уч. і	Рослый дубъ съ густымъ подлѣскомъ изъ желт. акаціи	23840
" " уч. н	Поросль дуба	7720
кв. 18, уч. в	Ясень, берестъ, желт. ак.	4600
" " уч. г	Тат. клень, желт. ак.	10600
" " уч. д	Желт. акація	8300
" " уч. е	Татарск. клень	10460
кв. 19, уч. б	Ильмов. породы съ дубомъ	5700
" " уч. в	Дубъ съ желтой акаціей	11100
" " уч. г	Дубъ (30-ти лѣтній), желт. ак.	17200
кв. 23, уч. а	Ильмов. пор. съ дубомъ	10260
кв. 24,	Тернъ	4700
" " уч. д	Ясень, остр. клень	7240
" " уч. е	Татарск. клень	8600
" " уч. з	Желт. ак., ясень, дубъ	7720
" " уч. і	Тат. клень, дубъ, ясень, клень остр. . .	7760
кв. 25, уч. а	Ильмов. породы, ясень	9320 ¹⁾
кв. 33, уч. а	Дубъ, клень тат. и острол.	8440
" " уч. б	Бѣл. акація (1879 г.)	13340
" " уч. в	Желтая акація съ дубомъ	12940
кв. 53, уч. а	Ясень, берестъ	5420
кв. 58, уч. б	Ясень, берестъ, клень остр.	7820
кв. 59, уч. а	Ясень, берестъ, клень остр.	8100
кв. 53, уч. б	Ясень, берестъ, дубъ	13600

¹⁾ Припоминая количества ежегодно-опавшей листвы въ этихъ кварталахъ (см. выше), мы изъ только что приведенныхъ цифръ можемъ, такимъ образомъ, заключить, какъ слабо разлагается въ данномъ районѣ лѣсная подстилка.

Примѣчаніе. Проф. Костычевъ („Почвы черноз. обл. Россіи“, 1886, стр. 92), опредѣляя количество подстилки въ Вел.-Анад. лѣсу, нашелъ въ одномъ мѣстѣ 940,53 пуда на дес., въ другомъ — 418,55 пуд. Въ какихъ именно кварталахъ производились наблюденія—авторъ не указываетъ.

Если-бы мы пожелали теперь вычислить, какое количество атмосферной воды может задержаться лѣсной подстилкой въ силу влагоемкости послѣдней, то, даже взявши кварталъ съ наиболѣе мощно-развитымъ покровомъ (кв. 17, уч. i, — гдѣ подстилки приходится на площ. 1 дес. 23840 kgr.), и предположивши, что покровъ этотъ обладаетъ наибольшей изъ всѣхъ найденныхъ нами величинъ влагоемкостью ($738, 9\%$) — мы и тогда получимъ цифру (около 176.416 kgr.), которая по сравненію съ общей массой атмосферной воды, доходящей до мертвой подстилки (3.264.000 kgr.), едва-ли представляетъ собой какое-либо существенное значеніе въ смыслѣ возможности обдѣлннїя почвы влагой. Значительно меньшія еще цифры мы получимъ, если обратимся къ другимъ кварталамъ, обладающимъ гораздо болѣе бѣднымъ покровомъ, съ влагоемкостью гораздо болѣе низкой (какъ результатъ болѣе молодого возраста насажденій): въ отдѣльныхъ случаяхъ указанная выше цифра можетъ тогда сократиться еще въ 8—10 разъ.

Сопоставляя всѣ эти данныя между собою — мы, такимъ образомъ, приходимъ къ заключенію, что мертвый растительный покровъ, накопляющійся въ лиственныхъ лѣсахъ, хотя и обладаетъ весьма высокой влагоемкостью, но, какъ показали то соотвѣтствующія конкретныя перечисленія, существенной роли, въ смыслѣ оказываемаго имъ препятствія проникновенію атмосферныхъ осадковъ въ почву, — играть не можетъ.

Притомъ, цѣлый рядъ другихъ, побочныхъ, соображеній заставляеть насъ еще болѣе ограничить тотъ, самъ собой напрашивающійся, выводъ о лѣсной подстилкѣ, какъ дѣятельномъ антагонистѣ проникновенію въ почву осадковъ, который мы готовы были бы сдѣлать на основаніи приведенныхъ выше, весьма крупныхъ цифръ, характеризующихъ ея влагоемкость.

Дѣйствительно, если предположить несуществующій въ природѣ случай, что все годовое количество осадковъ ниспадаетъ болѣе или менѣе одинаковыми, малыми порціями каждый день

и, такимъ образомъ, постепенно насыщаетъ лѣсную подстилку, то, — принимая во вниманіе и ежедневное испареніе части поглощенной воды обратно въ воздухъ, — возможно, что пришлось-бы признать мертвый растительный покровъ нѣкоторымъ тормазомъ въ процессахъ увлаженія лѣсныхъ почвъ атмосферными осадками. Но въ природѣ мы замѣчаемъ иное. Обращаясь напр., къ тому району, въ которомъ производились мои наблюденія, мы прежде всего должны отмѣтить характерное распредѣленіе осадковъ по времени; такъ, напр., въ теченіе мая, іюня, іюля и августа, по даннымъ г. Адамова ¹⁾, выпадаетъ 199,1 мм. осадковъ, т. е. ровно половина общаго годового количества ихъ; при этомъ, какъ извѣстно, упомянутые лѣтніе осадки въ нашей черноземной полосѣ выпадаютъ обычно въ видѣ быстро-проходящихъ ливней. Естественно, что такіе ливни, въ силу хотя-бы физическаго закона тяжести—въ значительно меньшихъ количествахъ будутъ задерживаться листвою деревьевъ и тѣмъ самымъ болѣе быстро доведутъ до полнаго насыщенія лѣсную подстилку, а, слѣдовательно, будутъ имѣть значительно болѣе шансовъ достигнуть почвенныхъ горизонтовъ, чѣмъ, напр., слабые морозящіе дожди.

Но главнымъ факторомъ насыщенія мертвого лѣснаго покрова до полной влагоемкости являются, конечно, тѣ атмосферные осадки, которые выпадаютъ въ твердомъ видѣ (снѣгъ, градъ и т. п.). Приурочиваясь къ глубокой осени и зимѣ, когда деревья стоятъ голыя, лишенные листвы,—осадки эти, лишь въ ничтожныхъ количествахъ задерживаемые вѣтвями, почти цѣликомъ падаютъ на поверхность данной почвы. Скопываясь тамъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ видѣ болѣе или менѣе мощнаго снѣжнаго покрова, осадки эти, съ наступленіемъ весны, даютъ огромное количество талой воды, которая, насыщая лѣсную подстилку, проникаетъ въ почву и, такимъ

¹⁾ 1. с.

образомъ, способствуетъ сильному увлажненію послѣдней. Нѣсколько же ниже — мы убѣдимся, что въ силу особыхъ физическихъ свойствъ мертваго растительнаго покрова, послѣдній, разъ пропустивши черезъ себя воду, съ большимъ трудомъ отдастъ ее обратно въ атмосферу—даже при наличности кругомъ оптимальныхъ условій для испаренія; въ такомъ случаѣ онъ можетъ самъ высохнуть до конца, но, отбня нижележащую почву, идеальнымъ образомъ предохранить ее отъ потери даже ничтожнаго количества воды. Въ дѣйствительности же, какъ извѣстно, въ лѣсу далеко не наблюдаются благопріятныя условія для испаренія влаги съ поверхности почвы—въ силу и меньшей инсоляціи, и болѣе низкой t° и болѣе слабыхъ вѣтровъ, чѣмъ въ открытомъ, безлѣсномъ пространствѣ ¹⁾).

Посмотримъ же, какой запасъ воды въ описываемомъ лѣсу скопится къ веснѣ въ видѣ снѣжнаго покрова. Оказывается, что за декабрь, январь, февраль и мартъ, — каковыя мѣсяцы имѣютъ среднія годовыя t° (за 9 лѣтъ наблюденій) съ мину-сами — выпадаетъ осадковъ до 103, 2 мм. или, перечисляя на вѣсъ—около 990.000 kgr., т. е., немного болѣе $\frac{1}{4}$ общаго годового ихъ количества; и все это количество осадковъ, можно признать, почти цѣликомъ идетъ на увлажненіе мертваго покрова,—если не считать ничтожнаго количества задержавшагося снѣга на голыхъ вѣтвяхъ.

Всѣми этими соображеніями смягчается еще болѣе вопросъ о той отрицательной роли растительнаго мертваго покрова,

¹⁾ По опытамъ Ebermayer'a („Die physik. Einwirkungen des Waldes auf Luft und Boden“, 1873, s. 159.; также—„Einfluss der Wälder auf die Bodenfeuchtigkeit“, 1900 s. 7), —почва подъ пологомъ лѣса (безъ подстилки) испаряетъ на 64% или въ 2, 7 разъ меньше, чѣмъ почва внѣ лѣса. Другими словами — если почва, не покрытая лѣсомъ, испаряетъ въ определенное время 100 единицъ воды, то почва подъ пологомъ лѣса теряетъ всего 36 единицъ (безъ подстилки; съ растительнымъ же мертвымъ покровомъ — всего 15 единицъ).

которую играет послѣдній въ общемъ гидрологическомъ балансѣ почвы, покрытой лѣсомъ, и которая невольно сама напрашивалась — при разсмотрѣніи вышеприведенныхъ, весьма высокихъ, какъ мы видѣли, цифръ влагоемкости этого объекта.

Такимъ образомъ, — время выпаденія атмосферныхъ осадковъ и характеръ этого выпаденія, могутъ въ извѣстныхъ районахъ, при извѣстныхъ климатическихъ и погодныхъ условіяхъ, въ значительной мѣрѣ парализовать описываемыя нежелательныя свойства мертваго покрова. Какъ увидимъ ниже — знакомство съ нѣкоторыми другими физическими свойствами этого объекта дастъ намъ возможность еще болѣе смягчить заключеніе о лѣсной подстилкѣ, какъ о дѣятельномъ антагонистѣ проникновенію атмосферной влаги въ почву.

Въ мои задачи не входитъ сейчасъ разсмотрѣніе и изученіе общаго вопроса о влажности лѣсной почвы. Какъ извѣстно, — послѣднее явленіе представляетъ собой функцію цѣлаго ряда производныхъ: количества выпадающихъ осадковъ надъ лѣсомъ, характера, возраста и густоты насажденія, интенсивности транспираціи и потребленія почвенной влаги тѣмъ или другимъ лѣснымъ массивомъ, распредѣленія въ лѣсу t° , силы инсоляціи въ немъ, физико-механическихъ свойствъ самой почвы и пр. и пр. Во всей этой сложной массѣ самыхъ разнообразныхъ факторовъ — мертвый растительный покровъ является лишь одной изъ производныхъ, вносящей и свою долю участія въ этотъ общій балансъ влаги лѣсной почвы. И ближайшей задачей всѣхъ описываемыхъ мною въ I-й главѣ опытовъ является, какъ о томъ я имѣлъ случай говорить еще выше, — изученіе водныхъ свойствъ лишь даннаго элемента лѣсного сообщества, чтобы на основаніи знакомства съ физическими свойствами этого объекта, можно было бы составить себѣ понятіе о той гидрологической роли, которую можетъ играть онъ при различныхъ природныхъ условіяхъ. Мнѣ кажется, что и выясненіе общаго вопроса — влажности лѣсной почвы, вообще — только тогда ста-

нетъ на твердую, научную почву, когда явленіе это мы расчленимъ на рядъ отдѣльныхъ вопросовъ, и когда изучимъ въ этомъ вопросѣ роль каждаго изъ вышеупомянутыхъ факторовъ— въ отдѣльности. Приведеніе же цифръ влажности почвы— напр., покрытой лѣсомъ и непокрытой,—полученныхъ прямымъ непосредственнымъ путемъ и представляющихъ собой лишь суммарный итогъ самыхъ разнообразныхъ, часто взаимно-парализующихъ моментовъ,— правда, быстрѣе и легче подвинетъ насъ къ разрѣшенію общаго практическаго вопроса, на сколько влажна въ данный моментъ та или другая почва, но едва ли способствовать будетъ научному пониманію даннаго явленія. Не этимъ ли между прочимъ, надо объяснить себѣ всю ту массу несогласованныхъ между собой, а часто и противорѣчивыхъ цифровыхъ данныхъ, которыя окружаютъ вопросъ о влажности лѣсной почвы и которыя въ общей своей совокупности представляютъ собой въ настоящее время богатѣйшую литературу? Мнѣ думается, что какъ при сужденіи, напр., о доходности того или другого хозяйства было бы ошибочнымъ прибѣгать лишь къ огульному, суммарному подсчету доходовъ и расходовъ, не анализируя характера и направленія отдѣльныхъ отраслей даннаго хозяйства, такъ и въ сужденіяхъ о влажности, напр., лѣсной почвы, настоятельно необходимо подвергнуть изученію съ этой стороны—именно отдѣльные элементы лѣсного сообщества. Никакъ нельзя поэтому согласиться съ г. Отоцкимъ, который въ своей работѣ ¹⁾, приведя вкратцѣ западно-европейскую литературу, касающуюся изученія именно упомянутыхъ нами отдѣльныхъ производныхъ (транспираціи растеніями, стока воды съ поверхности почвы, испаренія ея съ кроны деревьевъ и т. п.)—въ заключеніе говоритъ: „...Ни одно наблюдение, ни одинъ опытъ изъ перечисленныхъ выше, ни даже вся ихъ совокупность ²⁾, не въ состояніи дать столь яснаго

¹⁾ „Грунтовая вода“, 1905.

²⁾ Курсивъ вездѣ мой.

представленія о гидрологическомъ дѣйствіи лѣса въ природѣ, какъ одновременныя параллельныя измѣренія влажности естественной почвы въ лѣсу и внѣ его. И можно только удивляться тому странному факту, что въ Зап. Европѣ, гдѣ было потрачено столько времени, силъ и остроумія на изслѣдованія и опыты, болѣе или менѣе искусственные, влажность почвы въ природной, нетронутой обстановкѣ опредѣлялась весьма рѣдко“ ... (стр. 279).

Итакъ, поставивъ задачей I-ой главы настоящей работы— изученіе физическихъ свойствъ мертвого растительнаго покрова, какъ естественнаго комплекса (съ точки зрѣнія отношенія послѣдняго пока къ влагѣ) и ознакомившись съ тѣми данными, которыя получены были мною при изслѣдованіи влагоемкости образцовъ лѣсной подстилки, собранныхъ въ лиственномъ Вел. Анад. Лѣсѣ, — мы перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію тѣхъ данныхъ, которыя имѣются у меня относительно влагоемкости подстилки, скопляющейся въ хвойномъ насажденіи ¹⁾.

¹⁾ Кромѣ Вел. Анад. Лѣса мною были поставлены наблюденія надъ влагоемкостью лѣсныхъ подстилокъ нѣкоторыхъ лиственныхъ насажденій и другихъ районовъ (Виленск. губ., Ошмянск. у.; Курская губ., Львовск. у.; Рязанская губ., Рязск. у.; и др.), но наблюденія эти носили, въ большинствѣ случаевъ, случайный характеръ — безъ учета общаго количества накопившейся подстилки, внѣ связи съ возрастомъ насажденія и пр., а потому я на нихъ и не останавливаюсь. Укажу только, что влагоемкость нѣкоторыхъ мертвыхъ покрововъ, накаплиющихся въ очень старыхъ естественныхъ лѣсахъ, достигаетъ иногда весьма крупной цифры, часто даже превышающей соотвѣтствующія величины, найденныя по отношенію къ наиболѣе старымъ и здоровымъ кварталамъ Вел. Анад. Лѣса. Основываясь на нашихъ опытахъ, приведенныхъ на стр. 15 — фактъ этотъ надо объяснить, конечно, тѣмъ, что въ лѣсахъ этихъ мы имѣемъ дѣло съ весьма разложенной, почти гумусо-подобной, формой лѣсной подстилки.

Приведу нѣкоторыя цифры:

Старый смѣшанный лѣсъ (глав. обр., осина) Виленск. губ.,	
Ошмянск. у.— Влагоемкость подстилки	= 887,5%
Старый смѣшанный лѣсъ (гл. обр., дубъ) Курской губ.,	
Львовск. у.—Влагоемкость подстилки	= 793,6%
Старый смѣшанный лѣсъ (гл. обр., осина, береза) Ряз. губ.,	
Рязск. у.—Влагоемкость подстилки	= 988,9%

и т. п.

Матеріаль собранъ мною, главнымъ образомъ, въ сѣверномъ районѣ; результаты изслѣдованія съ краткимъ описаніемъ взятыхъ образцовъ, сведены въ слѣдующей таблицѣ:

Откуда взятъ образецъ подстилки.	Влагоемкость подстилки въ % къ воздушно-сухому веществу. Среднее изъ 2-хъ опредѣленій.
1) Еловая подстилка изъ подъ чистаго еловаго лѣса, лѣтъ 25-ти (Виленск. губ. Ошмянск. у.). .	117,3
2) Тоже—Псковск. губ. (с. Быстрцово). 20-ти лѣтъ.	121,0
3) Тоже—Петербургск. губ. Лужск. у. 15-ти лѣтъ.	127,3
4) Подстилка изъ - подъ стараго сосноваго лѣса лѣтъ 60-ти (Калужской губ.).	139,0
5) Тоже—изъ - подъ молодого сосноваго лѣса (лѣтъ 12-ти)	109,3
6) Еловая подстилка изъ-подъ молодого (лѣтъ 10-ти) лѣса Петербургск. губ. (с. Любань)	114,7

Разсматривая эти цифры и сравнивая ихъ съ тѣми данными, которыя получены были нами по отношенію къ листовнымъ насажденіямъ, мы можемъ сдѣлать заключеніе, во 1-хъ, что влагоемкость подстилокъ, скопляющихся въ хвойныхъ лѣсахъ, значительно ниже, по сравненію съ подстилкой листовныхъ и во 2-хъ, что рѣзкой разницы между молодыми и старыми насажденіями здѣсь совершенно не наблюдается (въ листовныхъ насажденіяхъ, какъ мы видѣли, разница эта сказывается, наоборотъ, весьма рельефно).

Остановимся, прежде всего, на этомъ послѣднемъ выводѣ. Если намъ не удастся подмѣтить крупной разницы въ величинахъ влагоемкости лѣсной подстилки, накопляющейся въ старыхъ и молодыхъ хвойныхъ насажденіяхъ, то, казалось-бы, мы должны признать, что старыя, а слѣдовательно, и болѣе разложенныя формы хвои обладаютъ приблизительно такой-же водоудерживающей силой, какъ и молодыя, свѣжія, т.-е. другими словами, должны принять положеніе, явно противорѣчащее и нѣкоторымъ теоретическимъ соображеніямъ (напр., что гумификація органическаго вещества ведетъ, вообще говоря, къ повышенію влагоемкости послѣдняго) и идущее въ разрѣзъ съ

тѣми опытными данными, которыя получены были нами при изученіи аналогичнаго вопроса у лиственныхъ породъ. Мнѣ кажется, однако, что противорѣчіе это лишь кажущееся. Дѣло въ томъ, что, какъ это было указано мною еще раньше ¹⁾, хвоя представляетъ собой объектъ, весьма трудно и медленно разлагающійся — быть можетъ, въ силу присутствія въ ея составѣ довольно большого количества смолистыхъ, антисептическихъ веществъ, или въ силу особаго устройства клѣточныхъ стѣнокъ и т. п. Насколько, дѣйствительно, объектъ этотъ трудно поддается разложенію, видно изъ сравненія количествъ зольныхъ соединений, переходящихъ въ водный растворъ, при процессахъ разложенія этого объекта, съ соотвѣтствующими цифрами полученными для другихъ растительныхъ матеріаловъ. Такъ, напр., ²⁾:

Перешло въ водный растворъ (въ % отъ первоначальнаго количества) изъ хвой сосны, разлагавшейся въ теченіе 1 года 8 мѣсяцевъ, изъ листьевъ дуба и изъ степного сѣна.

	Изъ хвой сосны. %	Изъ листьевъ дуба. %	Изъ степного сѣна. %
<i>SiO₂</i>	20,00	63,98	78,93
<i>K₂O</i>	14,77	78,15	71,40
<i>Na₂O</i>	9,14	73,04	81,13
<i>P₂O₅</i>	12,44	75,17	82,95
<i>Fe₂O₃</i>	18,63	70,81	79,14
<i>Mn₂O₃</i>	14,19	53,87	87,33

и т. д.

Въ виду такой необычайно медленной разлагаемости описываемаго объекта и крайне затрудненныхъ процессовъ его гумификаціи — мы должны предположить, что какъ въ старыхъ, такъ и въ болѣе молодыхъ хвойныхъ насажденіяхъ, мы имѣемъ дѣло часто съ мало измѣненнымъ процессами разложенія матеріаломъ, почему и получаемъ цифры влагоемкости его

¹⁾ С. Кравковъ — „Матеріалы къ изученію процессовъ разложенія растительныхъ остатковъ въ почвѣ“, 1908, стр. 73.

²⁾ Ibid., стр. 66 и 67.

мало отличающіяся другъ отъ друга. Дѣйствительно, если даже въ условіяхъ только что описаннаго опыта (кстати сказать — крайне благопріятныхъ для процессовъ разложенія и съ точки зрѣнія t° , и доступа воздуха и степени увлаженія) объектъ этотъ подвигался въ своемъ разложеніи очень и очень туго, то въ природныхъ условіяхъ, значительно менѣе благопріятныхъ, — процессъ этотъ долженъ совершаться, конечно, еще съ большимъ трудомъ. Въ этомъ впрочемъ не трудно убѣдиться и непосредственнымъ наблюденіемъ: извѣстно, что лѣсная подстилка въ хвойныхъ насажденіяхъ, взятая даже изъ болѣе глубокихъ своихъ слоевъ часто представляетъ собой мало измѣнившуюся, по своей формѣ и консистенціи, хвою ¹⁾, между тѣмъ какъ лѣсная подстилка лиственныхъ лѣсовъ, наоборотъ, даже и не въ слишкомъ глубокихъ своихъ горизонтахъ, представляетъ собой, въ большинствѣ случаевъ, безформенную, гумусоподобную массу.

Ничѣмъ инымъ, какъ именно слабой и медленной разлагаемостью хвои, надо объяснить себѣ и тотъ фактъ, что, несмотря на слабый (сравнительно съ лиственными породами) ежегодный ея отпадъ, тѣмъ не менѣе, даже и въ молодыхъ хвойныхъ насажденіяхъ мертвый растительный покровъ накапливается довольно мощный.

Чтобы окончательно убѣдиться въ томъ, что хвоя, подвергающаяся длительнымъ процессамъ разложенія, мало сравнительно измѣняетъ съ теченіемъ времени свою водоудерживающую способность, я непосредственно опредѣлил влагоемость этого объекта, взявши его на различныхъ стадіяхъ разложенія.

Для описываемаго опыта послужила хвоя ели (въ количествѣ 25 gr.), которая продолжительное время разлагалась въ помѣщеніи лабораторіи (при влажности, равной $\frac{1}{2}$ влагоемкости ея), и надъ которой велись особыя спеціальныя наблюденія (надъ процессами ея постепенной гумификаціи).

¹⁾ Особенно хорошо это наблюдать, высушивши такую подстилку.

Результаты сведены съ слѣдующей таблицѣ:

На какой стадіи разложенія взятъ былъ объектъ.	Влагоемкость его въ % къ воздушно-сухому веществу
1. Свѣжая хвоя ели, собранная непосредственно съ дерева	98,0
2. Хвоя, разлагавшаяся въ теченіе 3 мѣсяцевъ. .	103,3
3. Хвоя, разлагавшаяся въ теченіе 7 мѣсяцевъ. .	107,5
4. Хвоя, разлагавшаяся въ теченіе 11 мѣсяцевъ .	120,8

Повышеніе влагоемкости параллельно степени разложенности матеріала наблюдается, правда, и здѣсь, но въ крайне какъ видимъ, слабомъ видѣ. Обращаясь теперь къ нашему первому выводу, показывающему, что лѣсная подстилка хвойныхъ насажденій обладаетъ, вообще говоря, крайне слабой (сравнительно съ лиственными породами) водоудерживающей силой,—постараемся, какъ мы это сдѣлали по отношенію къ подстилкѣ Велико-Анадольскаго лѣса, облечь полученныя цифры въ болѣе конкретную форму.

Но прежде укажу на то, что цѣлый рядъ побочныхъ соображеній складывается, повидимому, далеко не въ пользу легкаго и безпрепятственнаго поступленія атмосферныхъ осадковъ въ почву изъ-подъ хвойнаго насажденія (данныхъ районовъ). Во-первыхъ, хвойныя породы не обрасываютъ своей листвы въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ; и въ то время, какъ въ лиственныхъ лѣсахъ всѣ зимніе осадки, въ видѣ снѣга, крупы и т. п. почти совершенно не задерживаются голыми, обезлиственными вѣтвями, и безпрепятственно скопляются на поверхности лѣсной почвы въ теченіе ряда мѣсяцевъ, послѣ чего, постепенно тая, легко напояютъ весной подстилку до полнаго насыщенія—въ хвойныхъ насажденіяхъ, стоящихъ все зимнее время съ листвой, наоборотъ,—указанное явленіе далеко не можетъ играть равноцѣнной, сравнительно съ лиственнымъ лѣсомъ, роли. Далѣе, необходимо указать, что въ описываемомъ районѣ не приходятъ на помощь лѣсной почвѣ—ни какой-либо свое-

образный характер выпаденія атмосферныхъ осадковъ, ни какое-либо особенное распредѣленіе ихъ по времени, какъ то мы видѣли по отношенію къ первому, южному району. Дѣйствительно, осадки эти распредѣляются здѣсь по отдѣльнымъ мѣсяцамъ довольно равномерно ¹⁾:

	mm.		mm.		mm.		mm.
Январь . . .	36,2	Апрѣль . . .	44,6	Іюль	72,5	Октябрь . . .	39,6
Февраль . . .	17,4	Май	47,6	Августъ . . .	70,5	Ноябрь	27,9
Мартъ	38,0	Іюнь	59,8	Сентябрь . . .	47,4	Декабрь . . .	32,1

и характерныхъ для степной полосы ливней, когда въ теченіе нѣсколькихъ часовъ сразу выпадаетъ огромное количество осадковъ—здѣсь обычно не наблюдается и т. д.

Все это факты, которые, казалось-бы, уменьшаютъ шансы легкаго насыщенія хвойной подстилки до полной влагоемкости, а, слѣдовательно, и передачи ею возможнаго излишка воды въ почву. Однако, ближайшее разсмотрѣніе даннаго вопроса приводитъ насъ совершенно къ инымъ результатамъ. Вернемся съ этой цѣлью къ нашимъ подсчетамъ.

Какъ велико количество ежегодно выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ въ наблюдаемыхъ районахъ? Въ видѣ примѣра разсмотримъ лишь нѣкоторые изъ послѣднихъ. Для Лужскаго у. С.-Петербургской губ. мы имѣемъ цифры Запольской Оп. Станціи, дающей для этой мѣстности 533,6 mm. осадковъ ²⁾; для с. Быстрецово (Псковской губ.) можемъ воспользоваться данными, имѣющимися для г. Пскова—538,7 mm.; ³⁾ и для с. Любани—543,2 mm. ⁴⁾. Въ среднемъ можемъ принять, что въ упомянутыхъ пунктахъ выпадаетъ болѣе или менѣе одинаковое количество осадковъ (около 538,5 mm.); переводя

¹⁾ Вильдъ—„Новыя многолѣтнія и пятилѣтнія среднія количества осадковъ и числа дней съ осадками для Россійской Имперіи“, 1895 г., стр. 7 (для Запольской Оп. Станціи).

²⁾ Вильдъ I. с.

³⁾ Ibid., стр. 8.

⁴⁾ Ibid., стр. 8.

это число на вѣсъ, скажемъ, что на пространствѣ 1 дес. выпадаетъ въ теченіе года въ данномъ районѣ 5.164.800 kgr. воды. Но извѣстно, что не все это количество, выпадающее надъ хвойнымъ лѣсомъ, достигаетъ мертвого растительнаго покрова; часть этихъ осадковъ задерживается кронами и путемъ послѣдующаго испаренія снова возвращается въ атмосферу. Согласно даннымъ Ебермайер'а ¹⁾—мы можемъ признать, что въ среднемъ задерживается кронами хвойныхъ насажденій около 35% годового количества осадковъ. Такимъ образомъ, до поверхности мертвого покрова достигнетъ осадковъ по вѣсу 3.357.120 kgr. Влагоемкость хвойныхъ подстилокъ, изслѣдованныхъ нами въ упомянутыхъ трехъ пунктахъ, даетъ, какъ мы видѣли, довольно близкія другъ другу цифры, почему схематически мы можемъ признать, что для лѣсныхъ насажденій разсматриваемыхъ районовъ влагоемкость эта равняется, въ среднемъ, 120%.

Чтобы рѣшить теперь вопросъ, какая-же часть выпадающихъ надъ лѣсомъ осадковъ задерживается лѣсной подстилкой, въ силу влагоемкости послѣдней, и такимъ образомъ, не достигаетъ почвенныхъ горизонтовъ,—надо знать количество этой подстилки въ данныхъ насажденіяхъ. Мои наблюденія дали слѣдующія въ этомъ отношеніи цифры (перечисляю величины, полученные мною съ пространства 1 кв. арш. прямо на десятину):

Мѣсто наблюденій.	Количество подстилки въ Kgr на 1 дес. (воз.—сух.).
Псковской губ. (Быстрцово)	14847
Петербургской губ. (Лужск. у.)	11824
Петербургской губ. (с. Любавь)	10306
	Среднее—12326

Найденное количество подстилки можетъ задержать въ себѣ, въ силу своей влагоемкости, слѣдовательно, всего лишь

¹⁾ Ebermayer—Einfluss der Wälder auf die Bodenfeuchtigkeit“... etc. 1900, s. 5.

около 14.800 kgr. воды (изъ общаго годового количества осадковъ, достигающихъ мертваго покрова въ 3.357.120 kgr. — на площ. 1 дес.).

Такимъ образомъ, на примѣрѣ хвойныхъ насажденій, мы еще болѣе убѣждаемся въ томъ, что водоудерживающая способность мертваго покрова ни въ коемъ случаѣ не можетъ считаться серьезнымъ препятствіемъ поступленію атмосферныхъ водъ въ почвенные горизонты: соотвѣтственный учетъ показалъ намъ, что этимъ путемъ задерживается лишь ничтожная сравнительно часть всѣхъ выпадающихъ въ этихъ насажденіяхъ осадковъ. Какая именно часть—это вопросъ зависящій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, конечно, отъ цѣлаго ряда привходящихъ условій: отъ количества накопившейся въ данномъ лѣсу подстилки, отъ степени ея разложенности, отъ состава ея и т. п., съ другой стороны—отъ времени и характера выпаденія атмосферныхъ осадковъ (не говоря уже о количествѣ ихъ) и т. д.

Сдѣланные нами, на основаніи конкретныхъ перечисленій, выводы, конечно, не исчерпываютъ вопроса объ общемъ гидрологическомъ балансѣ лѣсной почвы; какъ я говорилъ объ этомъ выше, здѣсь необходимо принимать во вниманіе цѣлый рядъ и другихъ производныхъ, отъ которыхъ зависитъ вообще влажность той или другой почвы, какъ-то силу транспираціи, энергію стока воды, силу испаренія послѣдней, t° воздуха, характеръ и возрастъ насажденія, физико-механическія и химическія свойства почвы и пр. и пр.—но все это не входитъ въ наши задачи, ограничивающіяся, какъ мы видѣли, пока лишь изученіемъ водныхъ свойствъ одного изъ такихъ производныхъ—а именно свойствъ мертваго растительнаго покрова.

Едва ли не болѣшій интересъ представляетъ собой изученіе другого аналогичнаго комплекса, а именно—того мертваго растительнаго покрова, который скопляется на поверхности дѣвственныхъ степныхъ почвъ—въ видѣ такъ называемаго „стелнаго войлока“. Какъ извѣстно, — наши

степные почвы сыграли в истории развития науки о почвах решающую роль. Их своеобразный генезис, оригинальное строение, наконец, высокое богатство питательными веществами, все это не могло не останавливать на себе уже издавна внимания многих исследователей, а специальные и острые вопросы о влажности чернозема и о тѣхъ мѣрахъ, которыя способствовали бы накопленію въ немъ этой влаги,—какъ главнаго фактора, находящагося въ упомянутыхъ районахъ въ minimum'ѣ, придавали и придаютъ работамъ, касающимся нашихъ степныхъ почвъ особый, можно сказать, злободневный интересъ. Но просматривая громадную литературу, касающуюся степныхъ почвъ — мы, однако, совсѣмъ не находимъ указаній на свойства и значеніе того мертвого растительнаго покрова, который является столь характернымъ для дѣйственныхъ почвъ чернозема. Правда,—нетронутыхъ, нераспаханныхъ участковъ въ нашемъ степномъ краѣ осталось уже немного, и центр тяжести въ изученіи чернозема естественнымъ ходомъ вещей перенесенъ теперь на почвы культурныя,—но, исходя изъ мысли, что изученіе именно естественныхъ типовъ почвъ — въ томъ видѣ, какъ даны онѣ природой, представляетъ собой особый интересъ,—необходимо, конечно, подвергнуть детальному изученію и одинъ изъ неизбѣжныхъ элементовъ такихъ почвъ — тотъ мертвый растительный войлокъ, который скопляется на ихъ поверхности. Если не считать одной изъ моихъ давнихъ работъ ¹⁾, касающейся притомъ лишь вскользь интересующаго насъ сейчасъ вопроса, то, какъ я уже сказалъ выше, другихъ какихъ-либо литературныхъ данныхъ по изученію „степного войлока“ мы до сихъ поръ не имѣемъ.

Все это побудило меня подвергнуть ближайшему изслѣдованію водныя свойства и даннаго объекта.

„Степной войлокъ“, полученъ былъ мною изъ Деркуль-

¹⁾ С. Кравковъ. „Изслѣдованія надъ нѣкоторыми физич. свойствами чернозема дѣйственной степи“, 1900, стр. 19—22. ...

ской степи, Старобѣльск. у., Харьковской губ. Деркульская степь представляет собой, можно сказать, типичную бовыльную дѣвственную степь съ типичными представителями растительнаго царства—ковылемъ, типцомъ, тонконогомъ и пр., и животнаго—сусликомъ, кротомъ, стрепетомъ и др., и даетъ намъ „типичнѣйшій образчикъ безлѣсной, открытой степи, какъ-бы намѣренно выставленной на волю бурямъ, вѣтрамъ, зною и засухамъ“ (проф. Докучаевъ) ¹⁾. „Степной войлокъ“, находящійся на поверхности дѣвственной степной почвы, представляет собой, какъ извѣстно, различныя отмершія части степной растительности, такъ тѣсно между собой сплетенныя, что ихъ свободно можно отдирать, не нарушая цѣлости, отъ поверхности почвы. Мощность даннаго объекта сравнительно небольшая—по крайней мѣрѣ для описываемаго района (около 2—3 сант.), и значительно уступающая мощности лѣсной подстилки. На пространствѣ 1 дес. его скопляется, по моимъ прежнимъ наблюденіямъ, всего около 3028 kgr. (возд.—сух.). Влагоемкость его также сравнительно невысокая и равняется 276,3% (среднее изъ 3 опредѣленій). Что касается годового количества осадковъ, выпадающихъ въ описываемомъ районѣ, то сводочныя данныя г. Адамова за 9 лѣтъ показываютъ ²⁾, что въ Деркульской степи выпадаетъ втеченіе года—410,0 мм. осадковъ, распредѣляясь по отдѣльнымъ мѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ:

	mm.		mm.
въ Январѣ	16,6	въ Апрѣлѣ	28,4
„ Февралѣ	19,0	„ Маѣ	46,2
„ Мартѣ	21,1	„ Іюнѣ	72,5

¹⁾ Подробное описаніе оро-гидрографіи, геологіи, почвъ и грунтовыхъ водъ даннаго района можно найти въ работѣ гг. Выдрина и Сибирцева („Старобѣльскій участокъ“. Тр. Экспед. Лѣсн. Дѣла, 1894, Т. I, вып. 2); см. также мою работу „Исслѣдованія надъ нѣкоторыми физич. свойствами чернозема дѣвств. степи“, 1900.

²⁾ „Факторы плодородія русскаго чернозема“ стр. 51.

	mm.		mm.
въ Юлѣ	56,9	въ Октябрѣ	264,
„ Августѣ	32,2	„ Ноябрь	24,1
„ Сентябрѣ	34,8	„ Декабрѣ	31,8

т. е., мы видимъ болѣе или менѣе аналогичную картину съ Велико-Анадольскимъ Лѣсничествомъ—и по общему годовому количеству осадковъ, и по характерному распредѣленію ихъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ (когда, напр., въ теченіе 4 однихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ выпадаетъ около $\frac{1}{2}$ годового количества осадковъ) и т. д. Наконецъ, таблицы t° воздуха, относительной влажности его ¹⁾ и пр. даютъ намъ возможность, вообще говоря, считать внѣшнія климатическія условія, въ которыхъ находится Велико-Анадольской лѣсъ и Деркульская степь, болѣе или менѣе аналогичными, что въ значительной степени, конечно, увеличиваетъ интересъ общаго вопроса—насколько полно и въ какомъ направленіи используются тѣ же самые климатическіе факторы почвой степной и почвой, покрытой лѣсной растительностью. Не входя въ обсужденіе этого обширнаго вопроса во всемъ его объемѣ, что, какъ мы видѣли, требуетъ предварительнаго сложнѣйшаго учета самыхъ разнообразныхъ производныхъ, и касаясь лишь частнаго вопроса, какое участіе въ общемъ гидрологическомъ балансѣ той или другой почвы играетъ, скопляющійся на поверхности послѣдней, мертвый растительный покровъ, мы можемъ, такимъ образомъ, по отношенію къ „степному войлоку“, на основаніи приведенныхъ выше цифръ, сказать, что антагонистическое дѣйствіе его проникновенію въ степную почву атмосферныхъ осадковъ выражается слишкомъ ничтожной величиной, чтобы придавать послѣдней какое-либо существенное значеніе—особенно принимая во вниманіе цѣлый рядъ благопріятныхъ вліяній на почву мертваго покрова въ смыслѣ отѣненія, ослабленія испаренія проникшей въ почву влаги обратно въ атмосферу и т. д. Дѣйствительно если даже

¹⁾ Ibid., стр. 22, 23; 35 и 37.

въ нашихъ выводахъ относительно Велико-Анадольскаго лѣса, несмотря на довольно значительное количество осадковъ задерживаемыхъ кронами деревьевъ и несмотря на довольно большую (сравнительно) водоудерживающую силу лѣсной подстилки, намъ тѣмъ не менѣе пришлось значительно смягчить (если не совсѣмъ свести на нѣтъ) невольно напрашивающійся приговоръ объ отрицательной роли этого объекта въ увлажненіи поверхностныхъ горизонтовъ почвы, покрытой лѣсомъ, то въ разсматриваемомъ случаѣ (Деркульская степь) данный вопросъ стоитъ еще болѣе опредѣленно; а именно: прежде всего необходимо указать, что до поверхности „степного войлока“ достигаетъ, можно сказать, цѣликомъ все то количество осадковъ, которое выпадаетъ въ данномъ районѣ (около 3.840.000 kgr.), такъ какъ количество задерживаемой воды листьями и стеблями травянистой растительности измѣряется ничтожной величиной—всего въ 1⁰/₀—2⁰/₀ ¹⁾.

Далѣе, въ силу незначительной сравнительно влагоемкости степного войлока, а также крайне малаго его количества, накопляющагося на поверхности почвы, задерживается этимъ объектомъ и не пропускается въ нижележащую почву опять таки сравнительно ничтожное количество выпадающихъ осадковъ—всего, какъ мы видѣли, 8.357 kgr. Такимъ образомъ, непосредственно до почвенныхъ горизонтовъ достигаетъ въ описываемомъ степномъ районѣ все же 3.831.643 kgr. осадковъ. Разъ проникнувъ въ почву, послѣдніе подъ пологомъ „степного войлока“ уже гарантированы будутъ отъ дальнѣйшихъ большихъ потерь путемъ испаренія,—хотя бы при наличности даже весьма высокой t° окружающаго воздуха (въ этомъ мы убѣдимся нѣсколько ниже). Правда, въ открытой степи атмосферные осадки, особенно выпадающіе въ видѣ ливней, часто не успѣваютъ поглощаться почвой и обычно

¹⁾ Ср. Отоцкий—„Грунтовые воды“, 1905, стр. 273.

скатываются въ видѣ огромныхъ потоковъ и даже цѣлыхъ водопадовъ въ овраги, въ пониженныя мѣста, унося съ собой огромное количество мелкоземистаго матеріала, что обычно не наблюдается въ районахъ, покрытыхъ лѣсомъ,—но необходимо отмѣтить, что указанное стеканіе выпавшей воды наблюдается почти исключительно на пашняхъ и залежахъ и что на цѣлинныхъ участкахъ, снабженныхъ мертвымъ растительнымъ „войлокомъ“, упомянутаго явленія, наоборотъ, почти совершенно не бываетъ. По крайней мѣрѣ, мои, многократныя въ этомъ направленіи, наблюденія, приуроченныя какъ разъ ко времени выпаденія ливней, всегда убѣждали меня въ томъ, что на цѣлинныхъ почвахъ совершается весьма полная утилизація атмосферныхъ осадковъ, въ то время какъ на вспаханныхъ поляхъ и на залежахъ, покрытыхъ даже высокорослой растительностью, бушевали въ то время цѣлые бурные потоки. Несомнѣнно, что главнѣйшими причинами указанной, довольно совершенной утилизаціи осадковъ, являются три особенности цѣлинныхъ участковъ: 1) существованіе мертваго растительнаго покрова, поглощающаго и пропускающаго черезъ себя выпадающіе осадки и препятствующаго тѣмъ самымъ стеканію послѣднихъ съ поверхности почвы, тѣмъ дѣйственная степная почва вполнѣ напоминаетъ, такимъ образомъ, почву, покрытую лѣсомъ и снабженную лѣсной подстилкой, представляющей собой, какъ извѣстно, главнѣйшее препятствіе къ этому стеканію; 2) кочковатое строеніе поверхности цѣлинныхъ участковъ (въ силу того, что степные злаки растутъ какъ бы большими пучками, кочками), также способствующее задержанію воды, и наконецъ 3) характерная зернисто-крупитчатая структура дѣйственныхъ степныхъ почвъ, благопріятствующая легкому проникновенію въ нихъ выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ.

Приблизительно то же самое надо сказать про отношеніе цѣлинныхъ участковъ и къ талой водѣ; въ то время какъ въ

степной полосѣ на поляхъ и на залежахъ снѣгъ исчезаетъ крайне быстро, и талыя вешнія воды, образующіяся въ огромныхъ количествахъ, не успѣвая впитаться въ почву — безвозвратно стекаютъ часто бурными мутными потоками въ овраги и рѣки, на дѣйственныхъ цѣлинныхъ почвахъ мы наблюдаемъ, въ силу тѣхъ же трехъ причинъ, несравненно болѣе полное и болѣе совершенное поглощеніе не только лѣтнихъ дождей, но также и снѣговой воды, накопившейся тамъ въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ. Такимъ образомъ, дѣйственные степныя почвы, снабженныя мертвымъ растительнымъ „войлокомъ“, весьма приспособлены, такъ сказать, къ использованію лѣтнихъ и зимнихъ атмосферныхъ осадковъ и указанной способностью до нѣкоторой степени приближаются, можно сказать, къ свойствамъ почвъ, покрытыхъ лѣсомъ. Что касается, наконецъ, болѣе высокой t° окружающаго воздуха въ открытой степи, сравнительно съ лѣсомъ, что ведетъ, казалось бы, къ значительно болѣе интенсивному испаренію влаги изъ почвы, болѣе иссушающаго дѣйствія свободно циркулирующихъ, сравнительно съ лѣсомъ, вѣтровъ, болѣе сильной инсоляціи и пр. и пр., то, какъ мы увидимъ нѣсколько ниже, всѣ эти неблагоприятныя метеорологическія условія, наблюдаемыя въ открытой степи, парализуются, и притомъ въ значительной степени, тѣмъ же мертвымъ „войлокомъ“, являющимся прекрасной охраной отъ испаренія влаги нижележащей почвой даже въ томъ случаѣ, когда самъ этотъ „войлокъ“ въ силу тѣхъ или иныхъ метеорологическихъ окружающихъ условій, потеряетъ влагу до конца.

Всѣми приведенными соображеніями мы вынуждаемся, такимъ образомъ, признать, что въ мертвомъ растительномъ покровѣ, скопляющемся въ дѣйственныхъ почвахъ въ видѣ такъ назыв. „степного войлока“, мы должны видѣть не только не антагониста, перехватывающаго или препятствующаго атмосфернымъ осадкамъ увлажнять нижележащую почву, но, наоборотъ, скорѣе посредника, способствующаго этимъ осадкамъ напоить степную

почву. Многолѣтнія наблюденія надъ влажностью чернозема подъ Деркульской цѣлиной, показываютъ, что изложенныя выше соображенія, выведенныя на основаніи изученія лишь нѣкоторыхъ физическихъ свойствъ „степного войлока“, вполне подтверждаются дѣйствительностью ¹⁾.

В. Водопроницаемость мертвыхъ растительныхъ покрововъ.

Для болѣе полнаго представленія о той роли, которую играетъ тотъ или другой мертвый растительный покровъ въ гидрологическомъ балансѣ нижележащей почвы, необходимо знать, помимо влагоемкости, конечно, и водопроницаемость этого покрова, т.-е. свойство, характеризующее скорость и полноту проникновенія черезъ него выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ.

Наблюденія W. Riegler'a ²⁾ показали, что черезъ слой, мощностью въ 8 см., изъ 500 см. ежедневно приливаемой сверху воды (тонкой струей) просачивалось:

	Черезъ буковую подстилку (возд. — сух.)		Черезъ еловую подстилку (возд. — сух.)		Черезъ моховую подстилку (возд. — сух.)	
	Просочилось.	Задержалось.	Просочилось.	Задержалось.	Просочилось.	Задержалось.
	см.	см.	см.	см.	см.	см.
1-й день . .	400,3	99,7	441,3	58,7	216,0	284,0
2-й „ . .	385,6	114,4	445,1	54,9	105,7	394,4
3-й „ . .	334,8	165,2	440,4	59,6	55,9	444,1
4-й „ . .	353,9	146,1	439,4	60,6	284,4	215,6
5-й „ . .	403,0	97,0	453,5	46,5	375,9	124,1
6-й „ . .	474,4	25,6	489,4	10,6	409,4	90,6
7-й „ . .	465,4	34,6	496,0	4,0	486,7	13,3
8-й „ . .	487,6	12,4	499,6	0,4	493,5	6,5
9-й „ . .	489,3	10,7	—	—	—	—

¹⁾ См. напр., сводочныя данныя Адамова („Факторы плодородія рус. черноз.“ стр. 326 и др.).

²⁾ W. Riegler. „Die Durchlässigkeit der Moosdecken und der Waldstreu für Meteorisches Wasser“ („Forsch. auf dem Geb. der Agrikulturphysik“, III Bd., 1880, S. 80—96).

Т.-е., мы видимъ, что черезъ сухой объектъ вода проходить весьма легко; по мѣрѣ же увлажненія этого объекта притекающей водой, указанная водопроводимость уменьшается; затѣмъ, по мѣрѣ приближенія къ влагоемкости, снова увеличивается. По достиженіи ея, притекающая вода начинаетъ сочиться черезъ матеріалъ совершенно легко, почти уже не задерживаясь имъ. Обращаетъ на себя вниманіе также и тотъ фактъ, что водопроводимость еловой подстилки является наибольшей, притомъ сравнительно мало зависящей отъ степени увлажненія ея. Эта легкая и быстрая водопроводимость хвои опять-таки не можетъ не являться, такимъ образомъ, извѣстнымъ компенсаторомъ тѣхъ неблагоприятныхъ явленій, которыя, какъ мы видѣли выше, создаются хвойнымъ насажденіемъ по отношенію къ выпадающимъ атмосфернымъ осадкамъ—въ смыслѣ довольно большого $\%$ задерживаемой ихъ кронами снѣговой и дождевой воды.

Конечно, на скорость и полноту проникновенія воды въ тотъ или другой растительный матеріалъ не можетъ не оказывать существеннаго вліянія характеръ выпаденія атмосферныхъ осадковъ.

Такъ, по наблюденіямъ W. Riegler'a ¹⁾:

	Черезъ буковую подстилку изъ 500 гр. воды.				Черезъ сосновую подстилку изъ 500 гр. воды.			
	При увлажненіи объекта распыленнойводой.		При увлажненіи объекта сплошной струей воды.		Распыленная вода.		Струя воды.	
	гр.	или	гр.	или			гр.	или
Просочилось воды.	251	50,2%	462	92,4%	427	85,4%	425	85,0%
Поглотилось подстилк.	249	49,8%	38	7,6%	73	14,6%	75	15,0%

По отношенію къ моховой подстилкѣ Riegler'омъ получены были аналогичныя данныя: въ первомъ случаѣ просочи-

¹⁾ W. Riegler. l. c., S. 95—96.

лось воды 30⁰/₀, во второмъ — 86⁰/₀; поглотилось воды: въ первомъ случаѣ 70⁰/₀, во второмъ—14⁰/₀.

Оставляя пока въ сторонѣ хвою сосны и перенося эти немногочисленные выводы въ природу, мы можемъ, такимъ образомъ, сказать, что слабый, морозящій дождь, до тѣхъ поръ, пока не насытитъ мертвого покрова до полной влагоемкости—остается бесполезнымъ для нижележащей почвы; наоборотъ—ливни, и вообще интенсивно выпадающіе осадки, уже первыми своими порціями свободно достигаютъ почвенныхъ горизонтовъ, быстро пронизывая даже и совершенно сухой растительный покровъ, не говоря уже про свободную циркуляцію такихъ осадковъ черезъ данный объектъ послѣ насыщенія его до полной влагоемкости. Что касается хвои сосны, то, насколько можно судить по вышеприведеннымъ немногочисленнымъ даннымъ, объектъ этотъ относится совершенно безразлично къ характеру выпадающихъ осадковъ, и, какъ показываютъ цифры вышеприведенной таблицы, одинаково легко пронизывается водой, выпадаетъ ли послѣдняя въ видѣ ливня, или въ видѣ слабого, морозящаго дождя. Явленіе это находится, какъ мнѣ кажется, въ полномъ соотвѣтствіи съ отмѣченнымъ нами выше фактомъ вообще чрезвычайно легкой водопроводимости данного объекта, притомъ, какъ мы видѣли выше, почти совершенно не зависящей отъ степени его увлаженія. И это свойство хвойнаго покрова мы также отмѣтимъ, какъ фактъ, значительно смягчающій тѣ неблагоприятныя явленія, которыя создаются хвойнымъ лѣсомъ по отношенію къ увлажненію атмосферными осадками почвы, и о которыхъ мы говорили раньше.

Изложенные опыты Riegler'a, несмотря на ихъ искусственность и малочисленность, представляются мнѣ особенно интересными: они затрагиваютъ собой вопросъ не только о водопроводимости различныхъ растительныхъ объектовъ, но, что особенно важно, изучаютъ попутно вліяніе различной влажности на эту водопроводимость и, наконецъ, касаются вліянія на

последнюю характера и силы выпадающих осадковъ. Между тѣмъ, другія имѣющіяся въ литературѣ по этому вопросу данныя, не даютъ намъ возможности такъ детально и подробно прослѣдить самый, такъ сказать, процессъ движенія воды въ томъ или другомъ объектѣ, по отдѣльнымъ моментамъ, ограничиваясь въ большинствѣ случаевъ лишь суммарными, конечными результатами. Изъ указанныхъ работъ необходимо указать, главнымъ образомъ, на тѣ многочисленныя и долготѣтнія наблюденія, которыя велись надъ водопроводимостью различныхъ мертвыхъ растительныхъ объектовъ Wollny ¹⁾. Если мы будемъ просматривать всѣ тѣ таблицы, которыя приведены въ работахъ упомянутаго автора, то прежде всего бросится въ глаза слишкомъ большой промежутокъ времени, избранный имъ для наблюденій, а именно недѣльный срокъ. За эти 7 дней измѣнялось общее количество выпавшаго дождя, и, на основаніи количества просочившейся воды черезъ тѣ или другіе растительные объекты (также въ теченіе 7 дней), составлялось соотвѣтствующее заключеніе о водопроводимости служившихъ для опытовъ объектовъ. Неудивительно, что цифры, полученныя Wollny по отношенію къ различнымъ матеріаламъ, оказались, говоря вообще, мало отличающіяся другъ отъ друга. Такъ, напр., изъ общаго количества дождя въ 32919 см., выпавшаго въ теченіе времени съ 18 апрѣля по 31 октября включительно, просочилось воды (при мощности слоя растительныхъ остатковъ въ 5 см.) слѣдующее количество:

Черезъ хвою сосны . . .	21179 см.
" " пихты . . .	23804 " "
" листья дуба . . .	21142 " "
" " бука . . .	20994 " ")

¹⁾ Wollny. „Forstlich-meteorologische Beobachtungen“, 1888 („Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik“, X Bd., S. 436—439); „Forsch. auf dem Gebiete der Agrikulturphysik“, 1890, XIII Bd., S. 139—141; „Die Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen“, 1897, S. 301.

²⁾ Wollny, l. c., 1890. S. 140.

Въ другомъ рядѣ опытовъ ¹⁾ изъ общаго количества дождя въ 28529 см. выпавшаго въ промежутокъ времени отъ 1 мая по 30 сентября просочилось воды (при мощности слоя изслѣдуемаго объекта въ 30 см.) слѣдующее количество:

Черезъ листья дуба . .	21061 см.	
" " бука . .	21064 "	
" хвою пихты . .	19467 "	
" сосны . .	19734 "	и т. д.

Если мы будемъ разсматривать цифры, характеризующія количество просочившейся воды по недѣлямъ, то встрѣтимся опять-таки приблизительно съ аналогичными для различныхъ объектовъ цифрами, а если и наблюдается между ними та или другая разница, то остается неизвѣстнымъ, обуславливается ли это своеобразнымъ характеромъ и силой выпаденія осадковъ за данную недѣлю или чѣмъ другимъ. Естественно предположить, что за недѣлю наблюдений, изслѣдуемый матеріалъ часто достигалъ полнаго насыщенія и становился, такимъ образомъ, легко водопроницаемымъ, что и сказывалось въ результатѣ въ болѣе или менѣе близкихъ конечныхъ цифрахъ, характеризующихъ водопрускающую способность этихъ объектовъ. Менѣе продолжительные сроки наблюдений могли бы дать совершенно иную картину, что какъ разъ мы и видѣли въ вышеприведенныхъ данныхъ Riegler'a.

Въ своихъ опытахъ надъ водопроницаемостью различныхъ мертвыхъ растительныхъ покрововъ, я пользовался тѣми же самыми объектами, которые служили мнѣ и для наблюдений надъ влагоемкостью ихъ, а именно — лѣсной подстилкой изъ-подъ лиственнаго лѣса, подстилкой хвойнаго лѣса и „степнымъ войлокомъ“.

¹⁾ Ibid., 1898. S. 437 и 438.

I. Опыты съ лѣсной подстилкой лиственнаго лѣса.

Въ этихъ опытахъ я не пытался выяснять вліяніе на водопроводимость того или другого мертваго растительнаго покрова—состава насажденія. Методъ опредѣленія водопроводимости слишкомъ грубъ для того, чтобы уловить тонкую разницу въ водопропускающей способности различныхъ растительныхъ матеріаловъ (опавшихъ листьевъ дуба, осины, березы и пр.). Хотя несомнѣнно, что форма листьевъ той или другой древесной породы, ихъ сравнительный вѣсъ, нѣжность строенія и пр.—не остаются безъ вліянія на характеръ и плотность ихъ взаимнаго расположенія при опаденіи на поверхность почвы, а это обстоятельство не можетъ въ свою очередь не отражаться на скорости и полнотѣ проникновенія черезъ упомянутые объекты ниспадающей атмосферной воды. Но чтобы уловить эту разницу необходимо предварительно выработать значительно болѣе точную методику самого опыта.

Въ виду высказанныхъ соображеній я поставилъ цѣлью своихъ опытовъ лишь выясненіе того вліянія, которое оказываетъ на водопроводимость того или другого вида лѣсной подстилки степень разложенности послѣдней. Выясненіе даннаго вопроса приблизить насъ, до нѣкоторой степени, къ рѣшенію и другого, тѣсно связаннаго съ первымъ и болѣе важнаго вопроса, а именно—вліянія возраста насажденія на водопропускающую способность накопившейся въ этомъ насажденіи подстилки (предполагая, конечно, что чѣмъ оно старше, тѣмъ съ болѣе разложенной формой мертваго покрова мы имѣемъ дѣло).

Исслѣдуемый матеріалъ помѣщался въ количествѣ 150 gr. (возд. сух.) въ цинковый сосудъ цилиндрической формы (діам. 15 с.) снабженный сѣтчатымъ дномъ, при нѣкоторомъ уплотненіи, съ такимъ расчетомъ, чтобы матеріалъ этотъ занималъ въ сосудѣ

слой, мощностью въ 16 сант. Упомянутый сосудъ затянуть былъ снизу полотномъ. Сверху затѣмъ была прилита вода въ количествѣ 4 литровъ (единовременно). Стекающая жидкость черезъ опредѣленные промежутки времени измѣрялась. Въ качествѣ объектовъ для наблюдений служили мнѣ различные слои лѣсной подстилки, собранной въ кв. 13. Велико-Анад. Лѣсничества (см. описаніе ихъ выше). Результаты сведены въ слѣдующей таблицѣ:

Отъ начала опыта:	Свѣжіе листья, со- бранные съ деревьей (смѣсь ясеня, ильма, клена—кв. 13).	Поверхностный слой лѣсной подстилки (кв. 13).	Образецъ той же под- стилки, взятой съ глуб. 4 с. отъ поверхн.	Образецъ той же подстилки, взятой съ глуб. 11 сант. отъ поверхн.
	с.с.	с.с.	с.с.	с.с.
Спустя 1 мин. просочилось воды . .	1056	1086	408	12
„ 5 мин. просочилось еще. . .	1108	993	328	23
„ 15 мин. „ „ . .	742	642	126	65
„ 30 мин. „ „ . .	268	356	306	44
„ 1 часъ „ „ . .	295	340	109	459
„ 3 часа „ „ . .	90	105	202	505

Дальнѣйшихъ измѣреній я не производилъ, такъ какъ и за этотъ короткій промежутокъ времени наблюдений результаты получились весьма опредѣленные. Оставляя въ сторонѣ не совсѣмъ ясную сравнительную картину, полученную по отношенію къ свѣжимъ листьямъ и къ поверхностному слою подстилки ¹⁾ и обращаясь только къ сравненію различныхъ слоевъ этой подстилки между собою, мы видимъ, что со степенью разложенности ея (а слѣдовательно, съ ея возрастомъ) водопроводимость ея весьма рѣзко падаетъ. Дѣйствительно, мы наблюдаемъ, напр., что поверхностный слой подстилки (самый молодой) уже спустя 1 мин. отъ начала опыта пропустилъ черезъ себя до 27% всей при-

¹⁾ Что вѣроятно, обусловливается сравнительно малою измѣненностью и разложенностью этого послѣдняго объекта.

литой на него воды, второй слой (болѣе разложенный) около 10⁰/₀, и наконецъ третій (еще болѣе разложенный) лишь 0,3⁰/₀. За всѣ 3 часа наблюденій черезъ поверхностный слой подстилки просочилось 3522 с.с. (изъ 4 литр.) черезъ второй слой (съ глуб. 4 с.) лишь 1479 с.с., и наконецъ, черезъ третій слой (съ глуб. 11 сант.) всего 1108 с.с. ¹⁾. Явленіе это обусловливается, по всей вѣроятности тѣмъ, что тотъ или другой растительный объектъ, по мѣрѣ своего разложенія, принимаетъ все болѣе и болѣе гумусоподобную форму и строеніе, и дѣлается, въ силу этого, болѣе мелкочастичнымъ и связнымъ, что и влечетъ за собой какъ уменьшеніе его водопроницаемости, такъ, съ другой стороны, и повышеніе влагоемкости его (см. выше).

Если мы перенесемъ эти выводы въ природу, то, принимая во вниманіе, что всякій растительный мертвый покровъ, вообще говоря, состоитъ какъ бы изъ отдѣльныхъ слоевъ, представляющихъ собой различныя стадіи разложенности, причемъ, чѣмъ ближе къ дневной поверхности, тѣмъ слои эти являются все менѣе измѣненными, а самый поверхностный слой этого комплекса представляетъ собой только что отпавшія, даже не затронутыя еще процессами разложенія, части растений; принимая все это во вниманіе, мы не можемъ не отмѣтить того, что характеръ такого строенія мертваго покрова имѣетъ прежде всего, весьма существенное значеніе для быстрого и легкаго проникновенія въ него атмосферныхъ осадковъ, такъ какъ поверхностные слои этого объекта въ силу своей малой разложенности, не представляютъ собой, такимъ образомъ, никакого препятствія такому проникновенію. Съ другой стороны — разъ проникшіе осадки въ болѣе глубокіе слои покрова, будутъ

¹⁾ Что касается перваго изъ названныхъ объектовъ, то, хотя влагоемкость его = 497,9⁰/₀ (см. выше), — тѣмъ не менѣе весьма крупная цифра просочившейся черезъ него воды въ теченіе 3 ч. не должна казаться странной, такъ какъ несомнѣнно, что за такой короткій промежутокъ времени, притомъ при быстромъ сравнительно токъ воды, объектъ этотъ не могъ еще достигнуть полнаго насыщенія.

уже обезпечены отъ обратныхъ потерь путемъ испаренія въ атмосферу, такъ какъ мало разложившіяся части растеній, а тѣмъ болѣе свѣжія, которыя, какъ мы видѣли, и являются обычно самымъ внѣшнимъ покровомъ, не обладая совершенно капиллярными свойствами (въ чемъ мы убѣдимся нѣсколько ниже), представляютъ собой весьма совершенную гарантію отъ испаренія воды изъ нижележащихъ слоевъ.

Такимъ образомъ, и во всѣхъ указанныхъ фактахъ мы не можемъ лишній разъ не видѣть элементовъ, опять-таки компенсирующихъ до извѣстной степени тѣ неблагопріятныя явленія, которыя могутъ создаваться лѣснымъ массивомъ по отношенію къ свободному, такъ сказать, общенію выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ съ лѣсной почвой.

Но въ еще болѣе рельефной формѣ сказались эти положительныя свойства мертваго растительнаго покрова, взятаго изъ-подъ хвойнаго лѣса и съ поверхности дѣвственной почвы.

II. Опыты съ лѣсной подстилкой изъ-подъ хвойнаго лѣса.

Результаты этихъ опытовъ, вмѣстѣ съ описаніемъ изслѣдуемыхъ объектовъ, сведены въ слѣдующей таблицѣ: (въ качествѣ матеріала служила хвоя ели, взятая на различныхъ стадіяхъ разложенія; объектъ этотъ занималъ въ сосудѣ слой мощностью въ 12 сантиметровъ).

Отъ начала опыта:	Свѣжая хвоя ели, собранная съ дерева	Хвоя ели, разлагавшаяся въ теченіе 3 мѣс.	Хвоя ели, разлагавшаяся въ теченіе 11 мѣс.
	с.с.	с.с.	с.с.
Спустя 5 минутъ просочилось воды.	3301	3246	3223
Спустя 30 мин. просочилось еще	509	488	574
Спустя 1 часъ.	143	173	109

Разсматривая цифры этой таблицы, мы прежде всего констатируемъ здѣсь такое легкое и быстрое проникновеніе воды, которое значительно превосходитъ соотвѣтствующія величины, найденныя нами по отношенію къ подстилкѣ изъ подѣ лиственнаго лѣса; съ другой стороны эта легкая водопроводимость хвойной подстилки является, какъ показываютъ вышеприведенныя цифры, свойствомъ общимъ, и имъ обладаютъ въ одинаковой мѣрѣ какъ свѣжіе, такъ и подвергавшіеся длительному разложенію объекты. Такимъ образомъ, мертвая подстилка хвойнаго лѣса, хотя и получаетъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, сравнительно съ лиственнымъ лѣсомъ, меньшее количество атмосферныхъ осадковъ (часть ихъ, и довольно большая, задерживается, какъ намъ уже извѣстно, кронами деревьевъ), но, обладая огромной и быстрой водопроницаемостью, представляетъ собой прекрасное посредствующее звено въ передачѣ атмосферныхъ осадковъ въ лѣсную почву, особенно, если прибавить сюда и ничтожную влагоемкость этого объекта.

Что касается того, почему водопроводимость хвойныхъ объектовъ, находящихся на различныхъ стадіяхъ разложенности, мало между собой разнится, то едва ли будетъ ошибкой объяснить этотъ фактъ опять таки малой вообще разлагаемостью этого матеріала, что, какъ мы видѣли это раньше, доказано было прямыми опытами, и что находить себѣ косвенное подтвержденіе въ малой также измѣняемости и другого его свойства—влагоемкости.

III. Опыты со „степнымъ войлокомъ“.

На опытахъ со „степнымъ войлокомъ“ я подробно не останавливаюсь; ограничусь лишь приведеніемъ соотвѣтствующихъ цифръ.

Отмѣчу только, что свойствами водопроводимости онъ весьма напоминаетъ намъ предъидущій объектъ, т.-е. въ выс-

шей степени легко и быстро проводить через себя воду, и является поэтому такимъ же положительнымъ посредникомъ между атмосферными осадками—съ одной стороны и степной почвой—съ другой, какъ то мы видѣли по отношенію къ мертвому покрову, накапливающемуся въ хвойныхъ насажденіяхъ.

Данныя анализы сведены въ слѣд. таблицѣ:

Просочилось воды (въ с.с.) отъ начала опыта:

Спусти 5 мин.	2724 сс.
" 15 мин. просочилось еще . . .	712 "
" 30 мин.	218 "
" 1 часъ	183 "

С. Испаряемость мертвыхъ растительныхъ покрововъ. Капиллярныя свойства ихъ.

До сихъ поръ мы разсматривали свойства различныхъ мертвыхъ растительныхъ покрововъ, характеризующія способность ихъ такъ или иначе проводить атмосферные осадки въ почву и такъ или иначе утилизировать эти послѣдніе. Теперь мы перейдемъ къ изученію, такъ сказать, обратныхъ свойствъ этихъ объектовъ,—т.-е., какъ легко и быстро принятая изъ атмосферы влага можетъ обратно выдѣляться ими въ воздухъ—путемъ, напр., испаренія, путемъ капиллярнаго движенія воды изъ нижнихъ слоевъ въ верхніе и т. п. Для общаго суммарнаго представленія о гидрологической роли мертвыхъ покрововъ въ жизни почвы необходимо, конечно, подвергнуть детальному изученію возможно болѣе разнообразныя водныя свойства этихъ объектовъ, всесторонне характеризующія эти послѣдніе какъ съ положительной, такъ и со стороны отрицательной.

Обратимся, въ виду этого, прежде всего къ разсмотрѣнію вопроса, насколько легко и расточительно теряетъ принятую воду тотъ или другой покровъ—путемъ испаренія. Первые систематическія указанія на испаряемость различныхъ расти-

тельныхъ материаловъ мы встрѣчаемъ у Ебермауера¹⁾. Взявъ для своихъ опытовъ растительные объекты, достигшіе полной влагоемкости, и взвѣсивъ опредѣленный объемъ ихъ, цитируемый авторъ раскладывалъ ихъ въ комнаты тонкимъ слоемъ и ежедневно, въ теченіе 3-хъ недѣль, измѣрялъ взвѣшиваніемъ потерю изъ нихъ испаряющейся воды.

Опавшіе листья бука (содержавшіе предварительно 175% влаги) испарили воды:

					°R	%
въ теченіе первыхъ	5 дней	(при средней t°	воздуха въ	13,6)	—	103,7
"	слѣдующихъ	5 "	(" " " "	" "	15,9)	— 65,2
"	"	5 "	(" " " "	" "	18,7)	— 4,6
"	"	5 "	(" " " "	" "	15,7)	— 1,5
						всего 175%

Хвоя сосны (съ 94% влажности):

въ теченіе первыхъ	5 дней ("	"	"	"	"	13,6) — 53,9
"	слѣдующихъ	5 "	("	"	"	" 15,9) — 36,8
"	"	5 "	("	"	"	" 18,7) — 3,1
"	"	5 "	("	"	"	" 15,7) — 0,0
							всего 93,8%

Хвоя ели (съ 144% влажности):

въ теченіе первыхъ	5	"	("	"	"	"	"	13,6)	—	97,3
"	слѣдующихъ	5	"	("	"	"	"	"	15,9)	— 42,4
"	"	5	"	("	"	"	"	"	18,7)	— 4,1
"	"	5	"	("	"	"	"	"	15,7)	— 0,0
										всего	143,8 ⁰ / ₀

Мохъ (съ 234% влажности):

въ теченіе первыхъ	5 дней ("	"	"	"	"	13,6)—150,0
"	слѣдующихъ	5	"	("	"	" 15,9)— 70,5
"	"	5	"	("	"	" 18,7)— 11,7
"	"	5	"	("	"	" 15,7)— 1,8
							всего 234,0%

На основаніи этихъ, дѣйствительно, весьма крупныхъ цифръ, Ебермауеръ приходитъ къ заключенію, что лѣтомъ, въ сухую погоду, при средней t° воздуха въ 15° — 16°R. — даже насыщенная водой лѣсная подстилка теряетъ путемъ испаренія большую часть своей воды уже черезъ 10 дней, а спустя

¹⁾ Ebermayer. Die gesammte Lehre der Waldstreu, 1876, S. 181, 182. Подробныя цифры сведены въ табл. VI в., S. 107—110.

матеріаловъ воды, ни, тѣмъ болѣе, непосредственно перенести выводы этихъ опытовъ въ природу. Дѣйствительно, прежде всего необходимо указать на совершенно неестественный способъ наполненія сосудовъ изслѣдуемымъ матеріаломъ (въ возд.-сух. состояніи); а именно—послѣдній укладывался тамъ при постоянномъ, очень сильномъ прессованіи („So fest als möglich“); мало того, при предварительномъ насыщеніи матеріала водой (наблюденія надъ испаряемостью велись съ объектами, достигшими полной влагоемкости)—являлась возможность еще болѣе его утрамбовывать, что систематически въ теченіе всего опыта и практиковалось изслѣдователемъ ¹⁾. Съ такими-то сильно уплотненными объектами оперировалъ авторъ. И можно заранее предвидѣть, что такой предварительной операціей въ изслѣдуемой массѣ создавалась искусственно система капиллярныхъ ходовъ, по которымъ и подавалась непрерывно вода изъ болѣе глубокихъ слоевъ въ верхніе, гдѣ послѣдняя и испарялась безпрепятственно въ атмосферу. Въ результатѣ—цифры должны были получиться, конечно, сильно повышенныя.

Далѣе, и самая методика наблюденія надъ испаряемостью, примѣненная Wollny—не даетъ намъ какого-либо опредѣленнаго и конкретнаго представленія о постепенномъ ходѣ этого процесса. Дѣйствительно, сосуды, наполненные тѣмъ или другимъ объектомъ, были выставлены на воздухъ, гдѣ они подвергались непосредственному воздѣйствію солнца и вѣтра („der Sonne und dem Winde ausgesetzt“) ²⁾. Почти ежедневно (въ опытахъ 1884 г.), или одинъ разъ въ недѣлю (въ опытахъ 1886, 1887 и 1890 гг.) сосуды взвѣшивались, и, такимъ образомъ, опредѣлялось въ нихъ количество испарившейся воды.

¹⁾ При опредѣленіи влагоемкости того или другого матеріала, какую, какъ мы видѣли выше, Wollny перечислялъ обычно на объемъ, а не на вѣсъ—такое предварительное уплотненіе, конечно, диктуется задачами самаго опыта, но при опредѣленіи испаряемости—этими создавалась искусственно совершенно необычная обстановка.

²⁾ На время дождя они уносились въ закрытое помѣщеніе

Т° воздуха однако попутно не измѣрялась, но, конечно, она все время колебалась и измѣнялась, измѣнялось направление и сила вѣтра, интенсивность инсоляціи и пр. и пр. — все это должно было, конечно, отражаться на интенсивности испаренія, — почему, при разсмотрѣніи таблицъ Wollny и бросается въ глаза неравномѣрность и непоследовательность цифръ, характеризующихъ это испареніе и идущихъ все время какъ бы скачками. Такимъ образомъ, постепеннаго процесса потери воды тѣмъ или другимъ объектомъ, при неизмѣняющихся внѣшнихъ условіяхъ (t°, освѣщенія и пр.) уловить, при такой постановкѣ опыта, нельзя, а приходится лишь ограничиться конечными, суммарными итогами, выведенными за рядъ мѣсяцевъ.

Главнѣйшіе выводы, къ которымъ пришелъ Wollny на основаніи своихъ многочисленныхъ опытовъ, заключаются въ слѣд.:

1) Отмершія части растений испаряютъ воды значительно меньшія количества, чѣмъ различные типы почвъ (глина, песокъ, торфъ).

2) Изъ различныхъ растительныхъ матеріаловъ особенно большія количества воды испаряетъ мохъ ¹⁾; далѣе слѣдуютъ, въ убывающемъ порядкѣ: листва дуба и бука, хвоя сосны и ели, но разница между всѣми ими въ этомъ отношеніи сравнительно ничтожная ²⁾.

3) Испаряемость отмершими растительными остатками воды тѣмъ меньше, чѣмъ болѣе мощный слой они занимаютъ; но начиная съ 20 сантиметроваго слоя — дальнѣйшее утолщеніе особеннаго значенія въ этомъ отношеніи не имѣетъ.

¹⁾ Замѣтимъ кстати, что Ebermayer (см. выше) въ своихъ опытахъ пришелъ совершенно къ обратному заключенію.

²⁾ Этотъ выводъ дается Wollny на основаніи опытовъ 1888 и 1890 гг.; въ опытахъ же 1884 г., а также въ своей послѣдней сводочной работѣ („Die Zersetzung“... etc), онъ указываетъ, что хвойные объекты (главнымъ образомъ сосна) испаряютъ больше лиственныхъ, хотя разница эта — ничтожная и непостоянная.

Въ качествѣ иллюстраціи къ этимъ положеніямъ — привожу слѣд. сводочную таблицу, данную Wollny въ его послѣдней работѣ ¹⁾.

Количество испарившейся воды (въ мм):

Годъ наблю- деній.	Количество выданныхъ осадковъ.	Мощность слоя — 5 см.					Мощность слоя — 30 см.			
		Опав- шая листва дуба.	Опав- шая листва бука.	Хвоя ели.	Хвоя сосны.	Мохъ.	Опав- шая листва дуба.	Опав- шая листва бука.	Хвоя ели.	Хвоя сосны.
1886 г.	713,2	279,2	—	275,5	—	340,2	167,6	165,0	216,7	198,0
1887 „	466,3	262,9	—	244,2	—	281,5	108,2	106,9	104,7	205,9
1888 „	823,0	293,2	301,4	227,6	294,5	380,9	—	—	—	—
Средн.	667,5	278,4	—	249,1	—	334,2	137,9	135,9	160,7	201,9

Вліяніе различной мощности слоя.

Мощность слоя въ см.	Опавшая листва дуба.			Опавшая хвоя ели.			Мохъ. 1888 г.
	1886 г.	1887 г.	Среднее.	1886 г.	1887 г.	Среднее.	
5	279,2	262,9	271,0	275,5	244,2	259,8	380,9
10	225,3	282,2	253,8	229,8	279,4	254,6	358,2
15	—	—	—	—	—	—	295,5
20	165,8	119,2	142,5	191,5	87,3	139,4	230,6
25	—	—	—	—	—	—	226,3
30	167,5	108,2	137,8	216,7	104,2	160,4	224,9

Мои, излагаемые ниже, опыты съ испаряемостью различ-
ныхъ объектовъ касались какъ отдѣльныхъ неразложившихся
частей растений, такъ и естественныхъ комплексовъ ихъ, скоп-
ляющихся на поверхности почвы въ видѣ того или другого
мертвого растительнаго покрыва.

Изслѣдуемые матеріалы, доведенные предварительно до пол-

¹⁾ „Die Zersetzung der organ. Stoffe“... etc., 1896, s. 302.

ной влагоемкости, помещались въ тѣ самые металлическіе сосуды, которые служили намъ и для опытовъ съ водопроводимостью. Сѣтчатое дно этихъ сосудовъ, конечно, было наглухо закрыто. Стѣнки сосудовъ закрывались чехломъ, состоящимъ изъ нѣсколькихъ слоевъ толстаго картона, чтобы хотя немного умѣрить вліяніе на нихъ окружающей t° . Сосуды помещались въ полутемной комнатѣ, гдѣ t° воздуха держалась довольно равномерно — въ предѣлахъ отъ 12° до 14° С. Въ опредѣленные промежутки времени сосуды взвѣшивались и въ результатѣ узнавалось, такимъ образомъ, количество испарившейся воды. Тотъ или другой растительный объектъ укладывался въ сосуды безъ всякаго уплотненія или потряхиванія, такъ какъ, будучи совершенно насыщенъ водой, располагался тамъ и безъ того довольно компактной массой. Матеріала бралось столько, чтобы заполнить сосудъ совершенно, — до краевъ; при этомъ, всѣхъ различныхъ объектовъ былъ конечно различный, что однако не представлялось для насъ важнымъ. Дѣйствительно, — въ задачи описываемыхъ опытовъ отнюдь не входило пока изученіе сравнительной способности къ испаренію различныхъ, взятыхъ для опыта, объектовъ и какого-либо сравнительнаго количественнаго учета ихъ съ этой стороны. Для того, чтобы рѣшить вопросъ, что больше испаряетъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, листва-ли дуба, или бука, осины и пр., хвоя ли ели, сосны, пихты и т. п., — необходимо, конечно, организовать массовые опыты съ этими объектами, при соблюденіи самыхъ тонкихъ и детальныхъ при этомъ предосторожностей, такъ какъ то или иное количество испаряющейся воды будетъ зависѣть отъ возраста взятаго объекта, его величины, строенія, а слѣдовательно, способа размѣщенія въ общей массѣ отдѣльныхъ частей, количества промежутковъ между послѣдними и пр. и выполнѣ естественно, что найденная та или другая разница въ количествѣ испарившейся воды будетъ имѣть своей причиной никакъ не характеръ того или другого изслѣдуемаго

объекта самого по себѣ, а индивидуальную способность его — такъ или иначе размѣщать отдѣльные свои ингредиенты съ такимъ или инымъ количествомъ свободныхъ промежутковъ и т. п. Излагаемые же ниже наблюденія имѣли пока другую цѣль, а именно — по отношенію къ тому или другому растительному объекту выяснитъ характеръ и послѣдовательность самаго процесса потери имъ воды путемъ испаренія, не стремясь къ сопоставленію между собою цифръ, полученныхъ по отношенію къ различнымъ объектамъ.

Результаты изслѣдованія испаряемости сведены въ слѣд. таблицѣ:

Исслѣду- емый мате- риалъ.	Влаж- ность его въ насыщ. сост. (въ % къ ввѣд. сух. вещ.)	Испарилось воды (въ %) спустя:												Всего за 42 дня испари- лось.
		1 д.	2 д.	3 д.	5 д.	7 д.	10 д.	14 д.	21 д.	28 д.	35 д.	42 д.		
Лѣж. листья ерезы . . .	221,0%	10,3	2,2	1,7	0,3	0,5	0,8	0,3	0,2	0,1	0,4	0,2	17,0%	
Лѣж. хвой- н	98,0%	6,1	3,2	0,4	1,2	1,1	0,7	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	14,2%	
Лѣсная подст. изъ кв. 13) .	668,2%	9,1	3,9	2,5	2,8	1,8	2,3	4,1	4,6	0,3	0,3	1,1	32,3%	
Подстилка изъ лѣсового лѣса Виленск. г.).	117,3%	7,4	2,4	3,1	1,8	0,3	3,7	4,4	1,5	0,6	0,2	0,3	25,7%	
Лепной вой- локъ	276,3%	5,1	2,3	4,8	0,3	2,3	3,6	1,0	0,3	0,1	0,2	0,1	20,1%	

Сравнивать различные объекты между собою — было бы, въ силу высказанныхъ выше соображеній, неправильно, но, рассматривая цифры этой сводочной таблицы — мы не можемъ не отмѣтить слѣдующаго, весьма любопытнаго факта, который является общимъ для всѣхъ изслѣдуемыхъ матеріаловъ и который упорно повторяется во всѣхъ рассмотрѣнныхъ случаяхъ, это — фактъ почти полнаго прекращенія процесса испаренія воды матеріаломъ, послѣ извѣстнаго промежутка времени, различнаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. На это ука-

зывается и вычисленіе общаго суммарнаго количества потерянной путем испаренія воды за всѣ 42 дня наблюденій, которыя (количества) измѣряются, какъ мы видимъ, совершенно незначительными величинами. Наконецъ, непосредственное изслѣдованіе всѣхъ взятыхъ для опыта объектовъ, убѣждало, что высохшимъ слоемъ являлся лишь поверхностный слой; нижніе же слои оставались совершенно влажными. Чѣмъ же объяснить указанный фактъ, что процессы испаренія растительными объектами воды, совершающіеся, какъ показываютъ вышеприведенныя цифры, первые дни довольно энергично — въ дальнейшемъ угнетаются настолько, что послѣдующая потеря изъ нихъ воды начинаетъ измѣряться сравнительно уже ничтожными величинами? Какимъ образомъ объяснить себѣ и тотъ фактъ, что болѣе разложенныя формы растительныхъ массъ (лѣсныя подстилки), въ суммарномъ итогѣ, потеряли путемъ испаренія значительно большее количество воды, чѣмъ свѣжія?

Мнѣ кажется, что процессы эти надо представлять себѣ такимъ образомъ, что главная масса испаряющейся воды приходится на долю лишь самаго поверхностнаго слоя растительныхъ объектовъ. Послѣ довольно быстрого его высыханія, что сопровождается нѣкоторымъ съживаніемъ и разрыхленіемъ его, онъ начинаетъ играть роль предохранительной покрывки отъ испаренія нижележащихъ слоевъ — какъ въ силу своей плохой теплопроводности, такъ и въ силу того, что на границѣ высохшаго слоя капиллярные ходы, по которымъ могла бы непрерывно подниматься вода, — являются разорванными. Иссушеніе однако коснется, рано или поздно, и слѣдующаго, болѣе глубокаго слоя. Высохнувъ, и этотъ слой, вмѣстѣ съ первымъ, будетъ играть роль предохранительной покрывки, но только ихъ суммарное въ этомъ отношеніи дѣйствіе будетъ уже болѣе дѣйствительнымъ и т. д. Въ результатѣ — мы должны встрѣчаться съ все болѣе и болѣе затрудненнымъ испареніемъ воды изъ

изслѣдуемыхъ матеріаловъ, что какъ разъ и подтверждается соотвѣствующими наблюденіями.

Прибавлю къ сказанному, что растительные объекты, о которыхъ идетъ рѣчь, даже будучи въ сильно-разложенномъ состояніи, обладаютъ совершенно ничтожными, часто не поддающимися непосредственному учету, капиллярными свойствами. Что же касается мало разложившихся, а тѣмъ болѣе свѣжихъ объектовъ—то они абсолютно лишены ихъ. Это обстоятельство также играетъ весьма важную (а, быть можетъ, и главную) роль въ описываемомъ явленіи, способствуя сохраненію влаги въ болѣе глубокихъ слояхъ—въ теченіе значительнаго промежутка времени.

Что описываемые матеріалы обладаютъ ничтожной капиллярностью, или чаще совершенно даже лишены ея—я убѣдился непосредственными опытами.

Въ открытыя стеклянныя трубки (діам. 5 с., длиной 25 с.), затянутыя съ одного конца плотнымъ полотномъ—помѣщались, умышленно въ довольно уплотненномъ состояніи ¹⁾, тѣ или другіе изслѣдуемые матеріалы, занимавшіе въ описываемыхъ трубкахъ слой мощностью въ 23 сант. Трубки эти погружались въ сосудъ съ водой на глубину 1 с. Уровень воды въ упомянутомъ сосудѣ поддерживался все время постояннымъ—помощью опрокинутой колбы, наполненной водой. Верхнее отверстіе трубокъ было прикрыто (отъ испаренія) часовымъ стекломъ. Такъ какъ обычный способъ опредѣленія капиллярнаго поднятія воды—путемъ непосредственнаго наблюденія глазомъ,—здѣсь, конечно, былъ не примѣнимъ, то я прибѣгъ къ другому способу; а именно—спустя 27 дней отъ начала опыта опредѣлилъ, послойно, влажность всѣхъ служившихъ для опыта объектовъ. Результаты этого опредѣленія приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

¹⁾ Опыты съ разрыхленнымъ матеріаломъ, въ виду очевидныхъ и безъ того результатовъ, не представляли интереса.

Влажность растит. матеріаловъ въ % къ вещ., высуш. при 105°C.

	Передъ нача- ломъ опыта.	Спустя 27 дней.		
		На глуб. 19 — 20 с.	На глуб. 13 — 14 с.	На глуб. 5 — 6 с.
	%	%	%	%
1) Свѣжіе листья березы.	5,27	5,28	5,30	5,27
2) Степной войлокъ . .	8,05	8,10	8,06	8,06
3) Еловая подстилка . .	10,43	10,44	10,42	10,44
4) Подстилка листь. лѣса (кв. 13).	13,46	13,49	13,50	13,46

Ничтожное повышеніе влажности въ нѣкоторыхъ случаяхъ надо объяснить себѣ, конечно, ничѣмъ инымъ, какъ испареніемъ воды изъ самаго нижняго слоя (опущеннаго въ воду) въ болѣе верхніе и гигроскопичностью послѣднихъ, но отнюдь не капиллярнымъ поднятіемъ ея. Въ послѣднемъ случаѣ намъ пришлось бы констатировать, наоборотъ, огромную прибавку во влажности взятыхъ объектовъ. Въ свѣжемъ же, неразложившемся объектѣ это повышеніе влажности, въ силу возможной гигроскопичности ихъ, и совершенно почти неуловимо.

Описанными опытами и высказанными соображеніями подчеркивается, какъ мнѣ кажется, весьма рельефно тотъ фактъ, что въ лицѣ мертваго растительнаго покрова, скопляющагося на поверхности почвы, мы имѣемъ субстратъ, наиболѣе совершеннымъ и полнымъ образомъ охраняющій верхніе почвенные горизонты отъ потери ими воды.

Возьмемъ, дѣйствительно, для примѣра совершенно молодыя лѣсныя насажденія, или дѣвственную степную почву, гдѣ, какъ извѣстно, мертвый покровъ занимаетъ слой сравнительно небольшой мощности. Здѣсь мы можемъ предвидѣть, что даже совершенно высохнувъ подъ влияніемъ t° окружающаго воздуха, — покровъ этотъ представитъ собой тѣмъ не менѣе лучшую гарантію отъ испаренія воды изъ нижележащей почвы — какъ въ силу отсутствія капиллярныхъ свойствъ въ немъ самомъ (особенно, принимая во вниманіе малую разложенность этого субстрата въ молодыхъ насажденіяхъ), такъ и въ силу

того, что капиллярные ходы, имѣющіеся въ почвѣ, будутъ разорваны на границѣ съ вышележащимъ покровомъ. Другими словами, мы будемъ имѣть въ данномъ случаѣ то же самое отбѣняющее и охраняющее отъ испаренія дѣйствіе мертвого покрова, которое констатировано и подтверждено уже многочисленными опытами по отношенію къ аналогичной роли разбросаннаго на поверхности почвы тонкаго слоя навоза, соломы и т. п. ¹⁾).

Что же касается старыхъ, сильно разложившихся формъ покрововъ, то если въ природѣ они и залегаютъ иногда, подѣ влияніемъ долгаго времени, въ видѣ плотныхъ массъ, и обладаютъ, въ силу этого, быть можетъ, даже и значительными капиллярными свойствами, то не надо при этомъ, однако, забывать, что самый поверхностный слой ихъ опять-таки состоитъ изъ тѣхъ же мало разложившихся, отмершихъ за послѣдніе годы, остатковъ. Такимъ образомъ, какъ въ первомъ изъ разсмотрѣнныхъ случаевъ, такъ и здѣсь, самый поверхностный слой, въ силу своихъ опредѣленныхъ водныхъ свойствъ, будетъ играть роль покрова, въ совершенствѣ предохраняющаго нижележащіе слои отъ испаренія. Особенно важное значеніе имѣютъ указанные свойства растительныхъ покрововъ, конечно, для южныхъ степныхъ почвъ, гдѣ, какъ извѣстно, благодаря высокой t° воздуха, иссушающему дѣйствію вѣтровъ, солнца

¹⁾ См., напр., „Краткій Отчетъ по Оп. Полю Полтавск. С.-Х. Общ.“ за 1901 г. стр. 47. Wollny „Der Einfluss der Pflanzendecke und Beschattung auf die physik. Eigenschaften“ . . . etc 1877; S. 111.

По опытамъ Фрике (An. d. l. Sc. Agron, 1902, Т. II.—статья Henry) влажность въ мѣстахъ, покрытыхъ лѣсной подстилкой была на 20% больше, чѣмъ въ мѣстахъ, гдѣ она удалена.

С. Кулжинскій („Хозяинъ“, 1906. № 25) указываетъ на опыты въ имѣніи Харитоненко, гдѣ на пространствѣ 30 дес. яровые и озимые посѣвы покрывались „обойнами“, „хоботьемъ“ (въ $\frac{1}{4}$ в. толщиной), и тогда излишекъ урожая сахарной свеклы составлялъ 300 пуд., а пшеницы — около 36 пуд. — какъ результатъ лучшаго сохраненія при этомъ влаги въ почвѣ.

и пр. съ обнаженной почвы испаряется, наоборотъ, огромное количество влаги.

Такимъ образомъ, знакомство со свойствами капиллярности и испаряемости различныхъ растительныхъ матеріаловъ снова заставляетъ насъ смотрѣть на послѣдніе, какъ на объекты, весьма скупо расходующіе, путемъ испаренія, запасы воспринятой изъ атмосферы влаги.

Чтобы выяснитъ полнѣе водныя свойства растительныхъ остатковъ, намопляющихся на поверхности почвы, — мною производились опыты и съ опредѣленіемъ ихъ гигроскопичности, т. е. способности такъ или иначе поглощать парообразную влагу изъ атмосферы ¹⁾. Однако, цифры, даже по отношенію къ сильно разложившимся объектамъ, получались всякій разъ такія ничтожныя, которыя ни въ коемъ случаѣ не могутъ играть какой-либо замѣтной роли въ общемъ водномъ балансѣ этихъ матеріаловъ; а потому приводить полученные данныя я считаю излишнимъ.

Всѣми высказанными выше соображеніями, логически вытекающими изъ опытовъ надъ изученіемъ нѣкоторыхъ физическихъ свойствъ мертвыхъ растительныхъ покрововъ, намопляющихся на поверхности почвы, обрисовывается довольно опредѣленно, правда, лишь въ общихъ чертахъ, роль этихъ покрововъ въ такомъ многосложномъ, зависящемъ отъ такихъ многоразличныхъ условій явленія, какъ влажность той или другой почвы. Какъ я уже имѣлъ случай высказать это нѣсколько выше, при изученіи этого сложнаго явленія имѣются два пути: одинъ — болѣе скорый, и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе непосредственно подвигающій насъ къ конечному сужденію о немъ, это — путь непосредственнаго опредѣленія влажности

¹⁾ Опредѣленное количество послѣдуемаго матеріала помѣщалось въ фарфоровой объемистой чашкѣ подъ стеклянный колпакъ, края котораго входили на 0,5 сант. въ сосудъ съ водой. Этимъ путемъ создавалась внутри колпака атмосфера, насыщенная водой.

той или другой почвы, при тѣхъ или другихъ условіяхъ и т. д. При этомъ методѣ мы получаемъ понятіе о влажности почвы, какъ о суммарномъ итогѣ цѣлаго ряда входящихъ въ это явленіе отдѣльныхъ производныхъ. Идя такимъ путемъ, мы можемъ быстро и непосредственно отвѣтить на цѣлый рядъ практическихъ вопросовъ, связанныхъ съ этимъ важнѣйшимъ факторомъ плодородія почвы—ея влажностью. Работами въ этомъ именно направленіи создалась та огромнѣйшая литература, которая имѣется по вопросу о влажности почвы вообще. И нельзя не скрыть того, что на ряду съ цѣннѣйшими трудами, имѣющимися въ этой области (и, главнымъ образомъ, русскихъ изслѣдователей) мы встрѣчаемся вмѣстѣ съ тѣмъ съ такимъ количествомъ литературнаго балласта, весьма часто противорѣчиваго, которое настоятельно требуетъ самаго тщательнаго пересмотра. Обиліе такого несистематизированнаго и часто несравнимаго между собой матеріала обусловливается ничѣмъ инымъ, какъ именно тѣмъ, что въ стремленіяхъ получить скорый и непосредственный отвѣтъ относительно конечнаго, суммарнаго содержанія влаги въ интересующей почвѣ изслѣдователи мало удѣляли времени анализу отдѣльныхъ производныхъ, обусловливающихъ общей своей совокупностью данное явленіе. Дѣйствительно, изъ чего складается общій водный балансъ той или другой почвы? Изъ цѣлаго ряда самыхъ разнообразныхъ слагающихъ, то взаимно содѣйствующихъ, то взаимно парализующихъ. Влажность почвы это есть функція самыхъ разнообразныхъ производныхъ — количества, времени и характера выпадающихъ осадковъ, характера, возраста и густоты растительности, интенсивности транспираціи и потребления ею почвенной влаги, распредѣленія t° , силы инсоляціи, физико-механическихъ и химическихъ свойствъ самой почвы, количества задерживаемой атмосферной воды листьями и вѣтвями растений (что въ свою очередь зависитъ также отъ цѣлаго ряда условій), присутствія того или другого мертваго

растительнаго покрова, его плотности, мощности, состава, степени разложенности и пр. Всѣ упомянутыя производныя могутъ комбинироваться, въ природныхъ условіяхъ, конечно, самымъ разнообразнымъ образомъ.

Тотъ другой путь въ изученіи гидрологическаго баланса почвы, о которомъ я упомянулъ выше, и заключается именно въ томъ, чтобы расчленивъ изучаемое явленіе на рядъ отдѣльныхъ вопросовъ, выяснить отдѣльно роли въ этомъ сложномъ явленіи каждаго изъ производныхъ, сводя, конечно, остальные производныя къ одному знаменателю. Путь, несомнѣнно, значительно болѣе медленный и, такъ сказать, окольный, но вѣрнѣе ведущій къ пониманію изучаемаго явленія. Необходимо только указать, что методъ этотъ примѣнимъ, почти исключительно, лишь въ лабораторной обстановкѣ, гдѣ только и возможно по своему желанію и сообразно намѣченной цѣли комбинировать такъ или иначе условія опыта.

Исходя изъ этихъ соображеній, цѣлью изложенныхъ въ этой I-ой главѣ опытовъ и поставлено было изученіе водныхъ свойствъ того объекта, который является однимъ изъ упомянутыхъ производныхъ, и, на основаніи знакомства съ этими внутренними свойствами, составить себѣ общее представленіе о той возможной роли, которую могъ бы играть этотъ объектъ въ природѣ при различныхъ условіяхъ.

Само собой разумѣется, что всѣ описанные выше опыты имѣли своей задачей нарисовать лишь общую схему изучаемыхъ явленій, отнюдь, конечно, не имѣя въ виду представить въ этомъ отношеніи какой-либо исчерпывающій матеріалъ. Мертвый растительный покровъ, накаплиющійся на поверхности почвы, представляетъ собою въ различныхъ климатическихъ районахъ, подъ различными растительными формациями и пр. слишкомъ разнообразный и разнотипичный комплексъ, чтобы можно было бы, на основаніи изученія сравнительно немногочисленнаго количества отдѣльныхъ и до

нѣкоторой степени случайныхъ типовъ, нарисовать себѣ полную и детальную картину участія и роли этого сложнаго объекта въ общемъ водномъ балансѣ почвы.

Едва-ли меньшій интересъ представляетъ собой изученіе и тепловыхъ свойствъ мертвыхъ растительныхъ покрововъ. Учетъ такого важнаго фактора почвообразованія, какъ t° , и вообще выясненіе всѣхъ тепловыхъ явленій, происходящихъ въ почвѣ, возможно, въ цѣляхъ большаго пониманія этихъ явленій, опять-таки лишь путемъ учета отдѣльныхъ производныхъ, отъ которыхъ зависитъ этотъ общій тепловой балансъ почвы, и путемъ изученія тепловыхъ свойствъ ихъ самихъ.

Въ этомъ направленіи въ настоящее время и производятся мною опыты. Долженъ однако оговориться, что работы эти стоятъ на пути еще лишь выработки методики изученія теплоемкости и теплопроводности различныхъ растительныхъ объектовъ, такъ какъ въ литературѣ мы не имѣемъ на этотъ счетъ никакихъ указаній. Попытки примѣнить къ изученію указанныхъ тепловыхъ свойствъ растительныхъ покрововъ хотя бы тѣ самые методы, которые примѣняются при изслѣдованіи почвъ ¹⁾, до сихъ поръ не увѣнчались успѣхомъ, и отъ какихъ-либо выводовъ въ этомъ направленіи приходится поѣтому пока отказаться.

¹⁾ Методы, какъ извѣстно, также весьма неточные: для опредѣленія теплопроводности существуетъ способъ Мамонтова, для теплоемкости—способъ, описанный въ „Краткомъ Руков. къ физ. и химич. анализу почвъ“—проф. Земятченскаго и Адамова стр. 31—34 (тамъ же описанъ подробно и упомянутый способъ Мамонтова, стр. 30).

ГЛАВА II.

Растительные остатки, какъ источникъ перегнойныхъ соединений въ почвѣ.

Процессы образованія и накопленія въ почвѣ перегнойныхъ веществъ. Работы Рупрехта, Костычева, Заломанова, Докучаева и др. Изученіе растворимыхъ въ водѣ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, какъ главнаго и непосредственнаго источника гумусообразованія. Работы въ этой области Леваковского, Норре-Seyley'a, Слѣзкина и Кравкова. Процессы отщепленія изъ свѣжихъ и разлагающихся растительныхъ объектовъ водно-растворимыхъ органическихъ соединений. Вліяніе на эти процессы различныхъ комбинацій t° и увлаженія (опыты съ березовыми листьями, со степнымъ сѣномъ и хвоей ели). Ближайшее изслѣдованіе химическаго состава и свойствъ водныхъ вытяжекъ изъ разлагающихся, при различныхъ вѣдннихъ условіяхъ, растительныхъ матеріаловъ (опыты съ клевернымъ сѣномъ). Кислотность этихъ вытяжекъ. Содержаніе въ послѣднихъ гуминовой, креновой и апокреновой кислотъ. Анализъ азотистыхъ соединений. Опыты съ поглощеніемъ и закрѣпленіемъ растворимыхъ органическихъ соединений, извлекаемыхъ изъ растительныхъ остатковъ, различными типами почвъ. Попытки искусственно вызвать „реградационныя“ явленія въ различныхъ генетическихъ типахъ почвъ.

Что почвенный гумусъ происходитъ отъ сгниванія различныхъ отмершихъ органическихъ остатковъ (преимущественно растительнаго происхожденія) — извѣстно, конечно, издавна; быть можетъ еще съ тѣхъ самыхъ поръ, когда человѣкъ впервые сталъ заниматься земледѣліемъ, и когда ему впервые пришлось невольно столкнуться съ разнородными свойствами воздѣлываемыхъ почвъ. Самое слово „перегной“ уже указываетъ

на то, что человѣческій умъ уже издавна привыкъ объяснять происхожденіе темноцвѣтныхъ образованій почвы именно перегниваніемъ органическихъ остатковъ. Проф. Борисякъ ¹⁾ въ своемъ изслѣдованіи, касающемся происхожденія чернозема, между прочимъ говоритъ, что въ Малороссіи уже издавна существуетъ „общенародное мнѣніе о происхожденіи чернозема отъ согниванія растений, при содѣйствіи атмосферныхъ вліяній и отъ замѣшиванія образовавшагося перегноя съ рыхлыми суглинками подпочвы“...

Упомянутое выше положеніе о происхожденіи гумуса, какъ извѣстно, остается безспорнымъ и подлежащимъ никакому сомнѣнію и до сихъ поръ.

Однако, если бы мы пожелали изучить постепенный процессъ превращенія растительныхъ (и животныхъ) остатковъ въ темноцвѣтныя гумусовыя образованія поближе, и съ этой цѣлью ознакомились бы со всѣми тѣми работами, которыя имѣютъ болѣе или менѣе близкое отношеніе къ затронутому нами сейчасъ вопросу, то вынуждены будемъ признать, что въ большинствѣ случаевъ, вопросъ этотъ и по настоящее время стоитъ на стадіи лишь общихъ положеній и общихъ соображеній. Работы же, касающіяся непосредственно происхожденія въ почвѣ гумуса, представляются, въ большинствѣ случаевъ отрывочными и часто другъ другу противорѣчащими. Въ результатѣ—процессъ превращенія растительныхъ отмершихъ остатковъ въ гумусовыя соединенія остается до сихъ поръ совершенно невыясненнымъ; невыясненной, въ силу этого, является и его ближайшая натура—химическій составъ.

Мнѣ кажется, что главная, если не единственная причина почти полной неизученности столь важной составной части почвъ, какой является гумусъ, лежитъ исключительно въ неправильномъ методѣ, примѣняемомъ, въ большинствѣ слу-

¹⁾ Борисякъ. „О черноземѣ“, 1852, стр. 43.

чаевъ, къ изученію этого сложнаго объекта, а именно, что до сихъ поръ слишкомъ мало обращалось вниманія на генетическое изученіе его. Дѣйствительно, вмѣсто того, чтобы начать изученіе этого послѣдняго — логически съ растительнаго организма, даваго, такъ сказать, жизнь гумусовымъ веществамъ, и шагъ за шагомъ слѣдя за процессами измѣненія и разложенія этого организма, постепенно выяснять, такимъ образомъ, фізіономію образующихся при этомъ процессѣ продуктовъ, что, по моему мнѣнію, и представляетъ собой единственный надежный путь къ вырѣшенію многихъ вопросовъ, связанныхъ съ составомъ и свойствомъ гумуса, — большинство изслѣдователей работало съ уже сформировавшимся гумусовымъ веществомъ, такъ или иначе выдѣленнымъ изъ почвы. Между тѣмъ, вещество это, конечно, не представляетъ собой химически-индивидуальнаго гѣла, а является смѣсью, притомъ въ различныхъ мѣстахъ и районахъ весьма различнаго состава — въ зависимости отъ различнаго состава давшей начало этому комплексу растительности, отъ различнаго характера и интенсивности разложенія ея, отъ климатическихъ условій мѣстности, отъ фізико-механическихъ и химическихъ свойствъ почвы и пр. Неудивительно, что данныя имѣющихся въ этомъ направленіи изслѣдованій, не укладываются до сихъ поръ въ какія-либо опредѣленныя, систематическія рамки и гумусъ все еще остается „Chemicorum crux et scandalum“ (Ollech) ¹⁾.

Въ настоящей главѣ я изложу тѣ результаты, которые получены мною при лабораторной разработкѣ болѣе общаго

¹⁾ См. Слезкинъ „Современ. вопросы научнаго земледѣлія“. („Сел. Хоз. и Лѣсов.“ 1892, CLXXI, стр. 100).

Недавно появилась въ печати прекрасная работа Baumann'a и E. Gully (см. Mitt. d. K. Bayer. Moorkulturanstalt, 1909, H. III и IV), дающая полную сводку всѣхъ существующихъ работъ по изученію перегнойныхъ соединеній и освѣщающая многіе вопросы въ этой области съ точки зрѣнія современной коллоидальной химіи. Также см. новое изданіе (1911 г.) „Bodenkunde“ E. Ramann'a, s. 135 и слѣд.

вопроса въ интересующей насъ области, а именно, ближайшаго происхожденія перегнойныхъ соединеній почвы и способовъ закрѣпленія и накопленія ихъ въ послѣдней.

Разсмотрѣніе соотвѣтствующей литературы убѣждаетъ насъ, что даже такой основной, можно сказать—кардинальный вопросъ въ области изученія почвеннаго гумуса, остается и по настоящее время крайне мало разработаннымъ.

Вопросъ о тѣхъ сложныхъ превращеніяхъ, которыя претерпѣваются отмирающими растительными остатками на пути ихъ постепеннаго перехода въ темноцвѣтныя гумусовыя образованія почвы, обратилъ на себя, какъ извѣстно, особое вниманіе изслѣдователей при изученіи чернозема. Огромное количество гумуса, накапливающееся въ упомянутомъ типѣ почвъ, своеобразное распредѣленіе его и пр., не могло, конечно, не натолкнуть наблюдателей на цѣлый рядъ вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ вопросомъ вообще происхожденія въ почвѣ перегноя. Изъ какихъ органическихъ остатковъ произошли эти темноцвѣтныя образованія, какимъ образомъ протекаетъ процессъ разложенія этихъ остатковъ, какіе получаютъ при этомъ продукты, какимъ образомъ они поступаютъ въ почву, закрѣпляются ли они тамъ, почему указанныя образованія накапливаются въ однихъ районахъ больше, въ другихъ меньше и пр. и пр. все это вопросы, которые должны были естественно возникнуть при ближайшемъ изученіи столь интересной во всѣхъ этихъ отношеніяхъ почвы, каковой является черноземъ.

Палласъ ¹⁾, изучая въ 1799 г. Ставропольскія степи такъ объясняетъ образованіе въ черноземныхъ почвахъ большого количества перегноя: ...„эта равнина (Ставроп. степи)

¹⁾ См. Докучаевъ „Русскій черноземъ“, 1883, стр. 285.

Въ 1900 г. проф. Вернадскій („О значеніи трудовъ М. В. Ломоносова въ минералогіи и геологіи“) показалъ, что первая попытка рѣшить вопросъ о происхожденіи чернозема принадлежитъ Ломоносову, который еще въ 1763 г. („Первыя основанія металлургіи“) писалъ, что черноземъ „произошелъ отъ согнтія животныхъ и растущихъ тѣлъ со временемъ“. Необходи-

или была когда то неизмѣримымъ тростниковымъ болотомъ, тянувшимся по древнему морскому берегу около тогдашнихъ устьевъ Кубани, или она представляетъ изъ себя низменность, по временамъ затоплявшуюся моремъ, на подобіе низменностей по берегамъ Каспійскаго моря; подъ поверхностью моря отлагался илъ, богатый солью, который затѣмъ, при отступленіи моря выступилъ на поверхность, гдѣ и образовался толстый слой черной земли вслѣдствіе гніенія массы тростника и вообще растений“...

Приблизительно въ такихъ же самыхъ общихъ положеніяхъ процессы превращенія растительныхъ остатковъ въ гумусовыя соединенія рисуются и большинствомъ послѣдующихъ изслѣдователей.

Мурчисонъ ¹⁾, объясняя происхожденіе чернозема морскимъ путемъ говорить:... „черноземъ прибрѣлъ заключающіяся въ немъ азотистыя вещества и отчасти свойственный ему цвѣтъ, вслѣдствіе разложенія водяныхъ растений и микроскопическихъ животных“...

Пецгольдъ ²⁾, въ 1851 г., считалъ, что минеральныя вещества для образованія того морского ила, изъ котораго произошелъ черноземъ, доставлены песчаниками третичной и мѣловой формаций,... „жившіе же въ морскихъ водахъ организмы, преимущественно животныя, дали возможность образоваться гумусу“...

Приблизительно такими же общими чертами рисуютъ накопленіе въ почвахъ перегноя и другіе изслѣдователи чернозема: Эйхвальдъ, Борисякъ, Вангенгеймъ-фонъ-Кваленъ, Романовскій, Черняевъ и др. Гюльденштедтъ ³⁾ (1787 г.)

димо однако указать, что Ломоносовъ повидимому, говоритъ здѣсь не о черноземѣ собственно, какъ о почвенномъ типѣ, а именно о перегноѣ, называя послѣдній „черноземомъ“.

¹⁾ Ibid., стр. 286.

²⁾ Ibid.

³⁾ Ibid., стр. 294.

объясняетъ накопленіе большого количества перегноя въ черноземахъ тѣмъ, что „растенія не поѣдаемыя животными и безпрепятственно размножающіяся, могли ежегодно гнить и, такимъ образомъ, могли скопить значительное количество перегноя“... Германъ (1836 г.) ¹⁾: „отъ изверженій выдѣляющихся изъ корней и отъ опадающихъ листьевъ, вмѣстѣ съ высохшими остатками растеній, образуется въ ней (почвѣ), посредствомъ гніенія, особаго рода вещество, называемое гумусъ“... Гюо (1842 г.) ²⁾ говоритъ, что „гумусъ есть результатъ гніенія, при свободномъ доступѣ воздуха, тѣлъ животныхъ, умершихъ въ степяхъ, и растеній, нѣсколько поколѣній которыхъ смѣнялись на одномъ и томъ же мѣстѣ въ продолженіе значительнаго промежутка времени“...

Нѣсколько болѣе опредѣленныхъ взглядовъ на способъ образованія въ почвѣ гумуса держался академикъ Рупрехтъ. Въ своемъ трудѣ „Гео-ботаническія изслѣдованія о черноземѣ“ (1866 г.) онъ указываетъ, между прочимъ, уже на возможность механическаго просачиванія частицъ перегноя изъ верхнихъ горизонтовъ почвы, гдѣ онъ образуется благодаря сгниванію растительныхъ остатковъ, въ болѣе глубокіе. Но ни ближайшей сущности этого процесса, ни химической характеристики просачивающихся соединеній онъ не касается.

Одновременно съ изученіемъ естественныхъ гумусовыхъ скопленій, наблюдаемыхъ въ природѣ, для каковыхъ цѣлей черноземъ представлялъ собой, конечно, наиболѣе благодарный и подходящий объектъ, въ стѣнахъ химическихъ и агрономическихъ лабораторій, въ это же самое время велась дѣятельная работа по ближайшему изученію химическаго состава гумусовыхъ веществъ почвы и ихъ химическихъ свойствъ, что конечно, не могло не сыграть рѣшающей роли и въ построеніи

¹⁾ Ibid., стр. 295.

²⁾ Ibid., стр. 295.

общихъ выводовъ относительно способовъ и условій накопленія перегноя въ почвѣ. Мы не будемъ касаться той обширной литературы, которая имѣется въ настоящее время по вопросу о химической конституціи гумусовыхъ веществъ—это не имѣетъ непосредственнаго отношенія къ нашей задачѣ ¹⁾. Мы перейдемъ прямо къ изложенію и разсмотрѣнію тѣхъ работъ, которыя касаются лишь интересующаго насъ сейчасъ общаго вопроса—условій и способовъ накопленія въ почвѣ гумуса, но которыя, въ основу своихъ разсужденій и выводовъ, положили именно упомянутыя лабораторныя изслѣдованія.

Изъ такихъ работъ прежде всего надо указать на изслѣдованіе проф. Костычева, появившееся въ 1876 г. ²⁾. Основываясь на извѣстныхъ работахъ Соссюра, Шпренгеля, Мульдера, Зенфта, Детмера, Эггертца, Грандо и др., выяснившихъ въ общихъ чертахъ реакціи гумусовыхъ веществъ, какъ природныхъ; такъ и получаемыхъ искусственно, проф. Костычевъ попытался примѣнить выводы этихъ работъ и къ рѣшенію болѣе общаго вопроса—способовъ происхожденія мощныхъ скопленій гумуса въ черноземныхъ почвахъ. Упомянутая работа проф. Костычева представляетъ для насъ особый интересъ еще и потому, что, какъ увидимъ ниже, цитируемый авторъ, спустя нѣсколько лѣтъ, совершенно отказался отъ своихъ прежнихъ взглядовъ и далъ новые, совершенно противоположные, выводы.

Итакъ, основываясь на работахъ вышеупомянутыхъ изслѣдователей и ознакомившись съ извѣстнымъ, цитированнымъ нами выше, трудомъ Рупрехта, проф. Костычевъ говоритъ: „прочитавши сочиненіе Рупрехта, нельзя не убѣдиться, что

¹⁾ См. эту литературу у Wollny „Die Zersetzung der Organisch. Stoffe“... etc. 1897, s. 214—235. Также К. Глинка „Почвовѣдѣніе“, 1908 стр. 111. Также А. Baumann и E. Gully („Mitt. d. K. Bayer. Moorkulturanstalt“, 1909. Н. III и IV). Н. Fischer („Fühl. Landw. Zeit.“, 1911, Н. III) и др.

²⁾ Костычевъ „Краткій очеркъ химическихъ свойствъ перегноя и ихъ сел.-хоз. значенія“ („Сел. Хов. и Лѣсов.“, 1876, Январь, стр. 21).

черноземъ сдѣлался сушею гораздо раньше окружающей его площади. Слѣдовательно, онъ уже въ давнее время былъ покрытъ растительностью, остатки которой, согнивая на мѣстѣ, образовали перегной. Перегной этотъ, какъ показано выше, съ самаго начала своего образованія и до полного разрушенія и превращенія въ CO_2 и NH_3 включительно, непрерывно и могущественно содѣйствовалъ растворенію частицъ тѣхъ минеральныхъ породъ, изъ которыхъ первоначально образовалась эта почва. Можно возразить противъ этого, что всѣ изслѣдованія, произведенныя до сихъ поръ, показываютъ намъ, что органическое вещество перегнойа само по себѣ не такъ значительно способствуетъ вывѣтриванію, потому что находится въ трудно-растворимомъ состояніи, и что только тогда его дѣйствіе становится весьма сильнымъ, когда оно сдѣлается легко растворимымъ вслѣдствіе соединенія съ NH_3 ¹⁾. Но не надо забывать, что каждое вновь умирающее растеніе есть источникъ образованія NH_3 , и такъ какъ на мѣстѣ образованія теперешняго перегнойа растенія согнивали при полномъ доступѣ воздуха, то азотъ, содержавшійся въ нихъ, терялся развѣ въ очень незначительномъ количествѣ въ свободномъ состояніи. Затѣмъ, каждый дождь, каждая роса приносятъ съ собою въ почву NH_3 , и, слѣдовательно, на нѣкоторое время превращаютъ нерастворимыя перегнойныя соединенія въ растворимыя... Изслѣдованія показываютъ, что въ теченіе года на 1 дес. приносится дождемъ среднимъ числомъ около 20 фунт. NH_3 ...

Чтобы доказать еще болѣе то положеніе, что въ почвѣ, при естественныхъ условіяхъ, постоянно образуются растворимыя, удобоподвижныя перегнойныя соединенія, которыя могутъ, такъ образ., свободно циркулировать въ ней, Костычевъ указываетъ и на другіе источники образованія въ почвѣ амміака;

¹⁾ Курсивъ вездѣ мой.

это — процессъ гніенія самихъ растений, далѣе доставленіе амміака росу, и, наконецъ, непосредственное поглощеніе изъ воздуха амміака самой почвой. Костычевъ дѣлаетъ съ этой цѣлью такой расчетъ: если предположить, что на десятинѣ вырастаетъ ежегодно 100 пуд. сухого вещества, то при гніеніи изъ нея можетъ образоваться около 60 ф. NH_3 . Что касается размѣровъ NH_3 , поглощаемого почвой, то, основываясь на работѣ Бретшнейдера, авторъ указываетъ, что на пространствѣ 1 десятины:

NH_3									
Смѣсь песка съ 1 % ульмина	поглощаетъ	въ	теченіе	года	17	ф.			
" " " 3	"	"	"	"	"	59	"		
" " " 5	"	"	"	"	"	112	"		

„Признавши справедливость приведенныхъ выше соображеній“, говоритъ проф. Костычевъ, „мы гораздо легче объяснимъ себѣ происхожденіе толстыхъ черноземныхъ слоевъ. Рупрехтъ, какъ извѣстно, объясняетъ ихъ образованіе тѣмъ, что частицы перегноя увлекались въ глубокіе слои механически-стекающею внизъ дождевою водою. Не отрицая возможности этого, мы думаемъ, что, вмѣстѣ съ этимъ, при проникновеніи въ глубокіе слои частицъ перегноя принималъ участіе NH_3 почвы, и что, слѣдовательно, перегной могъ просачиваться внизъ и въ видѣ раствора“...

Итакъ, образованіе въ почвѣ перегнойно-амміачныхъ соединеній, легко-растворимыхъ и легко-подвижныхъ и ихъ просачиваніе въ болѣе глубокіе горизонты ея — вотъ главнѣйшій источникъ темноцвѣтныхъ веществъ почвы, и способъ ихъ легкаго распредѣленія въ различныхъ горизонтахъ послѣдней.

Но какъ же объяснить себѣ дальнѣйшее прочное ихъ закрѣпленіе въ почвѣ? Основываясь на тѣхъ же работахъ вышеупомянутыхъ изслѣдователей и признавая, такимъ образомъ, что гуминовокислыя соли растворимы только тогда, когда въ нихъ преобладаетъ NH_3 и вообще щелочи, проф. Костычевъ

рисуется дальнѣйшую судьбу этихъ соединеній въ слѣдующемъ видѣ: во-1-хъ, амміакъ, въ силу процессовъ нитрификаціи, легко и быстро превращается въ почвѣ въ азотную кислоту (чѣмъ и объясняется тотъ фактъ, что, несмотря на постоянный, какъ мы видѣли, притокъ его въ почву, анализъ обычно открываетъ лишь сотыя, а чаще даже тысячныя доли процента этого вещества). Указанный же процессъ нитрификаціи неизбежно влечетъ за собой превращеніе растворимыхъ гуминовыхъ солей въ нерастворимыя—въ силу потери NH_3 ; во-2-хъ, растворимыя перегнойныя соединенія, встрѣчая въ почвѣ соли извести, магnezіи и желѣза и вступая съ ними въ реакціи обмѣннаго разложенія, превращаются въ столь мало-растворимыя формы, которыя съ трудомъ подвергаются растворяющему дѣйствию даже насыщенной углекислотой воды.

Если, какъ мы видѣли, образованіемъ въ почвѣ растворимыхъ перегнойно-амміачныхъ соединеній (какъ результатъ постоянного притока въ нее NH_3) проф. Костычевъ объясняетъ фактъ просачиванія гумуса въ различные горизонты ея, то потерей этими соединеніями амміака, въ силу процессовъ нитрификаціи, и превращеніемъ ихъ въ нерастворимыя соли извести, магnezіи и желѣза, онъ старается доказать и факты прочнаго закрѣпленія перегнойныхъ соединеній почвенными горизонтами.

Изложенная работа проф. Костычева представляетъ собой одну изъ первыхъ попытокъ къ стройному и цѣльному выясненію интересующаго насъ сейчасъ вопроса—способовъ и условій накопленія въ почвахъ перегноя.

Въ 1879 г. Заломановымъ сдѣланъ былъ въ И. В.-Э. Обществѣ докладъ, по своему содержанію близко касающійся того же вопроса ¹⁾.

¹⁾ Н. П. Заломановъ. „О вліяніи нѣкоторыхъ составныхъ частей почвы на образованіе чернозема“ („Тр. Имп. Вольно-Эк. Общ.“, 1879 г. Т. I, вып. III, стр. 273).

Исходя изъ того соображенія, что перегнойныя вещества образуютъ съ CaCO_3 нерастворимыя въ водѣ соединенія, и что эти послѣднія будто бы крайне непрочны, такъ какъ легко разлагаются въ почвѣ и превращаются въ CO_2 и H_2O —г. Заломановъ приходитъ къ убѣжденію, что известь сильно содѣйствуетъ окисленію и быстрому сгоранію органическихъ веществъ. Основываясь на этомъ положеніи, цитируемый авторъ считаетъ, что „черноземъ не можетъ образоваться въ почвѣ, содержащей значительное количество CaCO_3 ¹⁾, такъ какъ въ такой почвѣ всѣ органическія вещества разлагаются очень скоро“... Въ доказательство этого положенія г. Заломановъ приводитъ между прочимъ фактъ, что въ образцахъ чернозема (Тамбовской губ., Моршанскаго у.), изслѣдованныхъ имъ, въ верхнихъ горизонтахъ углекислой извести содержится отъ 0,15% до 0,2%, въ нижнихъ же (3—4 фута) около 7%, и что сообразно этому какъ разъ распредѣляется и окраска этихъ черноземовъ— въ верхнихъ слояхъ она темная, въ глубочихъ—значительно болѣе свѣтлая. Факты же (многочисленные) существованія черноземовъ, богатыхъ углекислой известью, авторъ объясняетъ тѣмъ, что почвы эти наноснаго характера. Приведа дальше наблюденіе проф. Ляковского, что чѣмъ выше лежитъ плоскогорье (Кавказа) надъ поверхностью моря, тѣмъ съ большимъ содержаніемъ органическихъ веществъ залегаетъ на немъ черноземъ, г. Заломановъ говоритъ: „Этотъ фактъ, какъ мнѣ кажется, можно объяснить тѣмъ, что изъ почвы вышележащаго плоскогорья углекислая известь, раньше извлеченная почвенною водою, дала возможность большому накопленію органическаго черноземнаго вещества“. Ничтожнымъ содержаніемъ въ почвѣ CaCO_3 , однако, нельзя, по автору, вполне объяснить образованіе чернозема и всѣхъ характерныхъ свойствъ его. Принимая во вниманіе особо-прочное соединеніе, въ которомъ

¹⁾ Выводъ этотъ представляется, съ современной точки зрѣнія, конечно совершенно невѣрнымъ.

находятся органическія красящія вещества чернозема съ неорганическими, и основываясь на данныхъ проф. П. Лачинова, что глиноземъ способенъ давать съ красящими веществами лаки, г. Заломановъ, послѣ цѣлаго ряда соображеній, отчасти подкрѣпленныхъ опытами, приходитъ къ тому выводу, что „красящее“ вещество чернозема и представляетъ собой прочное соединеніе перегнойныхъ веществъ именно съ глиноземомъ почвы. Въ конечномъ итогѣ цитируемый авторъ такъ резюмируетъ свои положенія: черноземъ можетъ образоваться на всякой почвѣ „когда изъ нея будетъ извлечена CaCO_3 , а глиноземъ будетъ находиться въ формѣ соединенія, способнаго соединиться съ перегнойными веществами. По извлеченіи CaCO_3 , можетъ начаться образованіе красящаго вещества чернозема, и, конечно, въ верхнихъ слояхъ почвы, гдѣ распространены корни растений; изъ этихъ слоевъ красящее вещество будетъ просачиваться въ нижніе слои, благодаря способности образоватъ съ углекислымъ амміакомъ и др. солями двойныя соединенія, растворимыя въ водѣ“ (стр. 281).

Изложенная работа г. Заломанова, равно какъ и упомянутое выше изслѣдованіе проф. Костычева, стремятся, такимъ образомъ, разрѣшить вопросъ объ условіяхъ и способахъ накопленія въ почвахъ гумуса — путемъ, собственно говоря, опять-таки побочныхъ соображеній, т. - е., путемъ попытки приложенія къ природнымъ условіямъ тѣхъ общихъ химическихъ реакцій и свойствъ, которыми обладаютъ перегнойныя соединенія, какъ химическіе индивидуумы, и которыя штудировались, какъ извѣстно, цѣлымъ рядомъ изслѣдователей (Сосюромъ, Мюльдеромъ, Детмеромъ, Эггертцомъ, Грандо и мн. др.).

Проф. Докучаевъ, въ своемъ извѣстномъ трудѣ ¹⁾ допускаетъ въ природѣ образованіе перегнойныхъ горизонтовъ

¹⁾ В. В. Докучаевъ, „Русскій черноземъ“ 1883, стр. 307.

уже гораздо болѣе разнообразными способами проникновенія гумуса съ поверхности: 1) проникновеніемъ еще не сгнившихъ растительныхъ частей черезъ видимыя трещины и различнаго рода норы животныхъ; 2) просачиваніемъ очень мелкихъ, уже обуглившихся частей растений черезъ поры почвы и, наконецъ, 3) просачиваніемъ растворовъ двойныхъ гуминовокислыхъ соединений. Опыты г. Баракова ¹⁾, опубликованные въ 1886 г., и стремятся доказать эти два послѣднія положенія непосредственнымъ путемъ.

Опыты эти распадутся на 2 категоріи: на наблюденія надъ просачиваніемъ а) химической вытяжки (перегнойно-амміачной, полученной по способу Грандо) черезъ опредѣленные смѣси, и б) просачиваніемъ черезъ тѣ-же самыя смѣси механически взмученныхъ мелкихъ частицъ чернозема. Смѣси эти, по процентному содержанію, имѣли слѣд. составъ:

	%	%
1-ая смѣсь заключала .	90 песка и	10 каолина.
2-ая " " . . .	80 "	20 "
3-ья " " . . .	70 "	30 "
4-ая " " . . .	85 предыдущей смѣси и	15 CaCO_3
5-ая " " . . .	60 песка и	40 каолина.

Указанныя смѣси, помѣщенные въ стеклянные цилиндры, слоемъ, приблизительно, до 50 с. высотой—поливались сверху, почти ежедневно, опредѣленнымъ количествомъ „чернаго вещества“ Грандо, и глубина просачиванія отмѣчалась на глазъ — по окрашиванію; по окончаніи же опыта смѣси послойно анализировались на гумусъ. Во всѣхъ цилиндрахъ констатированъ былъ фактъ просачиванія перегнойно-амміачной вытяжки, причемъ (привожу конечные выводы автора): 1) „по мѣрѣ увеличенія процентнаго содержанія глины, стало-быть, по мѣрѣ увеличенія связности смѣсей, скорость просачиванія пере-

¹⁾ П. Бараковъ „Опыты надъ просачиваніемъ перегноя черезъ искусственныя смѣси различнаго минеральнаго состава“ („Мат. по из. рус. почвъ“, 1886, вып. II).

гнойно-амміачной вытяжки уменьшается, а убыль гумуса въ послѣдовательныхъ слояхъ становится быстрее“.

2) „Чѣмъ глинистѣе (связнѣе) смѣси, тѣмъ рѣзче выступаютъ трещины, но вліяніе ихъ на просачиваніе и распре-дѣленіе гумуса въ почвѣ является подчиненнымъ составу смѣси“; и

3) „Прибавка извести, при прочихъ равныхъ условіяхъ, увеличиваетъ скорость просачиванія, но замедляетъ накопленіе гумуса въ нижнихъ слояхъ“ (въ силу образованія въ болѣе верхнихъ слояхъ нерастворимыхъ перегнойно-известковыхъ соединений).

Что касается опытовъ, произведенныхъ съ просачиваніемъ черезъ тѣ-же самыя смѣси механически-взмученныхъ мелкихъ частицъ чернозема, то и здѣсь, какъ и слѣдовало впрочемъ ожидать, таковое явленіе также имѣло мѣсто.

Въ конечномъ итогѣ, авторъ приходитъ къ тому заключенію, что перегнойные слои чернозема являются результатомъ, главнымъ образомъ, просачиванія какъ механическихъ мелкихъ частицъ перегноя, получающихся отъ разложенія растительности, такъ и въ видѣ амміачныхъ растворовъ этого перегноя (образующихся въ поверхностныхъ горизонтахъ почвы, какъ слѣдствіе воздѣйствія приносимаго дождями, росой а также и непосредственно поглощаемаго изъ воздуха самой почвой — амміака — на перегнойныя вещества).

Разсматривая задачи, положенныя въ основу этихъ опытовъ, а также полученные авторомъ выводы, мы можемъ, такимъ образомъ, видѣть, что работа эта мало внесла новаго въ интересующій насъ вопросъ. На возможность образованія въ почвахъ, при естественныхъ условіяхъ, перегнойно-амміачныхъ, легко-растворимыхъ соединений — указывалъ раньше, какъ-то мы видѣли, уже проф. Костычевъ (сущность-же реакціи амміака на перегнойныя вещества, конечно, выяснена была уже давно); что-же касается вообще возможности про-

сачиванія этихъ растворовъ въ почву, то это явленіе, конечно, болѣе чѣмъ обыкновенное и совершенно не нуждающееся въ опытной провѣркѣ. Нельзя не согласиться съ проф. Слѣзкинѣмъ ¹⁾, что „всѣ эти наблюденія физическаго явленія вполне понятны, и приложимы къ условіямъ просачиванія въ почву, какъ въ порошкообразное вещество, любой жидкости“... и далѣе: ...„для демонстраціи физическаго явленія не менѣе доказательно было-бы наблюденіе надъ просачиваніемъ чернаго кофейнаго настоя въ порошкообразную смѣсь“...

Съ 1884 года проф. Костычевѣмъ напечатанъ цѣлый рядъ работъ, въ которыхъ онъ совершенно отказывается отъ прежнихъ отстаиваемыхъ имъ взглядовъ, и въ которыхъ проводитъ свой новый взглядъ на условія и способы накопленія въ почвахъ гумуса ²⁾.

Прежде всего, вопреки своему прежнему мнѣнію (см. выше), проф. Костычевъ стремится доказать, что проникновенія перегнойныхъ веществъ въ почву путемъ просачиванія, въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ, — въ природныхъ условіяхъ быть не можетъ, и въ пользу этого мнѣнія приводитъ слѣдующія соображенія. Тѣ соединенія, которыя составляютъ почвенный перегной, состоятъ, согласно автору, изъ веществъ троякаго рода:—1) изъ веществъ, растворимыхъ въ водѣ, 2) изъ веществъ, растворимыхъ въ щелочахъ и 3) изъ веществъ нерастворимыхъ. Что касается первыхъ, то, хотя они и могутъ легко просачиваться черезъ почву, но, во-первыхъ,—ихъ въ каждомъ перегнойномъ веществѣ очень мало, а во-вторыхъ, они, въ силу своей легкой растворимости, претерпѣваютъ въ почвѣ судьбу воды—идутъ туда, куда и вода,

¹⁾ Слѣзкинъ—Этюды о гумусѣ, 1900, стр. 60.

²⁾ Костычевъ—1) „Объ условіяхъ образованія черноз. почвъ“ („Тр. И. В. Э. Общ.“, 1884 г. Т. III, вып. II, стр. 129); 2) „Почвы черноз. Обл. Россіи“, 1886, стр. 152 и слѣд.; 3) „Образованіе и свойства чернозема“, (Тр. С.-Пет. Общ. Естествоиспытателей, 1889, XX, стр. 123); 4) „О нѣкоторыхъ свойствахъ и составѣ перегноя“ („С. Х. и Лѣс“, 1890, IX, стр. 115) и др.

ихъ растворившая, и такимъ образомъ, накапливаться въ почвѣ не могутъ. Далѣе, вещества второго рода, т.-е., растворимыя въ щелочахъ (единственнымъ такимъ растворителемъ можетъ служить, по мнѣнію проф. Костычева, въ природныхъ условіяхъ—углекислый NH_3 , образующійся при разложеніи органическихъ веществъ и попадающій въ почву, кромѣ того, съ дождями, росой и пр.)—также не могутъ служить источникомъ накопленія въ почвѣ гумуса, ибо указанными путями въ почву приносится такое ничтожное количество этого растворителя (на 1 дес.—около 30 ф. NH_3 въ теченіе цѣлаго года), что сколько-нибудь значительному растворенію органическихъ веществъ способствовать онъ не можетъ. „Если мы примемъ въ соображеніе, что это количество распределяется на очень много дней и притомъ на пространствѣ цѣлой десятины, то на каждый кв. футъ придется такая ничтожная величина, что она едва-ли можетъ быть принимаема во вниманіе“ ¹⁾. Опровергая шагъ за шагомъ свои прежніе взгляды, проф. Костычевъ указываетъ далѣе, что и на тотъ NH_3 , который образуется при гніеніи органическаго вещества, рассчитывать также нельзя: онъ или поглотится верхними слоями почвы и, такимъ образомъ, тамъ задержится, или быстро превратится, въ силу процессовъ нитрификации, въ азотную кислоту. „Я самъ прежде держался иного мнѣнія, но теперь, при большемъ изученіи и обсужденіи относящихся сюда фактовъ, считаю необходимымъ измѣнить свои взгляды“ ²⁾. Что касается, наконецъ, просачиванія въ болѣе глубокіе горизонты почвы взмученныхъ нерастворимыхъ перегнойныхъ частицъ, то существованіе въ природѣ и этого процесса проф. Костычевъ отрицаетъ, исходя изъ того соображенія, что муть эта легко коагулируется въ присутствіи слабаго раствора солей, и, такимъ образомъ закупориваетъ пути

¹⁾ „Объ условіяхъ образованія черноз. почвъ“, 1884, стр. 132—133.

²⁾ Ibid., стр. 134.

проникновенія: „почвъ, не содержащихъ растворимыхъ солей, мы не знаемъ, а промываніе почвъ обыкновенныхъ до полного увлеченія растворимыхъ солей изъ слоя порядочной глубины положительно невозможно“. Нѣсколько позже въ своей известной работѣ „Почвы черноз. области Россіи“ (1886) проф. Костычевъ развилъ всѣ эти положенія значительно шире и подкрѣпилъ ихъ цѣлымъ рядомъ новыхъ соображеній и вычисленій.

Такимъ образомъ, проф. Костычевъ логически приходитъ къ тому выводу, что перегнойныя вещества почвы образуются въ послѣдней на мѣстѣ своего, такъ сказать, происхожденія, и представляютъ собой результатъ непосредственнаго перегниванія растительныхъ остатковъ, а отнюдь не могутъ распространяться въ почвѣ въ видѣ какихъ либо органическихъ растворовъ. Оставалось только рѣшить, на счетъ какихъ именно частей растений происходитъ обогащеніе почвы гумусомъ? По мнѣнію проф. Костычева—накопленіе и распредѣленіе въ почвахъ перегноя вполне ясно объясняется во всѣхъ случаяхъ и во всѣхъ мѣстностяхъ тѣмъ, что только одни корни травянистыхъ растений участвуютъ въ образованіи и накопленіи его. Главными обоснованіями этого взгляда являются слѣдующіе факты: распространеніе корней доходитъ обычно какъ разъ до той глубины, гдѣ оканчивается темная окраска почвы; на мѣстахъ съ лучшею растительностью накапливается и больше перегноя; распредѣленіе въ почвѣ перегноя находится въ полномъ соотвѣтствіи съ распредѣленіемъ корней; такъ, по изслѣдованіямъ Гелльригеля, на которыя ссылается проф. Костычевъ, видно, что если принять, что верхній слой почвы имѣетъ 100 корней, то слѣдующій за нимъ будетъ имѣть ихъ 59, дальнѣйшій—25, еще дальнѣйшій 15 и т. д. Содержаніе-же перегноя въ черноземѣ, напр., изъ Воронежской губ. измѣняется, по изслѣдованію цитируемаго автора, въ такой прогрессіи: 100—54—44—27—7, т.-е. замѣчается аналогичная постепенность умень-

шенія ¹⁾ и т. д. Итакъ, накопленіе перегнойныхъ веществъ обуславливается, въ силу всѣхъ этихъ соображеній, только согниваніемъ корней на мѣстѣ, а не просачиваніемъ органическихъ растворовъ сверху. Отрицая однако механическое и химическое просачиваніе этихъ соединений, проф. Костычевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, допускаетъ возможность біологическаго, такъ сказать, распространенія ихъ въ почвѣ, а именно — путемъ разноса ихъ различными грибами, исключительной работой которыхъ и обуславливается, по мнѣнію автора, образованіе въ почвѣ темноцвѣтныхъ продуентовъ разложенія растительныхъ остатковъ.

Ко всѣмъ этимъ выводамъ, проф. Костычевъ неизбѣжно долженъ былъ притти, разъ онъ считалъ, что въ природныхъ условіяхъ не имѣется обычно на лицо достаточнаго количества растворителя (главнымъ образомъ NH_3), благодаря которому могли бы образоваться и циркулировать въ почвѣ удобоподвижныя формы перегнойныхъ соединений; отсюда логическій выводъ объ образованіи темныхъ гумусовыхъ соединений на мѣстѣ ихъ непосредственнаго происхожденія.

Совершенно новую эру во всемъ этомъ запутанномъ вопросѣ сыграла работа проф. Леваковского, напечатанная въ 1888 г. ²⁾. Доказавъ цѣлымъ рядомъ вѣсскихъ соображеній, что корни растений представляютъ собою только вспомогательный, а не исключительный источникъ, изъ котораго заимствуются органическія вещества чернозема; что процессы пропильновенія въ почву нерастворимыхъ мельчайшихъ частицъ перегноя — играютъ слишкомъ ничтожную въ природѣ роль;

¹⁾ „Объ условіяхъ образов. черноз. почвъ“, 1884, стр. 141. Въ книгѣ „Почвы черноз. Обл. Россіи“ (стр. 169—171) приведены и другія, болѣе подробныя, данныя.

²⁾ И. Ф. Леваковский „Нѣкоторыя дополненія къ изслѣдованію надъ черноземомъ“. („Труды Общ. Испытателей Природы при И. Харьковскомъ Университетѣ“, 1888 г. Т. XXII, стр. 103).

что, наконецъ, нерастворимыя формы почвеннаго гумуса являются лишь результатомъ воздѣйствія неорганическихъ веществъ почвы на какія-то притекающія сверху растворимыя его соединенія, проф. Леваковскій впервые указалъ, что такія именно удобоподвижныя растворимыя органическія вещества — получаются, въ природныхъ условіяхъ, постоянно — подъ вліяніемъ воздѣйствія на отмирающіе растительные остатки (находящіеся даже въ свѣжѣмъ, неразложенномъ еще состояніи) — простой воды. „Вотъ эти то соединенія и могутъ непосредственно просачиваться въ почву и тамъ уже подвергаться длинному ряду превращеній для перехода въ состояніе настоящаго перегноя“. (стр. 120). Припомнимъ, что проф. Костычевъ въ одной изъ своихъ послѣднихъ работъ (см. стр. 80) также указалъ на возможность образованія и просачиванія черезъ почву растворимыхъ въ водѣ перегнойныхъ соединеній; но процессамъ этимъ онъ не придавалъ никакого значенія — съ одной стороны потому, что считалъ количество этихъ веществъ въ каждомъ перегнойномъ веществѣ ничтожнымъ, съ другой — потому, что не допускалъ возможности перехода ихъ въ почвѣ въ нерастворимое состояніе и, слѣдовательно, закрѣпленія ихъ тамъ.

Однако, излагаемая работа проф. Леваковскаго, а также позднѣйшія изслѣдованія проф. Слезкина и мои — рисуютъ этотъ вопросъ, какъ сейчасъ увидимъ, совершенно въ другомъ видѣ, и дадутъ намъ, какъ мнѣ кажется, полное основаніе считать ближайшимъ и непосредственнымъ источникомъ образованія въ почвѣ перегноя, именно — тѣ продукты органическаго характера, которые являются результатомъ прямого воздѣйствія атмосферныхъ осадковъ на разлагающіеся остатки отмершей растительности. Съ этой точки зрѣнія, взгляды, высказанные впервые проф. Леваковскимъ, мы должны признать, дѣйствительно, совершенно новой эрой въ области изученія генезиса почвеннаго перегноя.

Вернемся однако къ упомянутому изслѣдованію проф. Леваковского.

Работа эта была произведена съ цѣлью доказать, такимъ образомъ, что для наличности процессовъ просачиванія гумусовыхъ веществъ въ почву нѣтъ необходимости искать въ послѣдней какого-либо спеціальнаго щелочнаго растворителя для перегноя, а что органическія вещества, выщелачиваемыя уже простой водой изъ растительныхъ остатковъ — могутъ свободно проникать на извѣстную глубину въ почву и тамъ позднѣе, подвергаясь длинному ряду различныхъ химическихъ превращеній, давать начало именно темноцвѣтнымъ веществамъ гумуса. Итакъ — гумификація, по мнѣнію проф. Леваковского, происходитъ лишь позднѣе — въ самой почвѣ, какъ результатъ взаимодѣйствія растворимыхъ, органическихъ не перегнойныхъ соединений на составныя части этой почвы.

Что растительные остатки, даже въ свѣжемъ состояніи, содержатъ въ себѣ не мало такихъ легко-растворимыхъ въ водѣ соединений — проф. Леваковскій ссылается на указаніе проф. Менделѣева, что, напр., сухое луговое сѣно содержитъ въ себѣ около 40% растворимыхъ безазотистыхъ веществъ.

Добавлю пока отъ себя, что аналогичныхъ указаній на растворяющее дѣйствіе воды въ литературѣ мы имѣемъ весьма большое количество. Ис. Пьеръ ¹⁾ послѣдовательными водными вытяжками извлекъ до 16,57% веществъ изъ сѣна, причемъ это послѣднее значительно посвѣтлѣло, Работы I. Schröder'a ²⁾, O. Kellner'a ³⁾, Brunner'a ⁴⁾, Wolffa ⁵⁾, Га-

¹⁾ Comptes Rendus, 1857, p. 693.

²⁾ „Forstchemische und pflanzenphysiolog. Untersuchungen“, 1878.

³⁾ Ibid., s. 101.

⁴⁾ Ibid., s. 102.

⁵⁾ „Die rationelle Fütterung“, 1874, s. 116—117.

берландта ¹⁾, Эммерлинга ²⁾, Эйглинга ³⁾, Сестини ⁴⁾, Ramann'a ⁵⁾ и др. даютъ намъ въ этомъ отношеніи интереснѣйшій матеріалъ.

Необходимо, впрочемъ, оговориться, что всѣ только что упомянутыя работы касаются лишь вопроса, какія вещества и въ какихъ количествахъ выщелачиваются водой изъ различныхъ растительныхъ объектовъ, причемъ процессъ этотъ изучался авторами почти исключительно на одной лишь стадіи, безъ обращенія вниманія на вліяніе различныхъ степеней разложенности взятаго объекта на количество переходящихъ изъ него въ растворъ веществъ, на вліяніе различныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ факторовъ (t° , влажности, химической конституціи разлагающагося матеріала и пр.) и т. д. Кромѣ того, всѣ эти изслѣдованія нисколько не касаются и другихъ, не менѣе интересныхъ и важныхъ вопросовъ, а именно: какова дальнѣйшая судьба этихъ выщелоченныхъ водой продуктовъ, каково ихъ значеніе для химическихъ процессовъ почвы и т. п. Эту именно, наиболѣе интересную, сторону вопроса и стремится выяснить излагаемая работа проф. Леваковского.

Чтобы получить понятіе о самомъ началѣ процесса гумификаціи растворимыхъ въ водѣ веществъ, получаемыхъ путемъ выщелачиванія изъ растительныхъ остатковъ — цитруемый авторъ приготовлялъ водныя вытяжки изъ свѣжей ржаной соломы, а также изъ трухлой древесины орѣшины (изъ стараго плетня). Въ растворѣ изъ соломы, имѣвшемъ желтоватый цвѣтъ и въ растворѣ изъ древесины орѣшины, имѣвшемъ цвѣтъ крѣпкаго чая — съ теченіемъ времени образуется на по-

¹⁾ „Общее С. Хоз. Растеніеводство“, 1880, стр. 32—33.

²⁾ „Сел. Хоз. и Лѣсов.“ 1891, стр. 89 и слѣд. (Обз. заграничной литературы).

³⁾ Слѣзкинъ „Этюды о гумусѣ“, 1900, стр. 68.

⁴⁾ Ibid., стр. 54.

⁵⁾ „Die Einwirkung von Wasser auf Buchen — und Eichenstreu“, 1887. Также „Die Waldstreu...“ etc., s. 34.

верхности какое-то нерастворимое соединеніе въ видѣ плѣнки, которая, все болѣе увеличиваясь, опускается, наконецъ, на дно сосуда и ложится тамъ въ видѣ клочковатаго осадка, принимающаго послѣ фильтрованія и высыханія темнобурюю гумусообразную массу. Далѣе—проф. Леваковскій констатировалъ, что прибавленіе къ упомянутымъ сейчасъ растворамъ солей глинозема и окиси желѣза (а также мѣди) даетъ нерастворимый осадокъ бѣлаго студенистаго вида, который, при всплываніи на верхъ и при соприкосновеніи съ воздухомъ, темнѣетъ, бурѣетъ, а, пролежавши нѣсколько мѣсяцевъ во влажномъ помѣщеніи, дѣлается совершенно темнобурымъ.

Эту именно способность нѣкоторой части органическихъ веществъ, извлекаемыхъ водою изъ растительныхъ остатковъ, давать нерастворимыя соединенія съ солями глинозема и окиси желѣза—авторъ считаетъ крайне важнымъ условіемъ въ способѣ образованія чернозема и въ распредѣленіи въ немъ по различнымъ горизонтамъ перегноя. Основываясь на томъ, что получающіяся глиноземно—и желѣзоорганическія соединенія имѣютъ первоначально бѣлый цвѣтъ, а потомъ, спустя нѣкоторое время, бурѣютъ и темнѣютъ, проф. Леваковскій и предполагалъ, что именно такія органическія вещества, извлекаемыя атмосферною водою даже и изъ свѣжихъ растительныхъ остатковъ, соединившись химически съ глиноземомъ и окисью желѣза, и представляютъ собой тотъ матеріалъ, изъ котораго образуются темноцвѣтныя соединенія гумуса въ почвѣ. Подтвержденіе этому взгляду—проф. Леваковскій видѣлъ, между прочимъ, въ томъ фактѣ, что богатство чернозема перегнойными веществами связано, повидимому, съ обильнымъ содержаніемъ въ немъ глинозема и окиси желѣза.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, обративъ вниманіе на то, что и содержаніе извести является, согласно анализамъ проф. Докучаева и Шмидта, постоянною составною частью чернозема,

какъ самага почвеннаго горизонта, такъ и материнской породы, подстилающей его — проф. Леваковскій заключилъ, что известъ эта также играетъ не случайную роль въ образованіи перегной. Основываясь на анализахъ Шмидта, что бѣлая часть извести, извлекаемой холодной соляной кислотой, находится въ черноземахъ, также какъ глиноземъ и окись желѣза, въ соединеніи съ перегнойными веществами, и что соединеніе это растворимо, хотя и трудно, въ углекислой водѣ, и, приведя свой опытъ съ кусочкомъ мѣла, черезъ который снизу вверхъ просачивался водный растворъ свѣжей соломы, пріобрѣтавшій на поверхности куска мѣла темнобурю, гуму-сообразную окраску — авторъ и приходитъ къ заключенію, что известъ, вступая въ соединеніе не съ готовымъ уже перегноемъ, а со свѣжимъ воднымъ растворомъ органическаго вещества, — служить проводникомъ ихъ въ глубину — въ противоположность, такимъ образомъ, дѣйствию, производимому окисями алюминія и желѣза.

„Все вышеприведенное показываетъ“, говоритъ проф. Леваковскій, „что органическія соединенія, растворимыя въ водѣ, не циркулируютъ съ нею безконечно вверхъ и внизъ, какъ говоритъ г. Костычевъ, а болѣею частью, фиксируются, вступая въ соединеніе съ неорганическими веществами чернозема“.... (стр. 128).

Для насъ представляютъ, такимъ образомъ, особый интересъ слѣд. положенія проф. Леваковского: 1) что вода въ состояніи извлекать изъ отмершихъ, даже и не испытанныхъ еще на себѣ процессовъ разложенія, растительныхъ остатковъ, нѣкоторое количество органическихъ соединеній (минеральныхъ, растворимыхъ въ водѣ, веществъ авторъ не касается); 2) что эти выщелоченныя водою органическія вещества даютъ съ известью почвы растворимыя, удобоподвижныя соединенія и 3), что эти выщелоченныя вещества, встрѣчая въ почвѣ соли глинозема и окиси желѣза, превращаются въ нерастворимыя

соединенія, закрѣпляются въ почвѣ, и служатъ въ ней источникомъ гумусовыхъ темноцвѣтныхъ образований.

Я не буду останавливаться на отвѣтной статьѣ проф. Костычева ¹⁾, появившейся вскорѣ послѣ цитированной работы проф. Леваковского. Большая часть этой статьи (т. е. III-ей главы) посвящена Костычевымъ отстаиванію его прежнихъ взглядовъ; что же касается основныхъ положеній Леваковского, то они остались, въ сущности говоря, совершенно не опровергнутыми; развѣ только количественная сторона указанныхъ Леваковскимъ процессовъ встрѣтила, казалось, серьезное возраженіе, такъ какъ Костычевъ допускалъ возможность растворенія изъ растительныхъ остатковъ большого количества органическихъ веществъ лишь въ болотѣ, а не въ почвѣ: — „дождевая вода дѣйствуетъ на неизмельченные растенія и быстро скатывается съ нихъ, — не успѣвая оказать значительнаго дѣйствія“ „дождевая вода дѣйствуетъ совсѣмъ не такъ, какъ вода, употребляемая при химическомъ анализѣ, для опредѣленія количества растворимыхъ веществъ“ ... (стр. 162). Нѣсколько ниже мы увидимъ, однако, что и это возраженіе является необоснованнымъ.

Нѣкоторымъ пробѣломъ въ изложенной работѣ проф. Леваковского является, конечно, то обстоятельство, что авторъ совершенно не подвергалъ анализу получаемыя водныя вытяжки изъ растительныхъ матеріаловъ и мы, такимъ образомъ, лишены возможности проникнуть въ ближайшую сущность наблюдаемыхъ процессовъ и реакцій. Пробѣлъ этотъ до нѣкоторой степени восполняется работами Hoppe-Seyler'a ²⁾, который почти одновременно работалъ въ этой области съ проф. Леваковскимъ. На этихъ изслѣдованіяхъ я, однако, не

¹⁾ „Образованіе и свойства перегноя“, глава III („Тр. С.-Петерб. Общ. Естествоиспытателей“, 1889, Т. XX).

²⁾ „Zeitschr. für physiologische Chemie“, 1888, XIII. s. 66. — „Naturw. Rundschau“, 1889, № 7, s. 82. — „Forschungen“... etc. 1889, XII, s. 244.

останавливаюсь, такъ какъ они не имѣютъ прямого отношенія къ нашей задачѣ и касаются болѣе частнаго вопроса — изъ какихъ составныхъ частей растеній образуются вещества гумуса. Укажу только, что нахожденіе въ водныхъ продуктахъ выщелачиванія растительныхъ остатковъ — „флобафеновъ“ и красныхъ дубильныхъ веществъ, которыя, оказывается, даютъ совершенно тѣ же реакціи, какъ и гуминовые вещества, получаемыя изъ почвы — дало возможность Норре-Seyler'у въ свою очередь признать, что источниками почвеннаго перегноя являются, дѣйствительно, выщелачиваемыя дождевой водой изъ отмершихъ растительныхъ остатковъ органическія вещества. Такимъ образомъ, Норре-Seyler, на основаніи анализа состава водныхъ вытяжекъ пришелъ къ тому же самому выводу, который былъ сдѣланъ проф. Леваковскимъ.

Въ 1900 г. появилось изслѣдованіе проф. Слѣзкина ¹⁾, которое еще болѣе способствовало выясненію интересующаго насъ вопроса въ направленіи, данномъ ему впервые проф. Леваковскимъ.

Основываясь на выводахъ проф. Леваковского и Норре-Seyler'a, что продукты выщелачиванія атмосферной водой растительныхъ отмершихъ остатковъ и являются, повидимому, непосредственными гумусообразователями, проф. Слѣзкинъ прежде всего задался цѣлью выяснить, существуетъ ли, и если да, то какое, соотношеніе между золой выщелачиваемыхъ продуктовъ и золой черной гумусовой вытяжки. Методъ, несомнѣнно, прямымъ путемъ ведущій къ разрѣшенію задачи. Съ указанной цѣлью авторомъ сдѣлано нѣсколько анализовъ, матеріаломъ для которыхъ послужили водныя вытяжки сѣна и соломы на разныхъ стадіяхъ разложенія. Сравнительное распредѣленіе вещества вытяжекъ между осадкомъ отъ прибавленія соляной кислоты и растворомъ — видно изъ слѣдующихъ цифръ:

¹⁾ Слѣзкинъ, „Этюды о гумусѣ“, 1900, Кіевъ.

	Въ 1 литрѣ вытяжки сух. вещ.	Въ осадкѣ.	Въ растворѣ.
	Въ грам.	Въ грам. %	Въ грам. %
150 гр. сѣна	3,9402	0,4830 12,3	3,4572 87,7
150 „ соломы	2,0276	0,2324 11,4	1,7952 88,6
50 „ долго разлаг. сѣна	3,4486	0,8134 23,6	2,6352 76,4
50 „ „ „ корней	5,0133	1,3906 27,7	3,6227 72,3
50 „ еще дольше разлаг. сѣна.	2,2976	1,2286 53,5	1,0690 46,5

Такимъ образомъ, вещество вытяжки остается преимущественно въ растворѣ. Сравнивая цифры для свѣжаго и разлагающагося матеріала, по приведеніи къ одному количеству матеріала, мы видимъ, что:

	Дали всего.	Въ осадкѣ.
50 гр. сѣна	1,3134	0,1610
50 „ соломы	0,6759	0,0775
50 „ долго разлаг. сѣна	3,4486	0,8134
50 „ „ „ корней	5,0133	1,3906
50 „ еще дольше разлаг. сѣна .	2,2976	1,2286

На основаніи этихъ цифръ, авторъ дѣлаетъ заключеніе, что по мѣрѣ разложенія, густота вытяжки возрастаетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ абсолютно и относительно возрастаетъ количество осаждаемое соляной кислотой, и что корневая вытяжка оказывается абсолютно богаче всѣхъ, равно и осадокъ ея. „Этотъ фактъ наводитъ на мысль о большемъ богатствѣ корневыхъ тканей выщелачиваемыхъ веществомъ (флобафенами по Норре-Seyler'у), въ связи съ большой потребностью корней въ защитѣ отъ разложенія и при жизни ихъ“.

Сжиганіемъ полученныхъ продуктовъ опредѣлялась ихъ зола. Зольныя части распредѣляются между осадкомъ и растворомъ тоже неравномѣрно:

	Все вещ. вытяжки.		Осадокъ.		Растворъ.	
	гг.	%	гг.	%	гг.	%
Сѣно	0,4490	19,6	0,0900	7,3	0,3580	33,5 (прод. разл.)
	0,4670	13,5	0,0715	8,8	0,3950	15,0 (тоже)
Корни	0,4405	8,8	0,0840	6,0	0,3560	9,8 (тоже)

	Все вещ. вытяжки.		Осадокъ.		Растворъ.	
Сѣно.	1,3944	35,4	0,0088	1,8	1,3856	40,0 (свѣжее)
Солома.	0,6570	32,4	слѣды		0,6570	36,6 (свѣжая)
Сѣно.	—	—	0,0370	3,7	—	—
Сѣно.	—	—	0,0450	4,3	—	—

т. е., вытяжки изъ свѣжаго матеріала даютъ, оказывается, „большее относительное содержаніе золы для всей вытяжки и для растворимой части, а осадокъ отличается бѣдностью золой. Вытяжка разлагающагося сѣна даетъ осадки съ большимъ $\%$ золы. При далеко подвинувшемся разложеніи, когда вытяжка принимаетъ темно-бурую окраску, осадокъ становится еще богаче золой. Относительно вытяжки корней интересно отмѣтить общую бѣдность золой и болѣе ровное распредѣленіе послѣдней между осадкомъ и растворомъ“.

Обратимся теперь къ составу золы:

	SiO_2		Осадокъ отъ NH_3		P_2O_5		CaO		MgO		Хлор. щелочи.	
	Раств.	Осад.	Раств.	Осад.	Раств.	Осад.	Раств.	Осад.	Раств.	Осад.	Раств.	Осад.
Свѣжее сѣно. . .	3,5	—	12,7	—	17,5	—	8,5	—	7,3	—	50,3	—
Свѣжая солома .	0,6	—	28,3	—	2,1	—	1,2	—	2,1	—	60,0	—
Разлаг. сѣно. . .	16,9	40,7	10,9	28,0	13,0	27,0	13,8	—	5,6	6,4	33,8	0
Долго разл. сѣно.	14,4	19,0	19,4	8,4	16,5	30,6	—	—	—	—	—	—
Долго разл. корни.	22,8	88,5	28,3	10,8	15,5	Сл.	—	—	—	—	34,3	0

„Къ этимъ показаніямъ надо добавить, что въ составѣ осадка отъ NH_3 входили лишь алюминій и фосфорная кислота. Желѣза въ составѣ веществъ вытяжекъ совсѣмъ не было“ ¹⁾.

Что касается щелочей, то онѣ присутствуютъ только въ золѣ растворимаго вещества, SiO_2 и P_2O_5 оказались болѣе въ осадкахъ, CaO —въ растворѣ.

¹⁾ Анализы Schröder'a („Forstchemische und pflanzenphysiol. Untersuchungen“, 1878), Ramann'a („Die Einwirkung von Wasser auf Buchen—und Eichenstreu“, 1887) и мои (о нихъ ниже) совершенно расходятся съ этимъ выводомъ уважаемаго автора.

Признавая вмѣстѣ съ Леваковскимъ и Horre-Seyler'омъ указанныя вещества за непосредственныхъ гумусообразователей — проф. Слѣзкинъ сопоставляетъ вышеприведенныя цифры съ цифрами состава золы черныхъ вытяжекъ почвы и находитъ, что „качественная разница въ составѣ осадковъ заключается въ желѣзѣ черного вещества, которое упорно остается въ осадкѣ при послѣдовательныхъ отщепленіяхъ растворимаго вещества. Въ количественномъ отношеніи есть сходство золы осадковъ въ видѣ преобладанія SiO_2 “. На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ авторъ и заключаетъ, что „зола гумуса (кроме желѣза) является, дѣйствительно, остаткомъ золы растенія и гумусообразователя“ и далѣе: „разница состава, заключающаяся въ присутствіи желѣза въ гумусѣ, можетъ быть объяснена только присоединеніемъ его извнѣ, изъ почвы“.

Такимъ образомъ, если Horre-Seyler считалъ продукты воднаго выщелачиванія растительныхъ остатковъ настоящими гумусообразователями на основаніи органическаго состава этихъ вытяжекъ, то проф. Слѣзкинъ приходитъ къ тому же самому выводу на основаніи ихъ минеральнаго состава.

Какова же дальнѣйшая судьба этихъ выщелачиваемыхъ простой водой продуктовъ въ почвѣ? Какія измѣненія претерпѣваютъ они при соприкосновеніи съ составными частями послѣдней? Какъ идетъ процессъ ихъ постепенной гумификаціи?

Для выясненія этого вопроса, проф. Слѣзкинымъ были организованы соответствующіе опыты.

Были взяты пластинки чистаго тонкаго стекла, размѣромъ 8 и 10 сант.; между пластинками проложены съ трехъ сторонъ квадратнаго сѣченія полоски гуттаперчи, и пластинки плотно сжаты гуттаперчевыми же кольцами. Такой сосудикъ съ прозоромъ въ $\frac{3}{4}$ сант. свободно укладывался на предметномъ столикѣ, что давало возможность наблюдать, при извѣстномъ увеличеніи, происходящее въ средѣ между пластинками. Результатовъ микроскопическихъ изслѣдованій автора надъ рас-

пространеніемъ плѣсневыхъ грибовъ и пр. я не излагаю. Укажу только на тѣ данныя, которыя получены были имъ въ опытахъ съ лессомъ и которыя до нѣкоторой степени выясняютъ химизмъ взаимодействія съ этимъ веществомъ просачивающихся продуктовъ выщелачиванія. Замѣтивъ, что плѣсневая грибница развивается въ лессѣ слабо, но крайне своеобразно по сравненію съ другими породами (отдѣльными гнѣздами) и подозрѣвая здѣсь участіе CaCO_3 —существенной составной части лесса,—авторъ произвелъ опыты въ одномъ случаѣ съ неизмѣненнымъ лессомъ, въ другомъ—отмывая изъ него CaCO_3 кислотой ¹⁾ и пришелъ къ убѣжденію, что органическія вытяжки, встрѣчая въ средѣ, въ которую просачиваются, углекислую известь, соединяются съ ней, осѣдаютъ на ея частицахъ, пропитывая и связывая вмѣстѣ съ тѣмъ и иловатую часть почвы. При этомъ органическое вещество переходитъ изъ растворимаго и отчасти коллоидальнаго состоянія въ свернутое, нерастворимое. „Въ этомъ соединеніи органическое вещество и сохраняется въ почвѣ, не подвергаясь болѣе быстрому разрушительному дѣйствию плѣсневыхъ грибовъ, а только медленному окисленію, и по мѣрѣ послѣдняго постепенно принимаетъ видъ и составъ нерастворимаго почвеннаго гумуса“. Другими словами известь является, согласно проф. Слѣзкину, необходимымъ факторомъ для закрѣпленія и сохраненія гумуса, и постепенное обѣднѣніе почвенныхъ горизонтовъ, въ силу тѣхъ или другихъ условій, известью можетъ повести къ исчезновенію изъ этихъ горизонтовъ гумуса и „къ естественной смерти черноземныхъ образований“.

Что же касается того вопроса, каково происхожденіе въ почвенномъ перегноѣ соединеній желѣза, котораго, по анализамъ автора, не оказывается въ выщелачиваемыхъ изъ растительныхъ остатковъ водой продуктахъ, то онъ склоненъ пред-

¹⁾ Не отмывались-ли при этомъ и другія составныя части лесса, напр. часть Al и Fe ?

полагать, что желѣзо это получается извнѣ, изъ почвы, и что это взаимодействіе органическаго растворимаго вещества съ желѣзистыми веществами почвы, въ водѣ нерастворимыми, происходитъ крайне медленно и постепенно, когда органическое вещество уже осядетъ отъ вліянія извести, и пропитается, осаждаясь, иловатую, содержащую желѣзные соединенія, часть почвы. Въ виду этого, авторъ отказывается приписывать желѣзу въ почвѣ ту же роль, какая принадлежитъ извести.

Какъ видимъ, проф. Слѣзкинъ, вполне присоединяясь къ исходному положенію, высказанному Леваковскимъ и Норре-Seyler'омъ относительно водныхъ растворовъ изъ растительныхъ остатковъ, какъ ближайшихъ источниковъ въ почвѣ гумуса—совершенно однако расходится съ первымъ изъ упомянутыхъ изслѣдователей относительно роли извести и желѣза въ процессахъ накопленія этого вещества, и приходитъ при изученіи этой стороны вопроса какъ разъ къ противоположному выводу.

Какъ извѣстно, въ почвовѣдѣніи можно считать теперь установившимся взглядъ на известъ, какъ именпо на охранительное начало въ почвѣ гумуса (вспомнить тѣсную связь черноземныхъ почвъ съ материнскими породами, богатыми известью, образованіемъ подъ лѣсомъ рендзинъ и боровинъ—именно на известнякахъ и т. п.) ¹⁾. Съ этой точки зрѣнія выводъ проф. Слѣзкина относительно роли извести въ почвѣ находить себѣ самое широкое подтвержденіе въ фактахъ, наблюдаемыхъ нами въ природѣ.

Подтвердивъ, такимъ образомъ, путемъ анализа минеральнаго состава продуктовъ воднаго выщелачиванія растительныхъ остатковъ, изложенный выше основной выводъ Леваковскаго, проф. Слѣзкину оставалось доказать, что указанные процессы

¹⁾ См. напр. Hilgard („Forsch. auf dem Gebiete der Agr.-Phys“, 1892, S. 400); Ramann („Organogene Ablagerungen der Jetztzeit“); Докучаевъ, („Русскій Черноземъ“) и мн. др.

являются вполне обычными въ природныхъ условіяхъ, и что „не надо ни уподобленія болоту, ни тропическихъ ливней для успѣшнаго выщелачиванія“ (какъ то, наоборотъ, утверждалъ проф. Костычевъ въ своемъ возраженіи Леваковскому—см. выше).

Съ этой цѣлью авторъ взялъ въ своихъ опытахъ сѣно въ 4 порціяхъ по 20 гр. въ каждой и приводилъ ихъ въ 4 стаканахъ въ соприкосновеніе съ различнымъ количествомъ воды (200 с.с., 300 с.с., 400 с.с. и 500 с.с.). По истеченіи двухъ сутокъ пробы были слиты, отжаты подъ прессомъ, профильтрованы черезъ полотно, и въ нихъ опредѣлено было общее количество золы. Результаты получены слѣдующіе:

	Gr. сух. вещ.	Золы.	% сух. вещ.	% золы.
I	1,600	0,3850	8	24
II	1,6200	0,3967	8,1	24,5
III	1,6940	0,3986	8,47	23,6
IV	1,7530	0,3536	8,77	20,1

На основаніи этихъ цифръ авторъ и заключаетъ, что „количество взятой воды играетъ очень малую роль, и при пятерномъ количествѣ потеря возросла лишь на очень малую величину сравнительно съ одиночнымъ“. . . . „Что можетъ быть взято изъ свѣжаго вещества водою, то берется небольшимъ количествомъ воды при естественныхъ условіяхъ“. Наименьшее количество, необходимое для выщелачиванія изъ растительныхъ остатковъ почти всего растворимаго въ немъ вещества это—10 с.с. H_2O на 1 gr. вещества ¹⁾.

¹⁾ Деталь эта, конечно, слишкомъ схематична, и къ различнымъ растительнымъ объектамъ непримѣнима (см. мою работу „Матер. къ изученію процессовъ разложенія растительныхъ остатковъ въ почвѣ“, стр. 45 и слѣд.). Что же касается общаго положенія, что уже первыя порціи воды производятъ быстрое и, дѣйствительно, довольно полное выщелачиваніе органическихъ и зольныхъ соединеній изъ растительныхъ объектовъ, то это вполне подтверждается опытами Ramann'a („Die Einwirkung von Wasser auf Buchen—und Eichensteu“, 1887; „Die Waldstreu“...etc., S. 34; „Bodenkunde“ 2-te Aufl., S. 358), а также моими (l. c., стр. 46 и 61). Аналогичныя ука-

Изложенными работами проф. Леваковского, Норре-Seyler'a и проф. Слѣзкина—несомнѣнно, намѣчаются совершенно новые пути къ разрѣшенію вопроса объ условіяхъ образованія и накопленія въ почвахъ перегноя, и вообще—послѣ этихъ работъ интересъ къ растворимымъ продуктамъ, извлекаемымъ водой изъ различныхъ растительныхъ остатковъ, значительно возрастаетъ.

Въ 1904 г., по предложенію моего глубокоуважаемаго учителя проф. Рамапп'а (Мюнхень), я приступилъ къ систематическому изученію этихъ водно-растворимыхъ продуктовъ. Въ качествѣ объектовъ служили мнѣ не только свѣжіе растительные матеріалы, но и находящіеся на различныхъ стадіяхъ разложенія.

Первоначально — задачей моихъ опытовъ было рѣшеніе болѣе частнаго вопроса, а именно — изученіе процессовъ послѣдовательной минерализаціи разлагающихся растительныхъ матеріаловъ, т.-е., выясненіе, слѣдовательно, характера и интенсивности процессовъ разложенія этихъ объектовъ, но не по количеству выделяемой ими CO_2 , какъ это обычно дѣлается, а непосредственно по учету постепенно отщепляющихся изъ нихъ минеральныхъ, растворимыхъ въ водѣ, продуктовъ. Хотя, такимъ образомъ, продукты эти въ качествѣ именно гумусо-образователей первоначально совершенно и не изучались, но, попутно, помощью побочныхъ соображеній, выяснялась до нѣкоторой степени и эта сторона вопроса. Позднѣе, по мѣрѣ хода работъ, перспективы настолько усложнились, и рамки этихъ работъ настолько расширились, что невольно пришлось перенести центръ тяжести ихъ совершенно въ другую сторону и затронуть цѣлый рядъ и другихъ, не менѣе важныхъ, сторонъ даннаго вопроса. Уже первыя мои работы въ этой области показали мнѣ, что въ лицѣ растворимыхъ въ водѣ продуктовъ

занія имѣемъ въ работѣ J. Schröder'a („Forstchem. und pflanzenphysiol. Untersuchungen“, 1874) и др.

разложенія растительныхъ остатковъ мы должны видѣть дѣйствительно одинъ изъ важнѣйшихъ фактовъ почвообразования. Въ 1908 г. по этому вопросу я писалъ ¹⁾: „...Процессы растворенія атмосферными водами отщепляющихся соединений при разложеніи органическихъ остатковъ и проникновенія ихъ въ почву, представляютъ собой самое обычное и естественное явленіе въ природѣ, всюду, гдѣ есть растительность и достаточное количество атмосферныхъ осадковъ. Вмываемые водой эти растворимые продукты распада органическихъ остатковъ (листьевъ, сучьевъ, корней, стеблей), ежегодно поступаая въ почву и, принимая тамъ самое дѣятельное участіе во многихъ физическихъ и химико-біологическихъ процессахъ, должны быть отнесены къ однимъ изъ важнѣйшихъ естественныхъ факторовъ почвообразования. Количественный и всесторонній учетъ этихъ процессовъ долженъ считаться крайне важной, хотя и очень сложной задачей. Различныя условія климата и погоды, различный характеръ и свойства почвы, составъ и строеніе разлагающихся растительныхъ матеріаловъ и пр.—все это налагаетъ свой особый отпечатокъ на упомянутые процессы“.

„Съ другой стороны, всѣ эти „минерализованные“ продукты разложенія должны быть признаны играющими существеннѣйшую роль и въ питаніи растений. Дѣйствительно, какія-же соединенія почвы являются наиболѣе доступными корнямъ растений, какъ не легко-растворимыя въ водѣ? Далѣе, вытягиваніе корнями растений питательныхъ веществъ изъ болѣе глубокихъ горизонтовъ почвы, накопленіе ихъ въ подземныхъ частяхъ, послѣдующее отмираніе и согниваніе этихъ частей, вымываніе растворимыхъ продуктовъ этого согниванія въ почву, процессы поглощенія ихъ поверхностными горизонтами послѣдней и т. д., все это должно вызывать сложныя перераспредѣленія питательныхъ веществъ по различнымъ

¹⁾ Кравковъ. „Матеріалы къ изуч. процессовъ разлож. растит. остатковъ въ почвѣ“, 1908, стр. 12—14.

горизонтамъ почвы и играть, так. обр., весьма важную роль въ плодородіи послѣдней, особенно, если мы примемъ во вниманіе, что растительный организмъ кислотными выдѣленіями своихъ корней часто переводитъ въ свои ткани трудно-растворимыя въ водѣ соединенія почвы, которыя, послѣ отмиранія и сгниванія этого организма, дѣлаются, такимъ образомъ, въ извѣстной своей части, легко-растворимыми.

Правда, въ естественныхъ условіяхъ, мы можемъ встрѣтиться и съ противоположнымъ процессомъ, т.-е., нереходомъ легко-растворимыхъ продуктовъ разложенія въ трудно-растворимыя, неудобоусвояемыя растеніемъ, соединенія (какъ результатъ того или другого явленія взаимодѣйствія съ составными частями почвы). Все это лишній разъ подчеркиваетъ настоятельную необходимость экспериментальнаго освѣщенія всѣхъ этихъ, столь важныхъ для земледѣлія, процессовъ "...

Я привелъ эту цитату изъ своей работы для того, чтобы показать, какъ много, дѣйствительно, является и другихъ различныхъ побочныхъ вопросовъ, при ближайшемъ изученіи растворимыхъ въ водѣ продуктовъ, разложенія—уже и помимо основного, интересующаго насъ въ данный моментъ, вопроса—о водныхъ продуктахъ этого разложенія, какъ о ближайшихъ и непосредственныхъ источникахъ гумусообразования въ почвѣ. Къ сожалѣнію надо сказать, что продукты эти являются до сихъ поръ крайне мало изученными. Какъ идетъ эта постепенная минерализація, въ какой послѣдовательности отщепляются тѣ или другія растворимыя соединенія—въ зависимости отъ различныхъ внѣшнихъ и внутреннихъ условій, какое участіе принимаютъ они въ жизни почвы, какія производятъ тамъ измѣненія, какой смыслъ имѣютъ эти процессы въ жизни растеній и т. п.—все это вопросы, которые до сихъ поръ являются, съ экспериментальной стороны, часто и не затронутыми ¹⁾.

¹⁾ Литература этихъ сторонъ вопроса сведена въ моей вышеупомянутой работѣ.

Возвращаясь однако къ прерванному изложенію, ознакомимся теперь, въ видахъ бѣльшей цѣльности и связности дальнейшихъ, приводимыхъ въ этой главѣ, выводовъ и положеній, съ тѣми результатами, которые до сихъ поръ получены были мною въ области интересующаго насъ сейчасъ вопроса ¹⁾. Какъ я упомянулъ уже выше, мои первые опыты въ указанной области не имѣли своей ближайшей цѣлью непосредственнаго выясненія затронутого вопроса. Тѣмъ не менѣе, нѣкоторые побочныя соображенія и выводы изъ этихъ опытовъ помогаютъ намъ до нѣкоторой степени ориентироваться и въ данномъ вопросѣ—вопросѣ объ условіяхъ образованія и накопленія въ почвѣ гумуса. Ознакомившись съ этими выводами, мы перейдемъ уже къ разсмотрѣнію и новыхъ, имѣющихся у меня по этому вопросу, данныхъ.

Прежде всего, укажу, что этими опытами было констатировано, что чистая вода, дѣйствительно, въ состояніи переводить въ растворъ весьма значительное количество какъ зольныхъ, такъ и органическихъ соединений, даже и изъ такихъ растительныхъ остатковъ, которые еще не подвергались процессамъ разложенія.

Съ этой цѣлью взято было возможно бѣльшее количество разнообразныхъ растительныхъ объектовъ, и путемъ полученія изъ нихъ водныхъ вытяжекъ (время соприкосновенія съ водой—1 часъ) и послѣдующаго анализа послѣднихъ, узнавалось количество перешедшихъ изъ этихъ объектовъ въ растворъ веществъ. Результаты сведены въ слѣдующей таблицѣ ²⁾.

¹⁾ S. Krawkoff. „Über die Einwirkung der in Wasser löslichen Mineralbestandteile der Pflanzenreste auf den Boden“ („Journ. für Landw.“, 1905, S. 279).

— „О растворимыхъ въ водѣ продуктахъ разложенія органич. веществъ“. („Мат. по изуч. русскихъ почвъ“, вып. XVII, 1906 г.).

— „Материалы къ изученію процессовъ разложенія растит. остатковъ въ почвѣ“, 1908.

²⁾ Подробно — см. „Матер. къ изученію процессовъ разложенія“ и пр. стр. 51 и слѣд.

Изъ 1000 ч. сух. вещ.
перешло въ растворъ.

Сумма золы.

	элементовъ (m): гг.	Органич. вещ. (o). гг.	Отношеніе m : o.	Среднее.
Листья дуба	4,47	16,31	1 : 3,64	1 : 3,74
„ березы.	3,37	13,81	1 : 4,09	
„ осины	5,84	20,02	1 : 3,43	
„ ольхи	3,42	13,00	1 : 3,80	
Хвоя сосны	1,50	2,33	1 : 1,55	1 : 1,59
„ ели	1,10	1,89	1 : 1,70	
„ пихты	1,23	1,87	1 : 1,52	
Солома ржаная	0,87	1,63	1 : 1,87	1 : 2,13
„ овсяная	1,41	3,02	1 : 2,14	
„ ячменная	1,04	2,47	1 : 2,37	
Степное сѣно	2,90	14,95	1 : 5,15	1 : 5,65
Луговое „	2,12	14,02	1 : 6,61	
Клеверн. „	3,42	17,78	1 : 5,19	
Корни ржи.	25,76	31,63	1 : 1,22	1 : 1,19
„ овса.	22,40	28,00	1 : 1,25	
„ ячменя.	31,77	35,73	1 : 1,12	

Обращая пока вниманіе на общее количество лишь органическихъ соединеній, растворяемыхъ водой изъ свѣжихъ растительныхъ объектовъ, мы можемъ сказать, что:

Изъ хвоя (въ среднемъ изъ 3 случаевъ) перешло въ растворъ

изъ 1000 ч. сухого вещества	2,03 гг.
„ соломы.	2,37 „
„ сѣна.	15,58 „
„ листьевъ (въ среднемъ изъ 4 случаевъ).	15,78 „
„ корней („ „ „ 3 „).	31,78 „

Быть можетъ, эти абсолютныя количества переводимыхъ въ растворъ органическихъ соединеній и не такъ велики, но не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло со свѣжими, еще неразлагавшимися, объектами. Даже если предположить несуществующій въ природѣ случай, что ежегодно отмирающіе растительные остатки, остаются постоянно свѣжими и не разлагаются, то и тогда мы должны предвидѣть, что въ теченіе ряда лѣтъ, почва можетъ получить изъ нихъ, при помощи растворяющей дѣятельности атмосферной воды, дѣйствительно гро-

мадное количество органическаго вещества. „Кто же теперь не знаетъ, что и на земной поверхности и внутри нашей планеты самые величайшіе результаты получаются самыми микроскопическими дѣятелями, лишь бы было достаточно времени?“ Къ этимъ словамъ проф. Докучаева ¹⁾, сказаннымъ по другому поводу, нельзя всецѣло не присоединиться и въ данномъ случаѣ.

Дальнѣйшіе опыты съ разложениемъ упомянутыхъ растительныхъ матеріаловъ показали ²⁾, что существуетъ довольно правильное соотношеніе между указаннымъ выше количествомъ вымываемыхъ водой зольныхъ и органическихъ веществъ изъ свѣжихъ, неподвергавшихся процессамъ разложенія, растительныхъ остатковъ—съ одной стороны, и энергіей, съ которой протекаетъ у этихъ объектовъ процессъ постепенной минерализаціи при ихъ разложеніи—съ другой. Дѣйствительно, если взятые для опыта растительные матеріалы по количеству заключающихся въ нихъ растворимыхъ соединеній располагаются, какъ мы видѣли, въ порядкѣ: корневая система, листья, сѣно, солома, и, наконецъ, хвоя,—то въ томъ же порядкѣ, оказывается, мы должны ихъ расположить и по энергіи ихъ разлагаемости. Переносъ эти выводы въ природу и, основываясь на вышеприведенныхъ данныхъ Леваковского, Норре-Seyler'a и Слѣзкина, что всѣ эти выщелачиваемыя водой вещества и и представляютъ собой главнѣйшіе источники гумусообразования,—мы не можемъ не придти къ тому заключенію, что тотъ или другой характеръ гумуса, богатство его зольными элементами, то или другое количество его—должны находиться въ прямой и тѣсной зависимости не только отъ внѣшнихъ климатическихъ, почвенныхъ и т. п. условій, каковымъ обычно

¹⁾ См. „Тр. И. В.-Э. Общ“, 1884, III т. II вып. стр. 148, (возраженіе проф. Докучаева на докладъ проф. Костычева).

²⁾ „Матеріалы“... и пр. стр. 61—89.

приписывается исключительная роль въ указанныхъ явленіяхъ, но и отъ характера отмирающихъ растительныхъ остатковъ.

Съ этой точки зрѣнія—быть можетъ, окажется, что, напр., корневую систему, какъ заключающую въ себѣ наибольшее количество растворимыхъ органическихъ соединений ¹⁾, мы вынуждены будемъ признать ближайшимъ и наиболѣе дѣятельнымъ источникомъ образованія въ почвѣ гумусовыхъ веществъ, или напр., что почвы изъ подъ хвойныхъ насажденій, несмотря, можетъ быть, даже на большое количество опадающей ежегодно хвои, будутъ, такъ сказать, страдать отъ недостатка притекающихъ растворовъ, и т. д. Цѣлый рядъ аналогичныхъ соображеній можно привести, на основаніи полученныхъ выше цифръ, и по отношенію къ почвамъ степнымъ, луговымъ и пр.

Далѣе—опыты, поставленные мною для разрѣшенія спеціально вопроса, каковъ тотъ *minimum* воды, который является необходимымъ для вымыванія изъ растительныхъ объектовъ всего, имѣющагося въ нихъ растворимаго—показали, что, хотя вода, дѣйствительно, при первомъ-же своемъ соприкосновеніи несетъ въ растворъ уже весьма значительное количество органическихъ (и зольныхъ) соединений (вспомнимъ аналогичныя заключенія Schröder'a, Ramann'a и Слѣзкина), но все-же для различныхъ растительныхъ матеріаловъ требуется совершенно различное количество воды въ цѣлыхъ вымыванія всѣхъ, имѣющихся въ нихъ растворимыхъ соединений, почему указанное выше заключеніе проф. Слѣзкина, что на 1 г. вещ. требуется 10 г. H_2O —является примѣнимымъ далеко не ко всякому объекту. Основываясь на этихъ разнообразныхъ величинахъ (см. табл. на стр. 46 „Матеріаловъ“) — прихо-

¹⁾ Принимая количество растворенныхъ органическихъ соединений у хвои за единицу, получимъ слѣдующее соотношеніе между указанными объектами:

Хвоя	Солома	Осно	Листья	Корни.
1	: 1,16	: 7,62	: 7,77	: 15,65

дится предположить, что при установлении законовъ распре-
дѣленія и накопленія гумуса въ различныхъ физико-геогра-
фическихъ районахъ и, главное, при изученіи его химическаго
состава—указанный факторъ долженъ играть не маловажную
роль. Быть можетъ, на примѣръ, въ нѣкоторыхъ районахъ
атмосферной воды будетъ выпадать въ теченіе года недостаточно
для вымыванія изъ отмирающихъ растительныхъ остатковъ
всѣхъ имѣющихся въ нихъ органическихъ (и зольныхъ) сое-
диненій и почва не будетъ тогда такъ обогащаться гумусо-
образователями, какъ въ другомъ районѣ, гдѣ этихъ расти-
тельныхъ остатковъ будетъ накопляться, быть можетъ, еже-
годно и меньше, но зато достаточное количество выпадающей
влаги вымоетъ изъ нихъ сравнительно большее количество
веществъ, и почва, въ результатѣ, обогатится этими гумусо-
образователями въ большей степени и т. п. Съ этой точки
зрѣнія значеніе выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ, какъ
извѣстно, далеко не выяснено. Главнѣйшее вниманіе все
еще обращается на влагу, лишь какъ на факторъ, обуслови-
вающій характеръ и энергію процессовъ разложенія органи-
ческихъ веществъ.

Закрѣпляются ли однако всѣ эти вымываемыя водой орга-
ническія вещества ¹⁾ изъ растительныхъ объектовъ, почвой?
Остаются ли они тамъ въ какомъ-либо прочномъ соединеніи,
или-же, какъ легко-растворимыя въ водѣ, претерпѣваютъ въ
почвѣ судьбу этой послѣдней и, такимъ образомъ, свободно
циркулируютъ тамъ вверхъ и внизъ (какъ то предполагалъ
проф. Костычевъ, не придававшій поэтому никакого зна-
ченія этимъ растворимымъ веществамъ въ качествѣ гумусо-
образователей)? И если закрѣпляются, то благодаря какимъ
составнымъ частямъ почвы?

На эти вопросы — мы можемъ также найти нѣкоторый

¹⁾ Зольнымъ элементамъ будетъ посвящена особая Глава (см. ниже).

отвѣтъ въ моихъ прежнихъ опытахъ, о которыхъ идетъ сейчасъ рѣчь.

Первые опыты поставлены были съ черноземомъ (Курск. губ., Льговск. у.). Особая обстановка этихъ опытовъ ¹⁾ давала возможность держать данную почву въ продолженіе 47 дней въ непрерывномъ сопрікосновеніи съ вымываемыми органическими веществами изъ осиновыхъ листьевъ. По истеченіи указанного срока, взятая навѣска почвы (2 kgt) была промыта 14 литрами воды—съ цѣлью вымыть изъ этой почвы всѣ тѣ вещества, которыя могли задержаться въ ней въ силу физическаго сцепленія, влагоемкости ея и т. п. Произведенный послѣ этой операціи анализъ на гумусъ (способомъ Густавсона)—показалъ, что почва, имѣвшая передъ опытомъ 6,97% перегноя, дала послѣ 47 дней—значительное увеличеніе этого вещества, и содержала его уже 8,08%. Несомнѣнно, что вещество это оказалось во взятой почвѣ въ какомъ-либо нерастворимомъ, прочно-закрѣпленномъ состояніи (вспомнимъ, какимъ большимъ количествомъ воды промыта была предварительно эта почва).

Еще болѣе рельефные результаты получены были мною въ опытахъ съ сѣрой лѣсной почвой (Курск. губ.). Эти, аналогично предыдущимъ организованные опыты—показали, что взятая почва, содержащая предварительно 2,83% перегноя, по истеченіи 47 дней—имѣла этого вещества уже 5,88%!

Въ указанномъ явленіи я усматривалъ „процессы какъ-бы обратнаго перехода этого типа почвы—въ типъ, такъ сказать „высшій-черноземный“. „Мнѣ кажется (писалъ я), что возможность процессовъ этой „реградаци“ вполне доказывается, такимъ образомъ, простымъ экспериментальнымъ путемъ“.

Констатиравши возможность прочнаго химическаго закрепленія почвой тѣхъ легко растворимыхъ органическихъ соеди-

¹⁾ Подробн. см. „Матеріалы“, стр. 111—117.

неній, которыя просачиваются въ нее сверху — изъ отмирающихъ растительныхъ остатковъ подъ вліяніемъ атмосферной влаги, и тѣмъ самымъ непосредственно указавши на роль этихъ органическихъ соединеній въ почвообразованіи, какъ на непосредственныхъ и ближайшихъ гумусообразователей—оставалось рѣшить вопросъ, въ силу какихъ взаимныхъ реакцій происходитъ указанное закрѣпленіе почвой растворимыхъ органическихъ веществъ, и какія составныя части ея играютъ въ этомъ процессѣ первенствующую роль? Спеціальныхъ опытовъ для разрѣшенія этой задачи поставлено не было, но нѣкоторыя побочныя соображенія помогли нѣсколько разобраться и въ этомъ важномъ вопросѣ.

Дѣло въ томъ, что указанное выше повышение $\%$ перегной наблюдалось лишь тогда, когда изслѣдуемая почва находилась все время опыта въ соприкосновеніи съ выщелачиваемыми изъ растительныхъ остатковъ веществами; достигалось это тѣмъ, что опредѣленное количество почвы (2 kgt) обрабатывалось воднымъ растворомъ, полученнымъ изъ разлагавшихся въ теченіе 9 мѣсяцевъ осиновыхъ листьевъ. По окончаніи этой операціи—почва высушивалась и снова обрабатывалась такимъ-же растворомъ, снова подсушивалась и т. д. Повторялось это въ теченіе 28 дней, послѣ чего данная почва оставалась въ покоѣ, во влажномъ состояніи, въ продолженіи какъ мы видѣли выше, 47 дней, когда въ ней и опредѣлялось количество гумуса. Такая, нѣсколько кропотливая, обстановка диктовалась задачами самаго опыта: чтобы извлечь изъ 750 gr. осиновыхъ листьевъ все, что было въ нихъ растворимаго, требовалось, согласно нашимъ спеціальнымъ въ этомъ отношеніи наблюденіямъ, 14 литровъ воды. Чтобы удержать такую массу воды въ постоянномъ соприкосновеніи съ почвой, требовалось-бы взять послѣдней 33 kgt. (влагоемкость ея = $42,8\%$), почему являлось вполне основательнымъ опасеніе, что при такомъ взаимномъ соотношеніи между вѣсомъ

взятой почвы и общим количеством протекающих изъ разлагающейся массы растворимыхъ соединений могутъ получиться малоуловимые и нерельефные результаты; въ виду чего и создана была, изложенная выше, своеобразная обстановка даннаго опыта.

Опыты эти и показали, что только при наличности описываемыхъ условій, когда, слѣдовательно, растворимые продукты разложенія растительной массы продолжительное время находились въ соприкосновеніи съ составными частями почвы и другъ съ другомъ, можно было наблюдать образованіе и накопленіе въ данной почвѣ гумуса.

Если-же организовать опытъ такимъ образомъ (что и было мною сдѣлано), чтобы выщелачиваемые водой растворимые продукты изъ растительныхъ остатковъ, — все время просачивались черезъ нижележащую почву и, такимъ образомъ, все время выходили изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ и съ составными частями почвы, то наблюдалась совершенно обратная картина, т.-е. уменьшеніе въ данной почвѣ и органическихъ и минеральныхъ соединений; короче говоря, при такой постановкѣ опыта — можно было искусственно вызывать въ почвѣ типичныя деградаціонныя реакціи.

Указанная рѣзкая разница въ вызываемыхъ процессахъ, при различной обстановкѣ опыта, и послужила ключемъ къ нѣкоторой разгадкѣ интересующаго насъ сейчасъ частнаго вопроса — благодаря какому именно составнымъ частямъ почвы совершается закрѣпленіе ею притекающихъ сверху изъ разлагающихся растительныхъ остатковъ растворимыхъ въ водѣ органическихъ соединений. Но прежде приведу вкратцѣ то основное положеніе, которое выведено было мною на основаніи наблюденій надъ послѣдовательностью отщепленія растворимыхъ минеральныхъ продуктовъ у различныхъ растительныхъ объектовъ при процессахъ ихъ разложенія. Наблюденія эти показали, что первыми веществами, идущими при этомъ

въ растворъ, являются известъ и магнезія—въ первой-же стадіи этого процесса отщепляясь изъ растительнаго матеріала почти на цѣло. Фактъ этотъ подтверждался неуклонно при изученіи самыхъ разнообразныхъ объектовъ. Такъ, въ опытахъ съ листьями дуба, оказалось что въ теченіе перваго же мѣсяца ихъ разложенія, CaO перешло въ растворъ 97,32% отъ первоначальнаго количества и MgO — 86,97%; въ опытахъ со степнымъ сѣномъ: CaO —91,16%, MgO — 97,15% и т. п. Количества эти весьма значительно превосходили соответственныя цифры по отношенію къ другимъ соединеніямъ.

Основываясь на этихъ наблюденіяхъ—и можно было предположить, что въ вышеизложенныхъ опытахъ съ черноземной и лѣсной почвой—первыми-же порціями воды почти на цѣло удалялась изъ осиновыхъ листьевъ CaO (и MgO). Въ виду систематическаго, сквозного промыванія почвы, упомянутыя соединенія послѣдней не задерживались, чему способствовалъ въ значительной степени и фактъ кислой обстановки, создавшейся въ разлагающейся растительной массѣ сейчасъ-же вслѣдъ за потерей ею принадлежащихъ ей соединеній извести и магнезіи ¹⁾. Ничѣмъ несвязываемыя органическія (и минеральныя) кислоты, проникая въ почву, содѣйствовали еще болѣе энергичному выносу изъ нея просочившихся изъ разлагающейся листвы растворовъ извести, ратворяя и захватывая съ собой, вмѣстѣ съ тѣмъ, известъ (и магнезію), принадлежащую самой почвѣ ²⁾.

Основываясь на выводахъ проф. Докучаева, проф. Слѣзкина, Hilgard'a, Ramanna и др., характеризующихъ известъ, какъ именно охранительное начало въ почвѣ перегной—я и

¹⁾ Наличие кислой среды была подтверждена спеціальными опытами (стр. 82—83).

²⁾ Фактъ этотъ также подтвержденъ соответствующими анализами (стр. 104—106; 121—122).

писалъ, что „именно энергичнымъ выносомъ извести (и магнезиі) изъ почвы и изъ разлагающагося растительнаго матеріала должны мы объяснить фактъ свободного прохожденія въ стекающую жидкость тѣхъ органическихъ соединений, которыя отщеплялись отъ даннаго объекта и вымывались въ почву“.

Что касается первой категоріи опытовъ съ тѣми-же самыми почвами, когда, наоборотъ, притекающія растворимыя органическія соединенія находились въ теченіе всего опыта въ соприкосновеніи другъ съ другомъ и съ составными частями почвы, то констатированный фактъ увеличенія и закрѣпленія этими почвами гумуса — надо было приписать именно закрѣпленію притекающихъ изъ разлагающейся растительной массы нерегнойныхъ соединеній какъ той известью, которая быстро и въ большихъ количествахъ выпадала изъ нея въ почву, какъ продуктъ ея разложенія, такъ и тѣми соединеніями упомянутаго элемента, которыя находились въ почвѣ и, по условіямъ даннаго опыта, изъ послѣдней не вымывались.

Мои предыдущіе, только что изложенные, опыты, съ опредѣленіемъ количества органическихъ веществъ, переходящихъ въ водный растворъ изъ растительныхъ остатковъ, а также съ выясненіемъ возможности поглощенія и прочнаго закрѣпленія этихъ растворовъ почвой, послужили исходнымъ пунктомъ для дальнѣйшихъ въ этомъ направленіи опытовъ и наблюденій, которыя въ результатъ еще болѣе утвердили меня въ мысли, что ближайшимъ и непосредственнымъ источникомъ въ почвѣ гумусообразованія являются именно водные растворы, получающіеся изъ разлагающихся растительныхъ остатковъ. Къ описанію этихъ опытовъ и къ изложенію полученныхъ результатовъ, мы теперь и перейдемъ.

Принимая, такимъ образомъ, за исходный пунктъ всѣхъ своихъ опытовъ тѣ основныя идеи, которыя впервые высказаны

были проф. Леваковскимъ, представлялось прежде всего крайне интереснымъ взять для этихъ опытовъ возможно болѣе разнообразные растительные объекты и изучить количество въ нихъ растворимыхъ органическихъ веществъ—какъ въ свѣжемъ состояніи этихъ объектовъ, такъ и на различныхъ стадіяхъ ихъ разложенности. Весьма важнымъ являлось бы также прослѣдить за процессами постепеннаго отщепленія указанныхъ растворимыхъ соединений и изъ такихъ растительныхъ матеріаловъ, которые разлагаются при различныхъ условіяхъ t^0 , увлаженія, различной аэраціи и т. п., а также при различныхъ комбинаціяхъ этихъ условій. Не говоря уже о томъ, что это, быть можетъ, помогло бы намъ въ общихъ чертахъ, нарисовать схематическую картину поступленія въ почву растворимыхъ органическихъ соединений въ различныхъ физико-географическихъ районахъ,—необходимо еще добавить, что всѣ отщепляющіеся изъ растительныхъ остатковъ, какъ зольные, такъ и органическіе продукты при процессахъ ихъ разложенія—до сихъ поръ совершенно не подвергались учету. О характерѣ и интенсивности этихъ процессовъ обычно судили и судятъ по количеству выделяющейся изъ разлагающейся массы — CO_2 , какъ, несомнѣнно, главнѣйшаго показателя этихъ процессовъ; необходимо однако оговориться, что помощью количественнаго учета этого продукта мы можемъ, лишь догадываться, какъ энергично идутъ эти процессы, но конкретнаго и непосредственнаго отвѣта на то, въ какомъ количествѣ и въ какой послѣдовательности поступаютъ въ почву указанные удобоподвижныя соединения,—играющія, какъ мы видѣли выше, столь важную роль во всѣхъ жизненныхъ функціяхъ почвы, этотъ косвенный методъ однако не даетъ. Цитированная выше моя работа („Матеріалы къ изученію процессовъ разложенія“... и пр.) и представляла собой въ этомъ отношеніи первую попытку. Я указываю на это обстоятельство для того, чтобы подчеркнуть лишній разъ почти совершенную неизученность

интересующаго насъ сейчасъ вопроса и тѣмъ самымъ оправдать неполноту сообщаемыхъ данныхъ ¹⁾).

Для выясненія количества переходящихъ въ растворъ органическихъ соединений изъ различныхъ растительныхъ матеріаловъ на различныхъ стадіяхъ ихъ разложенія, въ моихъ послѣдующихъ, излагаемыхъ сейчасъ опытахъ, взяты были слѣдующіе объекты: листья березы, хвоя ели и степное (ковыльное) сѣно.

Хвоя и листья собирались непосредственно съ деревьевъ въ серединѣ лѣта. Хотя естественнѣй было бы, быть можетъ, манипулировать съ уже опавшими объектами, но, основываясь на опытахъ Ramann'a ²⁾, что отмершіе и засохшіе листья, будучи еще на деревѣ, подвергаются уже энергичному вымыванію подѣ вліяніемъ атмосферной воды, и данныхъ Wolff'a ³⁾, что ко времени листопада составъ листьевъ сильно измѣняется (часть составныхъ частей уходитъ въ стволъ), и желая, такимъ образомъ, имѣть дѣло съ объектами, въ которыхъ всѣ составныя части были бы на лицѣ, и распределены были бы онѣ болѣе равномерно въ немъ, я и предпочелъ собирать упомянутые объекты въ свѣжемъ видѣ. Сѣно собрано было въ бездождный періодъ. Послѣдній объектъ, передъ началомъ опытовъ, былъ разрѣзанъ на куски, величиной около $\frac{1}{2}$ вершка. Листья измельчались (руками) лишь самымъ грубымъ образомъ; хвоя употреблялась въ неизмѣненномъ видѣ.

Предварительно, путемъ сжиганія, было опредѣлено въ

¹⁾ Въ настоящее время въ Агрономической Лабораторіи С.-Петербургскаго Университета предпринято, подѣ моимъ руководствомъ, систематическое и по возможности разностороннее изученіе тѣхъ растворимыхъ (зольныхъ и органическихъ) соединений, которыя отщепляются изъ различныхъ растительныхъ объектовъ, при различныхъ условіяхъ ихъ разложенія. По мѣрѣ накопленія матеріала, послѣдній будетъ публиковаться въ „Матеріалахъ по изученію русскихъ почвъ“.

²⁾ Ramann—„Die Einwirkung von Wasser auf Buchen-und Eichenstreu“, 1887.

³⁾ Wolff—„Aschen-Analysen von landw. Producten“... etc, 1871, s. 158.

указанныхъ объектахъ общее количество органическихъ веществъ и золы. Съ этой цѣлью въ платиновую чашку помещались анализируемые объекты, постепенно, всегда небольшими порціями и, при очень осторожномъ нагрѣваніи, сначала на совершенно слабомъ огнѣ, подвергались обугливанію. Для указанной операціи бралось обычно около 50 гт. воздушно-сухого матеріала ¹⁾. Въ тѣхъ случаяхъ, когда не удавалось долгое время окончательно сжечь остающіяся мельчайшія частицы угля, съ большимъ успѣхомъ примѣнялось смачиваніе остатка 3% растворомъ перекиси водорода (иногда эту операцію приходилось повторять нѣсколько разъ), осторожное затѣмъ высушиваніе массы на песчаной банѣ, и дальнѣйшее ея прокаливаніе ²⁾. Послѣ прокаливанія сухой остатокъ смачивался углекислымъ аммоніемъ, выпаривался и высушивался въ шкафу при 150° до постоянного вѣса ³⁾. Въ стекающихъ растворахъ количество органическихъ веществъ опредѣлялось также сжиганіемъ. Остановиться именно на этомъ методѣ опредѣленія общаго количества органическихъ веществъ, предпочтительно передъ другими, болѣе точными и совершенными методами,—въ данномъ случаѣ вынуждали насъ какъ самыя задачи, положенныя въ основу описываемыхъ опытовъ, такъ и цѣлый рядъ побочныхъ соображеній—удобство перечисленія, наглядность выраженія полученныхъ цифръ и т. п.

Для опредѣленія количества перешедшихъ въ растворъ веществъ изъ свѣжихъ объектовъ—150 гт. воздушно-сухого

¹⁾ Такое большое количество матеріала бралось въ виду того, что составъ полученной золы изучался ближе (см. III главу).

²⁾ Wislicenus—„Zeitschr. für anal. Chemie“, 1901, № 40.

³⁾ Въ своихъ послѣдующихъ анализахъ я рѣдко теперь прибѣгаю къ упомянутой сейчасъ, довольно таки кропотливой, операціи смачиванія прокаленного остатка углекислымъ аммоніемъ, такъ какъ многократныя наблюденія показали, что вѣсъ прокаленного остатка до и послѣ указанной операціи отличается другъ отъ друга на ничтожную величину (на это указываютъ, между прочимъ, въ своихъ работахъ также Захаровъ и Степановъ).

матеріала оброблялось въ объемистомъ стеклянномъ сосудѣ 3 литрами дистиллированной воды и, по истеченіи 5 минутъ, вся масса быстро фильтровалась черезъ плотную марлю, а затѣмъ немедленно черезъ бумажный фильтръ (extra-hard № 602 Schleicher und Schull). При обработкѣ указаннымъ способомъ свѣжихъ матеріаловъ, такого фильтрованія было вполне достаточно и стекающая жидкость получалась всегда безъ малѣйшихъ признаковъ мутн. Что же касается до водныхъ вытяжекъ изъ разлагающихся объектовъ, то такого фильтрованія оказывалось недостаточно, и тогда приходилось прибѣгать къ глинянымъ свѣчамъ Шамберлана. Не невозможно, что этими глиняными фильтрами задерживается, въ силу адсорпціи, часть воднорастворимыхъ кристаллоидальныхъ соединений (часть коллоидальныхъ также, вѣроятно, можетъ задерживаться); быть можетъ, въ данномъ случаѣ имѣетъ мѣсто даже и нѣкоторое раствореніе вещества, изъ котораго сдѣланъ фильтръ, но операція съ упомянутыми свѣчами была въ данномъ случаѣ положительно неизбежна, такъ какъ никакими другими способами не удавалось получать прозрачныхъ фильтратовъ изъ сильно-разложившихся матеріаловъ, тѣмъ болѣе, что требовалось получать эти фильтраты возможно быстро, во избѣжаніе поселенія въ нихъ грибовъ и водорослей и переведенія, такимъ образомъ, части неорганическихъ соединений жидкости въ сложныя органическія.

Что касается вышеупомянутаго соотношенія между количествомъ взятаго объекта и количествомъ воды (1 ч. матеріала на 20 ч. воды), то я руководствовался своими прежними въ этомъ отношеніи опытами, показавшими, что если мы возьмемъ воды въ 20 разъ больше, чѣмъ матеріала, то можемъ быть увѣрены, что извлечемъ все, что есть въ этомъ матеріалѣ растворимаго (для даннаго промежутка времени) ¹⁾.

¹⁾ См. „Матеріалы къ изуч. процессовъ разложенія“... etc, стр. 46.

Самые опыты съ разлагающимися объектами поставлены были слѣдующимъ образомъ:

I-ая категорія опытовъ — представляла собой растительные объекты, разлагающіеся въ условіяхъ *optim'*альной t^0 и *optim'*альной влажности (3 сосуда).

Широкіе стеклянные сосуды, вмѣстимостью около 4 литр., наполнялись вышеупомянутыми матеріалами, взятыми въ количествѣ 150 gr., и помѣщались въ термостатъ, гдѣ t^0 въ продолженіе всего времени опытовъ поддерживалась около 38^0 C. Въ виду сильнаго испаренія изъ растительныхъ остатковъ воды при такой t^0 , влажность этихъ остатковъ все время поддерживалась на одномъ уровнѣ, путемъ ежедневнаго доливанія въ сосуды воды до опредѣленнаго вѣса. Что называть *optim'*альной влажностью въ данномъ случаѣ — а, послѣ долгихъ предварительныхъ испытаній, таковой рѣшилъ считать влажность, равную $1/2$ влагоемкости даннаго объекта. При такихъ условіяхъ, матеріалъ имѣетъ видъ совершенно влажнаго субстрата, однако не до такой степени, чтобы воздушные промежутки въ немъ были заполнены водой, что могло бы, конечно, направить процессы разложенія его совершенно въ другую сторону. Между тѣмъ описываемые опыты имѣли своей задачей изучить эти процессы при аэробныхъ условіяхъ. Притомъ, по отношенію напр., къ почвѣ, именно эта влажность ($1/2$ влагоемкости среды) считается, какъ извѣстно, *optim'*альной — какъ для совершающихся въ данной почвѣ химико-біологическихъ процессовъ, такъ и въ жизни культивируемыхъ на ней растеній.

Влагоемкость березовыхъ листьевъ, взятыхъ для опытовъ = $221,0^0/0$ (среднее изъ 2-хъ опредѣленій), хвои ели = $98,0^0/0$ и степного сѣна = $208,5^0/0$.

Матеріалы ежедневно разрыхлялись путемъ помѣшиванія стеклянной палочкой. Влажность ихъ поддерживалась все время опытовъ на одномъ и томъ же уровнѣ.

Схематически описанная категорія опытовъ рисуетъ намъ

картину отщепления водно-растворимых органических соединений из растительных остатков, происходящую в тропической зоне.

II-я категория опытов имела своей целью поставить разлагающиеся растительные объекты в условия сравнительно низкой t^0 и несколько избыточного увлажнения (также 3 сосуда). С этой целью, описанные выше сосуды, наполненные таким же количеством материала, помещены были на время опытов в холодный, неотапливаемый корридор, где t^0 держалась приблизительно около 5^0 — 7^0 С. Влажность же поддерживалась в этих объектах равной полной влагоемкости их, что обуславливало несколько затрудненный приток в них воздуха и создавало до некоторой степени анаэробную обстановку.

Описываемая категория опытов представляла собой, таким образом, контрастную обстановку сравнительно с I-ой категорией, и приближала нас несколько к тем условиям разложения отмерших растительных остатков, которые можно наблюдать в северных подзолистых районах.

Наконец, **III-я категория опытов** организована была таким образом, что разлагающиеся растительные объекты находились в обстановке довольно высокой t^0 и недостаточного увлажнения (3 сосуда).

Что касается t^0 , то она поддерживалась в разлагающейся массе (путем помещения последней в термостат) около 25^0 С., что представляет собой приблизительно среднюю величину между упомянутыми выше контрастными. Влажность же ее $= \frac{1}{10}$ влагоемкости, что на внешний вид представляло собой весьма слабую степень увлажнения.

Всими этими опытами создавалась, таким образом, довольно разнообразная обстановка, которая давала надежду получить более или менее осязательные результаты.

Параллельно всем этим опытам, была одновременно

поставлена отдѣльно серія сосудовъ, для каждаго растительнаго объекта особая, въ тѣ же самыя три различныя комбинаціи условій, но съ тою разницей, что матеріалы эти, теченіе всего времени опыта, ни разу не подвергались выщелачиванію водой. Количество же образовавшихся въ этихъ объектахъ воднорастворимыхъ органическихъ веществъ, опредѣлялось только разъ, по окончаніи всѣхъ опытовъ. Такимъ образомъ, созданъ былъ еще особый рядъ опытовъ, заключающій въ себѣ тѣ же растительные объекты, находящіеся въ тѣхъ же разнообразныхъ условіяхъ для разложенія, но съ той разницей, что продукты этого разложенія, и зольнаго и органическаго характера, находились въ теченіе всего времени, во взаимномъ соприкосновеніи какъ другъ съ другомъ, такъ и съ разлагающимъ матеріаломъ (9 сосудовъ).

Всѣ описываемые опыты продолжались 88—95 дней.

Въ опредѣленные сроки, всѣ разлагающіеся матеріалы (кромѣ сосудовъ послѣдней, только что упомянутой категоріи) обрабатывались, какъ я уже говорилъ, двадцати-кратнымъ количествомъ дистиллированной воды, въ теченіе 5 минутъ, и затѣмъ быстро фильтровались. Часть полученнаго фильтрата шла на анализъ перешедшихъ въ растворъ зольныхъ и органическихъ соединеній. Растительная же масса, послѣ высушиванія и доведенія до прежней влажности, снова помѣщалась въ прежніе сосуды, для дальнѣйшихъ за ними наблюденій.

Детальное разсмотрѣніе цифръ, характеризующихъ процессъ отщепленія зольныхъ элементовъ, составитъ собой предметъ, между прочимъ, изложенія слѣдующей III-ей главы. Здѣсь же мы займемся, сообразно поставленной задачѣ, лишь органическими веществами, и съ этой цѣлью, обратимся теперь къ цифровому матеріалу.

Составъ растительныхъ остатковъ ¹⁾.

	Въ 1000 ч. сух. вещ. содержится (въ гр.).										Сумма зольн. элемент.
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_2	Mn_2O_4	Cl	
ствя березы.	6,14	0,36	28,89	8,14	2,44	6,18	0,51	4,01	0,97	—	57,64
епное сѣно .	16,49	0,24	16,75	7,12	5,09	12,56	0,10	1,88	0,06	2,43	62,72
я ели . .	9,79	1,16	23,61	5,11	2,04	4,52	0,77	1,53	0,21	0,06	48,80

Дѣйствіе воды на свѣжіе, не подвергавшіеся разложенію, объекты:

Изъ 1000 ч. сух. вещ. перешло въ растворъ (въ гр.).

Зольн. вещ. (м). Органич. вещ. (о). Отношеніе м : о.

	гр.	гр.	
Изъ листьевъ березы . .	4,8641	25,8305	1 : 5,31
„ степного сѣна . . .	3,4097	21,4446	1 : 6,29
„ хвоя ели	2,3241	6,0814	1 : 2,61

Опыты съ разлагающимися листьями березы ²⁾.

	Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещ. (въ гр.) ²⁾ .								
	I-я категорія.			II-я категорія.			III-я категорія.		
	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о)	м : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о)	м : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о)	м : о
Черезъ 15 дней съ начала опы- та перешло въ растворъ . . .	17,4549	102,1210	—	18,1193	139,1341	—	18,9022	126,1814	—
Черезъ 30 дней перешло еще .	3,2974	50,4103	—	3,3715	80,2212	—	2,2596	65,4371	—
Черезъ 45 дней перешло еще .	2,0122	21,0063	—	1,9809	39,1573	—	2,6508	58,9989	—
Черезъ 65 дней перешло еще .	1,6899	11,7441	—	2,8476	28,8996	—	1,3707	41,0060	—
Черезъ 88 дней перешло еще .	0,9000	19,6755	—	2,2546	17,0012	—	2,4838	20,4418	—
Всего за 88 дней перешло . . .	25,3544	204,9572	1:8,08	28,5739	304,4134	1:10,65	27,6671	312,0652	1:11,28
За то же время перешло въ ра- створъ изъ ма- териала непро- цываем. водой .	43,4101	62,4512	1:1,43	32,5575	269,4101	1: 8,27	31,4325	228,7513	1: 7,27

¹⁾ О ближайшемъ составѣ золы какъ взятыхъ для опытовъ матеріаловъ, такъ и водныхъ вытяжекъ изъ нихъ — будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ.

²⁾ Въ общую сумму минеральныхъ веществъ не входитъ *Mn* и *Cl* (см. III главу), такъ какъ элементы эти обычно переходили въ растворъ въ ничтожныхъ, часто даже невѣсомыхъ, количествахъ.

Опыты со степнымъ сѣномъ.

	Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещ. въ гр.								
	I-я категория.			II-я категория.			III-я категория.		
	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т :
Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ . . .	9,9596	89,0451	—	11,4718	161,1134	—	10,7820	144,1832	—
Черезъ 36 дней перешло еще .	2,6383	91,4732	—	2,5993	30,0381	—	2,1524	51,9993	—
Черезъ 51 день перешло еще .	1,8873	29,5312	—	2,1607	58,8896	—	2,4419	47,1340	—
Черезъ 66 дней перешло еще .	1,6582	15,0004	—	1,6582	21,3454	—	1,7609	25,1863	—
Черезъ 95 дней перешло еще .	1,5328	24,5533	—	2,2424	24,6772	—	2,1480	15,9135	—
Всего за 95 дней перешло въ растворъ . . .	17,6762	249,6032	1:14,12	20,1324	296,0637	1:14,70	19,2852	234,4163	1:14
За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала непримываем. водой .	28,6819	101,3247	1:3,53	22,7116	257,4201	1:11,33	21,6410	244,4192	1:11

Опыты съ хвоей ели.

	Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещ. въ гр.								
	I-я категория.			II-я категория.			III-я категория.		
	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (м.)	Орг. вещ. (о.)	т :
Черезъ 17 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ . . .	3,8321	13,8325	—	3,2432	17,8933	—	2,7139	15,1398	—
Черезъ 33 дня перешло еще .	2,4806	8,3410	—	1,4991	13,7742	—	1,4315	11,0001	—
Черезъ 49 дней перешло еще .	0,5100	5,0017	—	0,6323	2,0036	—	1,0066	4,3841	—

	Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещ. въ г.								
	I-я категория.			II-я категория.			III-я категория.		
	Минер. вещ. (т.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (т.)	Орг. вещ. (о.)	т : о	Минер. вещ. (т.)	Орг. вещ. (о.)	т ; о
черезъ 63 дня решло еще .	0,8205	5,7211	—	1,4900	6,1243	—	1,1473	8,0205	—
черезъ 92 дня решло еще .	0,5311	8,3341	—	1,7134	7,1832	—	1,9200	5,1605	—
того за 92 дня решло въ ра- створъ	8,1743	41,2304	1:5,04	8,5780	46,9786	1:5,47	8,2213	43,7050	1:5,32
а то же время решло въ ра- створъ изъ ма- териала непро- цаем. водой .	10,7995	32,8150	1:3,03	8,6637	40,8307	1:4,71	8,2115	37,1530	1:4,52

Оставляя пока въ сторонѣ соединенія зольнаго характера, которыми мы подробно займемся въ слѣдующей главѣ, когда намъ станетъ извѣстнымъ ближайшій химическій составъ ихъ, и, обращая вниманіе сейчасъ лишь на органическія соединенія — мы, при разсмотрѣніи вышеприведенныхъ таблицъ, можемъ намѣтить пока слѣдующіе выводы:

во-1-хъ, данными опытами снова подтверждается тотъ фактъ, что чистая вода въ состояніи растворять извѣстное количество органическихъ веществъ даже и изъ такихъ растительныхъ объектовъ, которые не испытывали еще на себѣ процессовъ разложенія.

Констатировать этотъ фактъ приходится даже при примѣненіи лишь 5-ти минутной вытяжки; несомнѣнно, что при болѣе продолжительномъ соприкосновеніи съ водой — матеріалы эти отдали-бы еще большее количество заключающихся въ нихъ соединеній.

Перенося эти выводы въ природу, мы можемъ, такимъ образомъ, предвидѣть, что первый же дождь, смачивающій различные отмирающіе растительные остатки (стебли, листья,

корни и пр.), вымываетъ въ почву уже извѣстное количество органическихъ веществъ. Было бы крайне интересно дать вышеприведеннымъ цифрамъ какой-либо конкретный смыслъ, такъ, напр.,—вычисливъ въ извѣстномъ районѣ, подъ извѣстными растительными формациями, количество отмирающей растительности и сумму выпадающихъ осадковъ, попытаться дать какой-либо реальный учетъ попадающимъ съ этими осадками въ почву органическимъ соединеніямъ. Но рѣшеніе этого, чрезвычайно интереснаго вопроса, въ сколько-нибудь точныхъ и опредѣленныхъ рамкахъ, пока совершенно невозможно: растительные остатки не остаются на поверхности почвы все время въ свѣжемъ видѣ,—они разлагаются,—часть органическаго вещества при этомъ улетучивается, часть превращается въ трудно-растворимыя формы; атмосферные осадки выпадаютъ не регулярно—по времени и по количеству и т. д.; словомъ, въ природѣ, при естественныхъ условіяхъ, имѣется цѣлый рядъ привходящихъ условій, не поддающихся точному учету. Тѣмъ не менѣе въ самыхъ приблизительныхъ и общихъ чертахъ мы все-таки представимъ тѣ количества водно-растворимыхъ органическихъ соединеній, которыя заключаются въ различныхъ растительныхъ остаткахъ.

Ежегодный отпадъ листвы въ лиственныхъ насажденіяхъ, средняго возраста, мы, согласно даннымъ Ebermayer'a ¹⁾, можемъ считать равнымъ 4182 kgt. на гектаръ. Такимъ образомъ, растворимыхъ въ водѣ органическихъ веществъ, заключается въ этой массѣ приблизительно около 105 kgt. на пространствѣ 1 дес. ²⁾. Не забудемъ, что это число выражаетъ собой лишь то количество органическаго вещества, ко-

¹⁾ Ebermayer. Die gesammte Lehre der Waldstreu, 1876. s. 44—49.

Данныя, полученныя нами по отношенію къ Велико-Акад. лѣсу, едва ли удобно брать въ видѣ средняго примѣра, въ виду сравнительно ненормальнаго роста большинства насажденій.

²⁾ Предполагая, условно, что мы имѣемъ дѣло съ чистымъ березовымъ насажденіемъ.

торое можетъ быть отдано даннымъ растительнымъ объектомъ уже первымъ порціямъ атмосферной воды, дѣйствующимъ притомъ на совершенно свѣжій матеріалъ даннаго года. Послѣдующіе же осадки, имѣя дѣло уже съ разлагающимся матеріаломъ, будутъ выносить изъ послѣдняго, конечно, значительно большія количества этихъ соединений ¹⁾.

Ежегодный отпадъ хвои въ еловыхъ насажденіяхъ можно считать равнымъ—3964 kgt. на гектаръ ²⁾. Водно-растворимыхъ органическихъ соединенийъ масса эта содержитъ въ себѣ слѣдовательно, лишь около 25 kgt. на 1 дес.

Наконецъ, считая ежегодный приростъ степной (ковыльной) травы въ среднемъ = 3500 kgt., можемъ видѣть, что органическихъ веществъ, легко растворимыхъ въ водѣ, матеріалъ этотъ содержитъ на пространствѣ 1 дес. ок. 75 kgt.

Затронутый вопросъ, въ болѣе широкомъ и точномъ масштабѣ, было бы крайне интересно распространить на возможно болѣе разнообразныя растительныя объекты—особенно тѣ, съ которыми приходится наиболѣе имѣть дѣло практическому хозяину. Такіе, напр., вопросы, сколько растворимыхъ въ водѣ органическихъ соединенийъ заключается въ запахиваемой массѣ люпиновъ на зеленое удобреніе, или въ опредѣленномъ количествѣ запахиваемого навоза и пр., имѣютъ весьма важное значеніе, какъ съ точки зрѣнія возможнаго обогащенія почвы при этомъ легко подвижными формами органическихъ веществъ, такъ и съ точки зрѣнія научной—выясненія тѣхъ реакцій, которыя вызываются въ почвѣ вѣдряющимися въ нее упомянутыми продуктами.

¹⁾ Приводимыя нами цифры характеризуютъ, такъ обр., количество въ различныхъ растительныхъ остаткахъ лишь воднорастворимыхъ органическихъ соединенийъ. Что-же касается общаго количества этихъ послѣднихъ, то, конечно, оно значительно выше. Такъ, Е. Henry („Les sols forestiers“) указываетъ, что лѣсная почва получаетъ ежегодно около 3000—4000 kgt. органическаго вещества (на 1 гект.).

²⁾ 1. с.

Во-2-хъ, цифры приведенныхъ выше таблицъ даютъ намъ возможность сравнить энергію и характеръ отщепленія водно - растворимыхъ органическихъ соединеній изъ такихъ растительныхъ матеріаловъ, которые разлагаются при двухъ, совершенно различныхъ, условіяхъ, а именно: а) когда образующіеся минеральные и органическіе продукты этого разложенія остаются продолжительное время въ соприкосновеніи другъ съ другомъ и съ разлагающимся матеріаломъ, и б) когда упомянутые продукты систематически, въ опредѣленные сроки, удаляются путемъ повторнаго промыванія водой, изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ и съ разлагающимся матеріаломъ.

Разница въ обоихъ случаяхъ получается такая рѣзкая, которая придаетъ наблюдаемымъ фактамъ особый интересъ, тѣмъ болѣе, что и въ природныхъ условіяхъ процессы разложенія органическихъ остатковъ протекаютъ, какъ извѣстно, также различно,—то въ условіяхъ систематическаго сквозного промыванія, то, наоборотъ (въ засушливые періоды, или въ засушливыхъ районахъ), въ условіяхъ взаимнаго контакта получающихся продуктовъ.

Въ цѣляхъ выясненія намѣченнаго вопроса, сравнимъ прежде всего суммарныя количества перешедшихъ въ растворъ зольныхъ и органическихъ соединеній, какъ изъ объектовъ, промываемыхъ водой (А), такъ и остававшихся безъ указанной обработки (В); при этомъ обратимъ главное вниманіе на опыты съ оптимальными условіями разложенія (I ой категоріи), какъ дающіе намъ въ этомъ отношеніи наиболѣе осязательные результаты:

	Минеральныхъ веществъ.		Органическихъ веществъ.	
	А	В	А	В
	гг.	гг.	гг.	гг.
Изъ листьевъ березы за 83 дней не- решло въ растворъ всего . . .	25,3544	43,4101	204,9572	62,4512
Изъ хвои ели за 92 дня	8,1743	10,7995	41,2309	32,8150
Изъ степного сѣна за 95 дней . . .	17,6762	28,6819	249,6032	101,3247

Т.-е., по отношенію ко всѣмъ, служившимъ для опытовъ, растительнымъ объектамъ, мы подмѣчаемъ одну и ту-же картину: изъ матеріаловъ, неподвергавшихся выщелачиванію, переходитъ въ конечномъ итогѣ, значительно большее количество зольныхъ соединений и сравнительно меньшее органическихъ (у хвои ели указанное соотношеніе выражено наименѣе рельефно, что находитъ себѣ объясненіе въ фактѣ сравнительно весьма малой впечатлительности упомянутого объекта къ внѣшнимъ факторамъ разложенія). Если мы выразимъ эти цифры въ видѣ отношеній, то получимъ:

Отношеніе $m:o$ (т.-е. суммы минеральныхъ веществъ къ суммѣ органическихъ) выражается:

1) У листьевъ березы (при систематическомъ промываніи).	1: 8,08
" " (безъ промыванія).	1: 1,43
2) У стеного сѣна (при систематическомъ промываніи).	1: 14,12
" " (безъ промыванія).	1: 3,53
3) У хвои ели (при систематическомъ промываніи).	1: 5,04
" " (безъ промыванія).	1: 3,03

Выведенное соотношеніе между количествомъ переходящихъ въ растворъ изъ разлагающейся массы минеральныхъ соединений съ одной стороны, и органическихъ—съ другой, находитъ себѣ, повидимому, удовлетворительное объясненіе въ томъ единственномъ предположеніи, что систематическое промываніе водой разлагающейся массы и выведеніе, такимъ путемъ, продуктовъ разложенія ея изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ, влечетъ за собой угнетеніе процессовъ распада органическихъ веществъ. Въ результатѣ мы констатируемъ въ этомъ случаѣ меньшее количество водно-растворимыхъ зольныхъ соединений (= результатъ угнетеннаго процесса минерализаціи) и значительно большее количество удобоподвижныхъ, промежуточныхъ формъ органическихъ соединений, не находящихся себѣ въ обстановкѣ описываемаго опыта благо-

пріятныхъ условій для полного разрушенія и окисленія до газообразныхъ продуктовъ ¹⁾).

Совершенно противоположный процессъ наблюдаемъ мы въ томъ случаѣ, когда растворимые продукты разложенія остаются продолжительное время при разлагающемся матеріалѣ и, такимъ образомъ, не выходятъ изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ: въ этомъ случаѣ мы констатируемъ, наоборотъ, весьма большое сравнительно количество переходящихъ въ растворъ минеральныхъ соединений, что указываетъ на энергично идущіе въ обстановкѣ данного опыта, процессы минерализаціи, съ другой стороны—открываемъ въ стекающихъ жидкостяхъ сравнительно малое количество органическихъ, что указываетъ, въ свою очередь, на процессы, сравнительно полного распада и окисленія послѣднихъ, вѣроятно, до газообразныхъ продуктовъ. Эти два факта являются, такимъ образомъ, другъ для друга логическими слѣдствіями.

Какимъ же образомъ объяснить себѣ указанное явленіе, что повторное промываніе водой разлагающейся растительной массы дѣйствуетъ какъ бы угнетающимъ образомъ на процессы дальнѣйшаго ея разложенія?

Чтобы дать наблюденнымъ фактамъ болѣе или менѣе правдоподобное освѣщеніе—намъ необходимо вспомнить тѣ основные выводы, которые сдѣланы были мною еще раньше—при изученіи болѣе спеціальнаго вопроса, а именно, въ какомъ порядкѣ и какъ энергично отщепляются минеральныя вещества изъ разлагающагося матеріала ²⁾. Наблюденія эти показали мнѣ (въ послѣдующей главѣ мы встрѣтимся еще съ новыми, подтверждающими этотъ выводъ, фактами), что какъ изъ свѣжихъ, такъ, тѣмъ болѣе, изъ разлагающихся растительныхъ объектовъ,

¹⁾ Ближайшій характеръ этихъ промежуточныхъ формъ выяснится пѣсколько ниже.

²⁾ „Матеріалы къ изученію процессовъ разложенія растительныхъ остатковъ“, 1908, стр. 79—85.

первыми веществами идущими въ водный растворъ являются соединенія извести и магнезіи, причемъ отщепленіе это совершается уже при первыхъ стадіяхъ процесса разложенія и въ весьма, какъ мы видѣли выше, большихъ количествахъ. Если поставить тотъ или другой растительный матеріалъ въ благопріятныя условія для разложенія, то промывъ его, спустя пѣкоторое (во всякомъ случаѣ — короткое) время водой, мы констатируемъ въ промывныхъ водахъ иногда свыше 90% извести (и приблизительно такое же количество магнезіи) отъ первоначальнаго количества ихъ въ испытуемомъ объектѣ. Фактъ этотъ повторялся у меня неоднократно въ опытахъ съ различными объектами и притомъ почти всегда съ однимъ и тѣмъ же результатомъ.

Все это дало мнѣ возможность ¹⁾ такъ характеризовать послѣдовательный ходъ процессовъ разложенія растительныхъ остатковъ: „энергія и характеръ разложенія растительныхъ остатковъ представляются намъ совершенно различными — въ зависимости отъ того, остаются ли продукты этого разложенія при разлагающемся матеріалѣ и въ соприкосновеніи другъ съ другомъ, или же систематически удаляются изъ разлагающагося матеріала атмосферными водами, и, такимъ образомъ, выходятъ изъ сферы взаимодействія другъ съ другомъ. Въ первомъ случаѣ, процессы разложенія растительныхъ остатковъ и отщепленіе отъ послѣднихъ, какъ результатъ этихъ процессовъ, растворимыхъ минеральныхъ продуктовъ, идутъ нормальнымъ и послѣдовательнымъ ходомъ. Определенный характеръ разложенія въ данномъ случаѣ обусловливается присутствіемъ при разлагающемся матеріалѣ извести (и магнезіи), идущей въ растворъ обычно почти нацѣло въ первыя же стадіи этого процесса и создающей, путемъ нейтрализованія образующихся при разложеніи кислотъ, благопріятную среду для

¹⁾ Ibid., стр. 173 и 174 (выв. 7, 8 и 9).

дальнѣйшаго нормальнаго хода этого процесса. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда растворимые въ водѣ продукты разложенія систематически удаляются изъ разлагающагося матеріала и изъ сферы взаимодействія другъ съ другомъ, тогда, въ виду того, что этимъ путемъ въ первыя же стадіи этого разложенія удаляется почти нацѣло CaO (и MgO), — въ разлагающей средѣ накаплиются продукты кислотнаго характера, и дальнѣйшій ходъ нормальнаго разложенія начинаетъ итти угнетеннымъ темпомъ“.

При разсмотрѣніи ближайшаго состава минеральныхъ продуктовъ, переходящихъ въ водный растворъ изъ взятыхъ для опыта растительныхъ объектовъ — при различныхъ условіяхъ разложенія ихъ — приведетъ насъ снова, какъ увидимъ ниже, совершенно къ аналогичнымъ выводамъ.

Надо полагать, что и въ разбираемомъ нами случаѣ, повторное промываніе водой разлагающейся массы лишило эту послѣднюю соединеній извести и магnezіи, результатомъ чего явилась замедленность дальнѣйшаго хода разложенія органическаго вещества, и образованіе въ этой массѣ большого количества какихъ-то промежуточныхъ удобоподвижныхъ органическихъ соединеній, которыя и приходится затѣмъ отырывать въ стекающихъ растворахъ въ довольно значительныхъ, сравнительно съ непромываемымъ объектомъ, количествахъ. Такимъ образомъ, фактъ угнетеннаго хода процессовъ разложенія тѣхъ растительныхъ матеріаловъ, которые подвергаются систематическому промыванію водой, нашедшій себѣ удовлетворительное объясненіе въ своеобразномъ характерѣ отщепленія минерализованныхъ продуктовъ, снова подтверждается и въ нашемъ случаѣ — при учетѣ абсолютныхъ количествъ переходящихъ въ растворъ органическихъ соединеній — притомъ по отношенію къ другимъ, новымъ объектамъ.

Наиболѣе рельефные результаты въ этомъ отношеніи получились въ той категоріи опытовъ, которая велась въ обста-

новѣ болѣе или менѣе optim'альныхъ условій разложенія растительныхъ массъ. Но та же самая тенденція подмѣчается также и въ двухъ другихъ категоріяхъ опытовъ,—правда, въ значительно болѣе слабой формѣ, что, конечно, обуславливается вообще сравнительной угнетенностью процессовъ распада, которая наблюдается въ условіяхъ низкой t° или избыточнаго увлаженія ¹⁾. Кромѣ того, нельзя не отмѣтить того факта, что изъ всѣхъ объектовъ, служившихъ для вышеописанныхъ опытовъ, хвоя ели рѣзко выдѣляется вообще своей слабой разлагаемостью и сравнительной нечувствительностью къ внѣшнимъ факторамъ разложенія. Нѣсколько меньшее количество переходящихъ въ водный растворъ органическихъ соединений въ условіяхъ отсутствія связного повторнаго промыванія водой разлагающейся массы наблюдается и по отношенію къ упомянутому матеріалу, но фактъ этотъ сказывается въ послѣднемъ весьма нерельефно—даже при наличности optim'альныхъ условій для разложенія. Обстоятельство это обуславливается, вѣроятно, тѣмъ, что присутствіе въ данномъ объектѣ смолистыхъ веществъ препятствовало смачиванію его водой и, такимъ образомъ, тормазило его разложение ²⁾. Съ

¹⁾ Почему въ условіяхъ низкой t° , а также избыточнаго увлаженія, тѣмъ не менѣе замѣчается нѣкоторое увеличеніе общей суммы переходящихъ въ растворъ минеральныхъ продуктовъ (при сквозномъ промываніи разлагающагося матеріала водой)—мы дадимъ объясненіе въ слѣдующей главѣ, когда ближе ознакомимся съ химическимъ составомъ стекающихъ растворовъ.

²⁾ Фактъ вообще слабой разлагаемости хвойныхъ матеріаловъ весьма наглядно наблюдался въ моихъ прежнихъ опытахъ („Мат. къ изуч. процессовъ разложенія“ и пр., стр. 54 и 73). Что въ данномъ случаѣ замѣшаны повидимому смолистыя вещества, видно изъ опытовъ, напр., Wollny („Die Zersetzung der Organischen Stoffe“... etc.), который, обрабатывая торфъ эфиромъ, извлечшимъ изъ него 5,1% смоль, констатировалъ при этомъ весьма значительное повышеніе количества CO_2 , выдѣляющейся при его разложеніи (вмѣсто 25,9 объемовъ CO_2 на 1000 об. протянутого черезъ разлагающійся матеріалъ воздуха—получено было 50,6 об.). См. также работу Bas. Malencovic („Zeitschr. f. d. landw. Versuchswesen in Oester“.

фактомъ вообще слабой разлагаемости хвойныхъ матеріаловъ, а также сравнительно весьма малаго содержанія въ нихъ воднорастворимыхъ органическихъ соединеній (см. выше) необходимо, конечно, считается при выясненіи, напр., законовъ образования и накопленія гумуса въ почвахъ подъ хвойными насажденіями.

Выразимъ же количества отщепляющихся зольныхъ и органическихъ соединеній изъ разлагающихся растительныхъ матеріаловъ въ опытахъ II-й и III-ей категорій, опять въ видѣ отношеній.

Въ опытахъ II-й категоріи		m:o
1) у листьевъ березы (при систематич. промыв.)	1: 10,65
" " " (безъ промыванія)	1: 8,27
2) у степного сѣна (при систематич. промыв.)	1: 14,70
" " " (безъ промыванія)	1: 11,33
3) у хвоя ели (при систематич. промываніи)	1: 5,47
" " " (безъ промыванія)	1: 4,71

Въ опытахъ III-ей категоріи		
1) у листьевъ березы (при систематич. промываніи)	1: 11,28
" " " (безъ промыванія)	1: 7,27
2) у степного сѣна (при систематич. промыв.)	1: 14,74
" " " (безъ промыванія)	1: 11,29
3) у хвоя ели (при систематич. промыв.)	1: 5,32
" " " (безъ промыванія)	1: 4,52

Такимъ образомъ, и въ условіяхъ опытовъ II и III категорій мы подмѣчаемъ снова то же явленіе, что матеріалы, испытывающіе сквозное повторное промываніе водой, образуютъ сравнительно большое количество подвижныхъ растворимыхъ органическихъ соединеній. Данное соотношеніе, однако, вырисовывается здѣсь не такъ рельефно, какъ то мы видѣли въ опытахъ I-й категоріи — въ виду вообще болѣе угнетеннаго хода процессовъ распада, наблюдаемаго при низкой t° или при избыточномъ увлажненіи разлагающейся массы.

Резюмируя все сказанное, мы, такимъ образомъ, прихо-

1905, в. 852), также показавшаго, что смолы подавляющимъ образомъ дѣйствуютъ на бактерій.

димъ къ заключенію, что фактъ выведенія растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ и съ разлагающейся массой, создавая нѣсколько неблагоприятныя условія для полного распада органическихъ соединений (въ силу обѣднѣнія массы основіями), — влечетъ за собой образованіе большого количества какихъ-то промежуточныхъ, удобоподвижныхъ, органическихъ веществъ, которыя мы затѣмъ и открываемъ въ стекающихъ растворахъ. Нѣсколько дальше мы подойдемъ къ этому вопросу ближе и выяснимъ непосредственнымъ анализомъ ближайшій характеръ этихъ водно-растворимыхъ органическихъ соединений.

Въ 3-хъ, рассмотрѣніе цифръ вышеприведенныхъ таблицъ даетъ намъ, наконецъ, возможность составить извѣстное представление и о вліяніи различныхъ комбинацій t° и увлаженія на количество отщепляющихся изъ разлагающагося матеріала водно-растворимыхъ органическихъ соединений, а именно:

А) Если мы обратимъ вниманіе на тѣ цифры, которыя относятся къ опытамъ съ непромываемыми растительными матеріалами, то подмѣтимъ слѣдующую, общую для всѣхъ этихъ объектовъ, картину: сравнительно весьма малое количество переходящихъ въ растворъ органическихъ соединений изъ матеріала, разлагающагося при оптимальныхъ условіяхъ влажности и t° , и весьма большое количество этихъ соединений, наблюдаемое въ двухъ другихъ случаяхъ. Наиболее рѣзкая разница наблюдается у листьевъ березы и у сѣна; хвоя и въ этомъ отношеніи представляетъ собой ненаглядный объектъ, что, по всей вѣроятности, обуславливается опять-таки весьма трудной разлагаемостью ея и отсюда малой, такъ сказать, его впечатлительностью ко всѣмъ внѣшнимъ агентамъ этого процесса. Что касается болѣе детального вопроса, можно ли констатировать какую-либо раз-

ницу въ количествѣ отщепляющихся органическихъ соединеній у объектовъ, находившихся въ двухъ другихъ условіяхъ опыта (полная влагоемкость $+ t^{\circ}$, равная 5° — 7° С. и $1/10$ влагоемкость $+ t^{\circ}$, равная 25° С.), то по отношенію къ листьѣ березы и здѣсь разница сказывается весьма ощутительно (въ пользу первой изъ упомянутыхъ комбинацій); въ опытахъ же съ сѣномъ, а тѣмъ болѣе съ хвоей — разница эта хотя и наблюдается (опять въ ту же сторону), но не столь рельефно.

Въ цѣляхъ болѣе нагляднаго сравненія, сопоставимъ цифры, характеризующія количества отщепляющихся органическихъ соединеній изъ различныхъ растительныхъ матеріаловъ, параллельно другъ другу.

Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещества.

	I-ая кат. опытовъ гр.	II-ая кат. гр.	III-ья кат. гр.
Изъ листьевъ березы. . . .	62,4512	269,4101	228,7513
„ степного сѣна	101,3247	257,4201	244,4192
„ хвой ели	32,8150	40,8307	37,1530

Прежде чѣмъ попытаться дать болѣе или менѣе удовлетворительное объясненіе указанному факту—сравнительно весьма малаго количества переходящихъ въ водный растворъ органическихъ соединеній, которое приходится намъ наблюдать именно въ обстановкѣ optim'альныхъ условій для разложенія (опыты I-й категоріи),—мы обратимся сначала къ соответственнымъ анализамъ, полученнымъ въ опытахъ

В) съ объектами, подвергавшимися повторнымъ промываніямъ, и съ этой цѣлью сравнимъ полученные цифры другъ съ другомъ:

Перешло въ растворъ изъ 1000 ч. сух. вещества.

	I-ая кат. опытовъ гр.	II-ая кат. гр.	III-ья кат. гр.
Изъ листьевъ березы. . . .	204,9572	304,4134	312,0652 (?)
„ степного сѣна	249,6032	296,0637	284,4163
„ хвой ели	41,2304	46,9786	43,7050

т.-е., и въ условіяхъ даннаго опыта мы наблюдаемъ по отношенію ко всѣмъ взятымъ объектамъ тотъ же аналогичный фактъ. — сравнительно малаго количества переходящихъ въ растворъ органическихъ соединений изъ тѣхъ растительныхъ объектовъ, которые разлагались въ *optim'альныхъ* условіяхъ *t°* и увлаженія (I кат.). Что касается въ частности сравнительныхъ цифръ, полученныхъ въ опытахъ II и III категорій, то, по отношенію къ сѣну и хвощу, мы и здѣсь наблюдаемъ большее количество перешедшихъ въ растворъ органическихъ веществъ именно въ условіяхъ опытовъ II-й категоріи (аналогично даннымъ, полученнымъ по отношенію къ объектамъ, не испытывавшимъ промыванія). Что же касается листвы березы, то цифры, полученные съ этимъ объектомъ въ опытахъ II и III категоріи (304,4134 gr. и 312,0652 gr.), нѣсколько нарушаютъ только-что констатированное соотношеніе. Въ виду сравнительно небольшой разницы между двумя приведенными цифрами (менѣе 8 gr.) возможно допустить здѣсь какую-либо случайную погрѣшность или неточность въ опредѣленіи.

Попытаемся теперь всѣмъ наблюденнымъ фактамъ дать соответствующее объясненіе.

I) По отношенію къ растительнымъ матеріаламъ, не испытывавшимъ на себѣ систематическихъ промываній водой — фактъ сравнительно незначительнаго количества отщепляющихся изъ нихъ растворимыхъ органическихъ соединений, которое приходится наблюдать при *optim'альныхъ* условіяхъ ихъ разложенія (I кат.) — становится для насъ совершенно яснымъ, если мы одновременно обратимъ вниманіе на общее суммарное количество переходящихъ при этомъ въ водный растворъ и зольныхъ соединений. Разсмотрѣніе этихъ послѣднихъ цифръ, дѣйствительно, показываетъ намъ, что параллельно уменьшенію количествъ переходящихъ въ растворъ, въ условіяхъ даннаго опыта, органическихъ соеди-

неній идетъ одновременно—увеличеніе водно-растворимыхъ минеральныхъ. Такъ,

	I кат. гг.	II к. гг.	III к. гг.
1) Изъ листьы березы перешло въ растворъ минеральныхъ ве- ществъ. изъ 1000 ч. сух. вещ.	43,4101	32,5575	31,4325
2) Изъ стелного сѣна	28,6819	22,7116	21,6410
3) „ хвой ели	10,7995	8,6637	8,2115

Сопоставленіе этихъ цифръ съ цифрами, характеризующими количества переходящихъ одновременно въ растворъ органическихъ соединеній (см. выше)—съ несомнѣнностью указываетъ намъ, что въ условіяхъ опытовъ I-ой кат. ($t^{\circ} = 38^{\circ}$, влажность = $\frac{1}{2}$ влагоемкости)—въ разлагающихся матеріалахъ шли энергичные процессы распада органическаго вещества, повлекшіе за собой, съ одной стороны, усиленную минерализацію растительныхъ остатковъ, т.-е., энергичное отщепленіе изъ послѣднихъ растворимыхъ зольныхъ веществъ, съ другой — вызвавшіе глубокое разрушеніе органическихъ соединеній и окисленіе ихъ до такихъ продуктовъ, какъ CO_2 и т. п. Въ двухъ же другихъ категоріяхъ опытовъ (II и III)—такой полный распадъ и окисленіе органическаго вещества не могли, конечно, имѣть мѣста—въ силу значительно менѣе благоприятныхъ условий t° и увлаженія матеріала, почему указанный распадъ останавливался, вѣроятно, лишь на стадіи образованія цѣлаго ряда промежуточныхъ, легко-подвижныхъ, органическихъ соединеній, которыя мы поэтому и открываемъ въ стекающихъ жидкостяхъ въ сравнительно очень крупныхъ количествахъ.

Переходя къ сравненію цифръ, полученныхъ по отношенію, въ частности, къ опытамъ II и III категорій—мы, какъ я на это указалъ уже выше, констатируемъ болѣе количество переходящихъ въ водный растворъ органическихъ соединеній именно въ опытахъ первой изъ упомянутыхъ категорій (II-ой). Попытка примѣнить и къ данному случаю всѣ вышеизложен-

ныя соображенія представляется, повидимому, безрезультатной: анализъ стекающихъ жидкостей показываетъ одновременное же увеличеніе въ опытахъ II-ой категоріи и минеральныхъ соединений. Такимъ образомъ,—параллельно болѣе энергичной минерализаціи растительныхъ остатковъ идетъ въ данномъ случаѣ, повидимому, и болѣе энергичное отщепленіе воднорастворимыхъ органическихъ соединений. Противорѣчіе это однако кажущееся и оно устраняется совершенно—при ближайшемъ сравнительномъ изученіи указанныхъ процессовъ распада органическихъ веществъ, протекающихъ въ условіяхъ опытовъ II и III категорій. Не входя пока въ обсужденіе даннаго вопроса по существу—къ нему мы вернемся въ III главѣ настоящей работы, когда ближе ознакомимся съ химическимъ составомъ стекающихъ растворовъ—я укажу только, что ближайшее изслѣдованіе интересующаго насъ сейчасъ вопроса, наоборотъ, убѣждаетъ насъ, что для процессовъ распада органическихъ веществъ (беря для сравненія условія опытовъ II и III категорій)—болѣе благопріятной обстановкой надо считать, согласно нашимъ опытамъ, излагаемымъ въ слѣдующей главѣ, комбинацію средней t° (25° C.) и недостаточнаго увлаженія ($= \frac{1}{10}$ влагоем.), чѣмъ сочетаніе низкой t° (5° — 7° C.) и избыточнаго увлаженія ($=$ полной влагоемкости); другими словами,—обстановка опытовъ III категоріи является болѣе благопріятной для процессовъ распада органическаго вещества, чѣмъ соотвѣтственная обстановка опытовъ II-й категоріи. Если же, тѣмъ не менѣе, мы наблюдаемъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ большее количество переходящихъ въ растворъ минеральныхъ соединений, то, какъ мы въ этомъ убѣдимся ниже, явленіе это отнюдь не представляется слѣдствиемъ болѣе энергично-идущихъ процессовъ минерализаціи растительныхъ остатковъ, а обусловливается прямымъ растворяющимъ воздѣйствіемъ воды, такъ какъ, поддерживая все время опытовъ растительный матеріалъ въ состояніи полной

влагоемкости (т. е. избыточного увлажнения, заболоченности)—мы тѣмъ самымъ производимъ изъ даннаго матеріала какъ бы длительную водную вытяжку, въ которую несомнѣнно должны были перейти сравнительно большія количества минеральныхъ соединений, заключающихся въ этомъ объектѣ (время сопривосновенія воды съ растительнымъ матеріаломъ, играетъ, конечно, весьма важную роль въ вопросѣ количественнаго отщепленія изъ него зольныхъ соединений). Между тѣмъ, несмотря на такіе, казалось бы, благопріятныя условія въ опытахъ II кат. для выщелачиванія изъ растительнаго объекта большихъ количествъ минеральныхъ соединений—мы констатируемъ, тѣмъ не менѣе, лишь ничтожное превышеніе общей суммы этихъ соединений, переходящихъ въ водный растворъ въ опытахъ этой категоріи сравнительно съ опытами III категоріи (листья березы—32,5575 гт. и 31,4325 гт., сѣно—22,7116 гт. и 21,6410 гт. и т. д.).

Какъ высказанцыя сейчасъ соображенія, такъ и ближайшее изученіе сущности интересующаго насъ сейчасъ явленія, о чемъ у насъ болѣе подробно будетъ рѣчь впереди,—убѣждаютъ насъ, такимъ образомъ, въ томъ, что болѣе угнетенный процессъ распада органическаго вещества—имѣетъ мѣсто именно въ опытахъ II-ой категоріи (избыточное увлажненіе). Отсюда становится для насъ яснымъ фактъ большого количества переходящихъ въ растворъ, въ условіяхъ даннаго опыта, подвижныхъ органическихъ соединений, сравнительно съ опытами III категоріи, — т. е., въ данномъ случаѣ намъ приходится, при объясненіи констатированнаго явленія, пользоваться тѣми же самыми аргументами, которые мы приводили выше, при разсмотрѣніи данныхъ, полученныхъ въ опытахъ I-й категоріи.

II) Обращаясь теперь къ тѣмъ растительнымъ объектамъ, которые подвергались во время своего разложенія неоднократному промыванію водой, мы, на основаніи приведенныхъ выше цифръ, пришли къ заключенію, что и въ

данномъ случаѣ приходится наблюдать довольно рѣзкое уменьшеніе количества переходящихъ въ водный растворъ органическихъ соединеній—именно тогда, когда растительный матеріалъ разлагается при оптимальныхъ условіяхъ увлаженія и t° . Если бы мы пожелали однако примѣнить къ данному явленію тѣ же самыя соображенія, которыя болѣе или менѣе удовлетворительно разъяснили намъ аналогичный фактъ, констатированный по отношенію къ объектамъ, водой непромываемымъ,—то встрѣтимся съ явленіемъ, которое, повидимому, идетъ совершенно въ разрѣзъ съ выведенными нами выше заключеніями, а именно—въ опытахъ I-й категоріи (= оптимальныя условія для разложенія) мы, хотя и наблюдаемъ значительно меньшія количества переходящихъ въ растворъ органическихъ соединеній—сравнительно съ опытами II-ой и III-ей кат., но параллельно этому уменьшенію—видимъ въ стекающихъ растворахъ уменьшеніе же и минеральныхъ, а именно:

Перешло въ растворъ минеральныхъ соединеній изъ 1000 ч. сух. вещ.

	I кат. гг.	II к. гг.	III к. гг.
Изъ листьевъ березы	25,3544	28,5739	27,6671
Изъ степного сѣна	17,6762	20,1324	19,2852
Изъ хвои ели	8,1743	8,5780	8,2213

Такимъ образомъ,—уменьшеніе въ условіяхъ описываемаго опыта количества органическихъ соединеній, повидимому, нельзя уже объяснить въ данномъ случаѣ усиленной минерализаціей растительныхъ остатковъ. Явленіе это оставалось непонятнымъ для насъ однако лишь до тѣхъ поръ, пока подробный химическій анализъ стекающихъ растворовъ не позволилъ проникнуть глубже въ сущность происходящихъ при этомъ процессовъ. Забѣгая нѣсколько впередъ (процессы эти подробно будутъ разобраны въ III главѣ), я укажу пока, что ближайшее изученіе этихъ послѣднихъ показало намъ, что энергія происходящихъ при разложеніи растительныхъ остатковъ явленій минерализаціи

ни подь какимъ видомъ не можетъ характеризоваться лишь суммарнымъ опредѣленіемъ переходящихъ въ растворѣ минеральныхъ соединений. Оказывается, что одновременно съ усиленнымъ распадомъ органическаго вещества и съ усиленно идущими при этомъ процессами минерализаціи, могутъ происходить въ разлагающейся массѣ процессы обратнаго закрѣпленія части освободившихся зольныхъ соединений въ тѣлѣ микроорганизмовъ ¹⁾. Въ результатѣ—параллельно интенсивно идущимъ процессамъ отщепленія минеральныхъ веществъ изъ разлагающихся остатковъ, могутъ одновременно совершаться упомянутыя регенераціонныя явленія по отношенію къ различнымъ отдѣльнымъ элементамъ (въ нашемъ случаѣ, главнымъ образомъ, по отношенію къ P_2O_5) и, въ конечномъ суммарномъ итогѣ, мы можемъ констатировать въ водныхъ вытяжкахъ изъ разлагающагося растительнаго матеріала меньшее количество общей суммы зольныхъ соединений, по сравненію съ другимъ какимъ-либо аналогичнымъ объектомъ,—въ то время какъ общій характеръ процессовъ минерализаціи въ первомъ случаѣ будетъ итти значительно энергичнѣй.

Съ такимъ именно явленіемъ имѣемъ мы дѣло, какъ показываетъ подробный химическій анализъ стекающихъ растворовъ (см. III главу), въ данномъ, разсматриваемомъ случаѣ. Хотя суммарное количество перешедшихъ въ растворъ минеральныхъ соединений въ опытахъ I категоріи — сравнительно со II и III кат.—и меньше (притомъ на весьма незначительную величину)—тѣмъ не менѣе изученіе каждаго въ отдѣльности химическаго соединенія, переходящаго въ этотъ растворъ, убѣждаетъ насъ, что именно въ обстановкѣ опытовъ этой категоріи (I-ой) мы и встрѣчаемся съ наиболѣе интенсивно-идущими процессами минерализаціи. А отсюда становится яснымъ и фактъ сравнительно малаго количества переходящихъ

¹⁾ Это доказано въ нашихъ опытахъ—путемъ примѣненія хлороформа (см. ниже).

въ растворъ органическихъ соединеній и т. д.; словомъ — въ дальнѣйшемъ являются уже вполне прямѣнными и умѣстными всѣ тѣ соображенія, которыя приведены были нами выше — по отношенію къ объектамъ, неиспытывавшимъ повторныхъ промываній.

Въ такомъ видѣ представляются намъ процессы отщепленія водно-растворимыхъ органическихъ соединеній изъ разлагающихся растительныхъ массъ, — съ количественной стороны. Присоединяясь къ мнѣнію проф. Леваковского, Норре-Seyler'a и проф. Слѣзкина, что эти растворимыя органическія соединенія и являются главнѣйшимъ и непосредственнымъ источникомъ образованія и накопленія въ почвахъ гумуса, — нельзя не признать, что и этотъ количественный учетъ продуктовъ, получающихся изъ различныхъ растительныхъ объектовъ, при различныхъ условіяхъ ихъ разложенія и пр., — представляетъ собой вопросъ первостепенной важности. Возможно болѣе широкая и разнообразная обстановка такихъ опытовъ могла бы приблизить насъ къ выясненію многихъ неясныхъ сторонъ, связанныхъ съ вопросомъ количественнаго распредѣленія гумуса въ различныхъ физико-географическихъ районахъ.

Не меньшій, конечно, интересъ представляетъ собой — выясненіе и качественной стороны дѣла. Какія именно органическія соединенія отщепляются постепенно водой изъ того или другого растительнаго матеріала, находящагося въ тѣхъ или иныхъ условіяхъ разложенія, находимъ ли мы въ нихъ тѣ самые продукты, которые являются составной частью почвеннаго гумуса (напр., гуминовую, креновую и др. кислоты), и въ какихъ взаимныхъ соотношеніяхъ и пр., — все это такіе вопросы, которые представляютъ собой живѣйшій интересъ.

Въ настоящее время въ нашей лабораторіи и предприняты въ этомъ направленіи систематическія изслѣдованія — Б. Н. Одинцовымъ. Хотя работа эта начата сравнительно еще недавно, и отъ окончательныхъ выводовъ приходится пока еще

воздержаться, тѣмъ не менѣе уже и теперь мы можемъ почерпнуть изъ нея нѣкоторыя интересныя данныя, проливающія свѣтъ на этотъ темный, почти не затронутый въ литературѣ, вопросъ. Въ полномъ объемѣ работа эта будетъ опубликована въ недалекомъ будущемъ. А пока, я изложу здѣсь только нѣкоторые выводы изъ этой работы, которые имѣютъ лишь непосредственное отношеніе къ интересующему насъ сейчасъ вопросу.

Съ цѣлью выяснить, какія именно органическія соединенія и въ какой послѣдовательности переходятъ въ водный растворъ изъ разлагающихся при различныхъ условіяхъ растительныхъ остатковъ, опыты были организованы слѣдующимъ образомъ.

150 гр. клевернаго сѣна, предварительно измельченнаго, путемъ пропуска матеріала черезъ обыкновенную мясорубку, были равномерно перемѣшаны съ 300 гр. крупнозернистаго песка—прокаленнаго и промытаго соляной кислотой—и помѣщены въ объемистые сосуды. Предварительное размельченіе матеріала сдѣлано было съ цѣлью получить болѣе однородную массу; смѣшеніе съ пескомъ—съ цѣлью избѣжать возможнаго слѣживанія и уплотненія ея.

Влагоемкость взятаго для опытовъ объекта = 466⁰/₀.

Всѣ сосуды были раздѣлены на 3 категоріи: къ первой—относились матеріалы, поддерживаемые во влажности, равной $\frac{1}{2}$ влагоемкости ихъ, ко второй — матеріалы, доведенные до полной влагоемкости, и къ третьей — матеріалы съ двойной влагоемкостью. Въ послѣднемъ случаѣ создавались, так. обр., искусственно условія полной заболоченности. Въ каждой изъ упомянутыхъ категорій опытовъ различались еще два ряда сосудовъ; одни—подвергались сравнительно частому систематическому промыванію: 1-ое промываніе произведено было черезъ 2 недѣли отъ начала опытовъ, второе промываніе ихъ—черезъ 1 мѣсяцъ, третье — черезъ 2 мѣс. и четвертое — черезъ 3 мѣс. Такимъ образомъ, изъ этихъ матеріаловъ получено было по 4 водныхъ вытяжки для каждой изъ описан-

ныхъ выше категорій опытовъ. Другіе—оставались безъ этого повторнаго промыванія. Вытяжки же изъ нихъ производились въ тѣ же самые сроки, но для каждой такой операціи служилъ особый сосудъ. Такимъ образомъ, первая вытяжка была произведена въ этомъ рядѣ опытовъ изъ матеріала, разлагавашагося въ теченіе 1 мѣс. вторая — изъ матеріала, разлагавашагося безъ промежуточнаго промыванія въ теченіе 2 мѣс. и 3-я—спустя 3 мѣсяца отъ начала опыта (также безъ промежуточныхъ промываній).

Такая постановка опытовъ давала возможность, во-1-хъ, выяснить вліяніе различныхъ степеней увлаженія растительныхъ матеріаловъ на характеръ и количество отщепляющихся изъ нихъ водно-растворимыхъ органическихъ соединений, и во-2-хъ, изучить разницу, проявляемую въ этомъ отношеніи объектами, испытывающими повторное промываніе, и объектами, остающимися безъ такого промежуточнаго промыванія.

Водныя вытяжки приготавливались путемъ обработки растительнаго матеріала 20-ти кратнымъ количествомъ дистиллированной воды; по истеченіи 5-ти минутъ, вытяжки эти фильтровались сначала черезъ плотную марлю, а затѣмъ, черезъ глиняныя свѣчи Шамберлана, послѣ чего немедленно поступали въ анализъ.

Общее содержаніе органическихъ веществъ въ получаемыхъ растворахъ опредѣлялось путемъ титрованія хамелеономъ въ присутствіи H_2SO_4 . Опредѣленіе гуминовой кислоты велось слѣдующимъ образомъ: 100 сс. раствора обрабатывалось соляной кислотой; на слѣдующій день выпавшій осадокъ фильтровался; осадокъ на фильтрѣ растворялся очень слабымъ $NaHO$ и въ полученномъ растворѣ гуминовая кислота опредѣлялась титрованіемъ хамелеономъ. Въ фильтратѣ же отъ соляной кислоты опредѣлялась апокреновая к. Съ этой цѣлью, растворъ доводился, путемъ прибавленія слабого $NaHO$, до слабо-щелочной реакціи, снова подкислялся слабымъ растворомъ уксусной ки-

слоты, послѣ чего обрабатывался растворомъ уксуснокислой мѣди; осадокъ апокреновокислой мѣди фильтровался спустя сутки, растворялся на фильтрѣ слабой H_2SO_4 и апокреновая кислота опредѣлялась снова титрованіемъ хамелеономъ. Фильтратъ же отъ апокреновокислой мѣди шелъ на опредѣленіе креновой кислоты, послѣ предварительнаго нейтрализованія и обработки избыткомъ NH_3 ; осадокъ спустя сутки фильтровался, растворялся на фильтрѣ слабой H_2SO_4 , послѣ чего креновокислая мѣдь титровалась обычнымъ путемъ хамелеономъ. Весь расчетъ какъ общаго количества органическихъ веществъ, такъ и въ отдѣльности — гуминовой, креновой и апокреновой кислотъ выражался въ $\%$ углерода.

I. Переходя къ полученнымъ результатамъ, обратимъ прежде всего вниманіе на общее количество органическихъ веществъ, переходящихъ въ растворъ изъ растительныхъ массъ — при различныхъ условіяхъ ихъ разложенія.

Приведемъ относящіеся къ этому вопросу цифры анализовъ:

Извлечено водно-растворимыхъ органическихъ соединений въ ($\%$ C):

	При влажности матеріала, равной:		
	$\frac{1}{2}$ влагоемк.	Полной влаг.	Двойн. влаг.
Изъ клевернаго сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс. .	0,6612	0,9744	1,4674
Id., но испытываго за это время два промыванія (черезъ 2 недѣли и черезъ 1 мѣсяцъ). Сумма двухъ вытяжекъ	1,0803	1,3730	3,6538
Изъ клеv. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,6900	1,3860	1,7280
Id., но испытываго 3 промыв. (черезъ 2 нед., черезъ 1 мѣс. и черезъ 2 мѣс.). Сумма 3-хъ вытяжекъ	1,2743	1,5350	3,9778
Изъ клеv. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,3570	0,4380	0,7680
Id., но испытываго 4 промыв. (черезъ 2 нед., 1 мѣс., 2 мѣс. и 3 мѣс.). Сумма 4 вытяжекъ.	1,3373	1,5830	4,1638

Эта таблица даетъ намъ возможность одновременно выяснитъ вліяніе двухъ факторовъ на общее количество отщепляющихся изъ разлагающагося матеріала водно-растворимыхъ органическихъ соединений, а именно: вліяніе степени увлажненія его, и вліяніе повторныхъ систематическихъ промываній.

А) Что касается того, какимъ образомъ отразилась на количествѣ переходящихъ въ растворъ органическихъ соединений различная степень увлажненности матеріала, то во всѣхъ случаяхъ, безъ исключенія, мы констатируемъ одинъ и тотъ же фактъ: чѣмъ болѣе затрудненнымъ является доступъ воздуха къ разлагающемуся матеріалу, какъ результатъ избыточнаго увлажненія его, — тѣмъ болѣе количество переходитъ изъ него въ растворъ органическихъ соединений. При оптимальныхъ же условіяхъ разложенія (которыя мы принимаемъ равными $\frac{1}{2}$ влагоемкости) указанное количество является наименьшимъ. Надо предположить, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ разложеніе растительной массы шло весьма энергично — вплоть до сгорания органическаго вещества въ цѣлый рядъ такихъ окисленныхъ продуктовъ, какъ CO_2 , H_2O и т. п. Въ двухъ же другихъ случаяхъ, гдѣ избыточное увлажненіе препятствовало ходу аэробныхъ процессовъ, эти послѣдніе останавливались, повидимому, на рядѣ лишь промежуточныхъ, легко-растворимыхъ въ водѣ и удобоподвижныхъ, соединений.

И здѣсь, такимъ образомъ, мы находимъ полное подтвержденіе сдѣланнмъ нами выше выводамъ, полученнымъ по отношенію къ другимъ растительнымъ объектамъ.

Каковъ характеръ этихъ промежуточныхъ продуктовъ — выясняютъ намъ до нѣкоторой степени данныя, полученныя при анализѣ кислотности стекающихъ растворовъ.

Общая кислотность — опредѣлялась титрованіемъ $\frac{1}{10}$ нормального раствора їедаго барита до появленія красной не исчезающей окраски (въ присутствіи фенолфталеина). Количе-

ство потраченных сс. щелочи относилось къ 100 гр. растительнаго матеріала (= 2000 сс. вытяжки).

Кислотность, вызываемая присутствіемъ въ вытяжкѣ свободныхъ и ненасыщенныхъ органическихъ кислотъ—опредѣлялась какъ и въ предыдущемъ случаѣ, но только послѣ предварительнаго кипяченія вытяжки (для удаленія свободной CO_2), до тѣхъ поръ, пока не останется въ стаканчикѣ около $\frac{3}{4}$ прежняго объема.

Приведемъ наиболѣе типичныя цифры этихъ анализовъ. Кислотность общая (вызываемая совмѣстно свободной CO_2 и ненасыщенными органическими кислотами):

		$\frac{1}{2}$ влагоемк.	Двойн. влагоемкость.
Объектъ непроявляемый.	Вытяжка изъ клев. сѣна разлагавшагося въ теченіе 2 недѣль	24 сс.	219 сс.
	Вытяжка изъ клев. сѣна разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	36 "	85 "
	Вытяжка изъ клев. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	12 "	97 "
Объектъ подвер- гавшійся промѣ- нѣнью.	Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣсяца . .	48 "	299 "
	Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣсяцевъ .	72 "	469 "
	Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣсяцевъ .	92 "	599 "

Цифры этихъ анализовъ рельефно указываютъ намъ, какая огромная разница наблюдается въ количествѣ именно, кислыхъ продуктовъ—между растительными объектами, разлагавшимися при доступѣ воздуха ($\frac{1}{2}$ влаг.) и въ условіяхъ заболоченности.

Если мы перейдемъ теперь отъ общей кислотности вытяжекъ, къ кислотности ихъ, вызываемой однѣми органическими кислотами (свободными и ненасыщенными), то получимъ не менѣе рельефную картину:

Кислотность вызываемая присутствіемъ свободныхъ и ненасыщенныхъ органическихъ кислотъ:

		$\frac{1}{2}$ влагоемк.		Двойн. влаг.	
		Объектъ, подвергавшійся промыванію.		Объектъ, подвергавшійся промыванію.	
Объектъ, подвергавшійся промыванію.	{	Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль:		0,0 сс.	
		Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс. . .		12,5 "	
		Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс. . .		6,0 "	
Объектъ, подвергавшійся промыванію.	{	Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс. . .		10,0 сс.	
		Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс. . .		16,0 "	
		Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс. . .		26,0 "	

Итакъ, несомнѣнно, что избыточное увлажненіе разлагающагося матеріала влечетъ за собой образованіе въ немъ промежуточныхъ продуктовъ, въ видѣ легкоподвижныхъ водно-растворимыхъ органическихъ кислотъ. Если перенести эти лабораторные выводы въ природу, то намъ станутъ до нѣкоторой степени понятными тѣ своеобразныя условія почвообразованія, которыя мы наблюдаемъ въ районахъ избыточнаго увлажненія; по крайней мѣрѣ, процессы подзолообразованія, столь характерныя для этихъ районовъ, сопровождающіеся, какъ извѣстно, выщелачиваніемъ изъ верхнихъ горизонтовъ почвы цѣлаго ряда соединеній, находятъ себѣ достаточное объясненіе въ вышеприведенныхъ лабораторныхъ данныхъ, такъ какъ послѣдними опредѣленно констатируется наличность большого количества именно кислыхъ, подвижныхъ продуктовъ, неизбѣжно, такимъ образомъ, образующихся въ условіяхъ избыточнаго увлажненія разлагающихся растительныхъ остатковъ. Въ томъ же приблизительно направленіи должны протекать почвообразовательные процессы и въ болѣе засушливыхъ районахъ, но гдѣ особыя условія рельефа (въ котловинахъ, въ пониженныхъ мѣстахъ), и пр.—могутъ создавать вышеупомянутую обстановку повышенной увлажненности разлагающихся остатковъ, а слѣдовательно, и болѣе затрудненнаго доступа къ нимъ атмосфернаго воздуха.

В) Теперь выяснимъ вліяніе на количество переходящихъ въ растворъ органическихъ соединеній другого фактора, а именно — повторныхъ, систематическихъ промываній разлагающагося матеріала, когда, слѣдовательно, образующіеся продукты разложенія выходятъ изъ сферы взаимодействія какъ другъ съ другомъ, такъ и съ разлагающеюся массой.

Выясненіе этого вопроса, какъ я уже имѣлъ случай объ этомъ говорить выше, представляетъ собой существенный интересъ, главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія освѣщенія сущности того типа почвообразованія, который протекаетъ въ условіяхъ повторяющагося время-отъ-времени сквозного промыванія атмосферными осадками разлагающихся растительныхъ остатковъ. Условія эти имѣютъ мѣсто, конечно, не только въ тѣхъ физико-географическихъ районахъ, гдѣ выпадаетъ обычно много осадковъ, и гдѣ, въ силу этого, создается часто анаэробная обстановка, направляющая процессы почвообразованія, какъ мы недавно въ этомъ убѣдились, въ сторону совершенно своеобразныхъ условій; но съ фактами промыванія отмершихъ растительныхъ остатковъ атмосферной водой мы встрѣчаемся весьма часто и въ любомъ другомъ физико-географическомъ районѣ — при выпаденіи, напр., вообще обильнаго дождя, при скопленіи отмершихъ остатковъ на субстратѣ, обладающемъ высокой водопроницаемостью и т. п.

Мы увидимъ сейчасъ, что и описываемые опыты, слѣдовательно, съ другимъ растительнымъ объектомъ, при другомъ методѣ изслѣдованія, при другой обстановкѣ ихъ — снова подтверждаютъ единогласно высказанное мною раньше положеніе, что образованіе большихъ количествъ кислыхъ удобоподвижныхъ продуктовъ разложенія вполне возможно и при аэробной обстановкѣ, но лишь при условіи систематическаго выведенія образующихся продуктовъ изъ сферы взаимодействія съ разлагающимся матеріаломъ путемъ спорадическаго промыванія послѣдняго водой. Съ

этой точки зрѣнія почвообразовательные процессы, протекающіе въ кислой средѣ, — слѣдовательно, съ наклонностью къ реакціямъ подзолообразованія, возможны не только въ районах избыточнаго увлаженія, влекущаго за собой анаэробную обстановку разложенія, что мы видимъ, напр., въ сѣверныхъ зонахъ, но они мыслимы, напр., и въ тропическихъ странахъ, гдѣ имѣется на лицо именно это обильное промываніе остатковъ атмосферными водами, и гдѣ, благодаря своеобразнымъ метеорологическимъ условіямъ, а также благодаря определеннымъ физическимъ свойствамъ почвообразующихъ породъ, мы отнюдь не можемъ заподозрить существованія анаэробной среды при процессахъ разложенія растительныхъ объектов. Быть можетъ; высказанныя сейчасъ соображенія, подтвержденные у насъ притомъ цѣлымъ рядомъ опытныхъ данныхъ, и обязываютъ насъ не считать абсурдными тѣ взгляды нѣкоторыхъ изслѣдователей, согласно которымъ, напр., тропическіе латериты являются тѣми же подзолами, но только съ необычайно сильно-развитымъ орштейновымъ горизонтомъ ¹⁾).

Обратимся, однако, къ анализамъ, и съ этой цѣлью сравнимъ прежде всего кислотность вытяжекъ изъ матеріаловъ, разлагавшихся безъ промежуточнаго промыванія, съ кислотностью вытяжекъ изъ матеріаловъ, систематически промываемыхъ.

Кислотность общая: (свободная CO_2 + свободныя и ненасыщенныя органич. кислоты).

	¹ / ₂ влагоемк.		Двойная влагоемк.	
	Безъ пром.	Съ пром.	Безъ пром.	Съ пром.
Вытяжка изъ клев. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	36 сс.	48 сс.	85 сс.	299 сс.
Вытяжка изъ клев. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	12 „	72 „	97 „	469 „

Кислотность, вызываемая присутствіемъ свободныхъ и ненасыщенныхъ органическихъ кислотъ:

¹⁾ См., напр., А. Набокинъ. — „Сел. Хоз. и Лѣсов.“, 1911 г. мартъ.

	¹ / ₂ влагоемк.		Двойная влагоемк.	
	Без пром.	Съ пром.	Без пром.	Съ пром.
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	12,5 сс.	10,0 сс.(?)	24 сс.	239 сс.
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	6,0 "	16,0 "	12 "	312 "

Приведенныя цифры наглядно показываютъ, что повторныя промыванія разлагающихся растительныхъ массъ, дѣйствительно, влекутъ за собой повышенное образованіе въ нихъ кислыхъ продуктовъ. Результатомъ этого должно явиться угнетеніе дальнѣйшихъ процессовъ разложенія органическаго вещества, которые въ силу этого не идутъ до образованія окисленныхъ, конечныхъ продуктовъ распада, а останавливаются на цѣломъ рядѣ лишь промежуточныхъ кислыхъ соединений, каковыя въ своей болѣе массѣ и идутъ затѣмъ въ растворъ. Анализъ на общее количество переходящихъ въ водную вытяжку органическихъ веществъ вполне подтверждаетъ этотъ выводъ:

Извлечено водно-растворимыхъ органическихъ соединений (въ % С):

	¹ / ₂ влагоемк.		Полн. влагоемк.		Двойная влагоемк.	
	Без пром. %	Съ пром. %	Без пром. %	Съ пром. %	Без пром. %	Съ пром. %
Изъ клеv. сѣна, разлагавш. въ теченіе 1 мѣс. . . .	0,6612	1,0803	0,9744	1,3730	1,4674	3,6538
Изъ клеv. сѣна, разлагавш. въ теченіе 2 мѣс. . . .	0,6900	1,2743	1,3860	1,5350	1,7280	3,9778
Изъ клеv. сѣна, разлагавш. въ теченіе 3 мѣс. . . .	0,3570	1,3373	0,4380	1,5830	0,7680	4,1638

II. Выяснивши общій характеръ органическихъ соединений, переходящихъ въ водную вытяжку изъ разлагающихся при различныхъ условіяхъ растительныхъ остатковъ, а также ознакомившись съ суммарнымъ количествомъ этихъ соединений,

пойдемъ теперь дальше, и рассмотримъ, входятъ ли въ составъ этихъ отщепляющихся органическихъ продуктовъ такія соединенія, которыя являются неотъемлемой составной частью почвеннаго гумуса, какъ, напр., гуминовая, креновая и апокреновая кислоты, и если входятъ, то въ какихъ именно количествахъ, и въ какомъ взаимоотношеніи—въ зависимости отъ различныхъ условій разложенія растительныхъ остатковъ.

Выясненіе этого вопроса представляется также чрезвычайно интереснымъ и важнымъ. Рѣшеніе, напр., поставленнаго вопроса въ положительномъ смыслѣ, могло бы дать намъ въ руки весьма вѣскіе аргументы въ пользу того, что именно водныя вытяжки изъ отмирающихъ растительныхъ остатковъ являются ближайшимъ и непосредственнымъ источникомъ образования въ почвѣ гумуса.

Опыты г. Одинцова, произведенные въ нашей лабораторіи, даютъ въ этомъ отношеніи довольно опредѣленный матеріалъ.

Гуминовая кислота.

Относительно гуминовой кислоты необходимо, прежде всего, указать, что она констатирована уже въ водной вытяжкѣ изъ свѣжаго матеріала ¹⁾, гдѣ ея количество было, выражая въ ‰ углерода, равнымъ 0,1374‰.

А) Что касается до водныхъ растворовъ изъ разлагавшихся уже матеріаловъ (непромываемыхъ), то чѣмъ дальше подвигался процессъ разложенія послѣднихъ, тѣмъ количество гуминовой кислоты все болѣе уменьшалось. Соотношеніе это можно было ясно видѣть при всякой степени увлажненія разлагающейся массы, а именно:

¹⁾ Судя по нѣскольکو буроватому цвѣту клевернаго сѣна, служившаго для опытовъ, можно было, впрочемъ, думать, что оно уже испытало на себѣ начальныя стадіи броженія и разложенія.

Количество гуминовой кислоты въ ‰ С:

	$\frac{1}{2}$ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль.	0,4380	0,2190	—
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,2740	0,2175	0,1299
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,3270 (?)	0,1524	0,0774
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,1260	0,1098	0,0768

Такимъ образомъ,—по мѣрѣ хода разложенія растительнаго матеріала—гуминовая кислота превращалась какъ бы въ болѣе окисленные соединенія, что вполне, какъ извѣстно, отвѣчаетъ нашимъ представленіямъ о свойствахъ и характерѣ этого продукта.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, если мы будемъ сравнивать цифры по горизонтальнымъ линіямъ, то встрѣтимся съ явленіемъ, которому затруднительно пока дать болѣе или менѣе удовлетворительное объясненіе. Дѣло въ томъ, что чѣмъ въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ находится разлагающійся матеріалъ со стороны аэраціи (въ силу болѣе заботочности), тѣмъ меньшія количества приходится открывать въ немъ гуминовой кислоты. Что же касается креновой и апокреновой кислотъ, то, наоборотъ, количества ихъ въ этомъ случаѣ прогрессивно увеличиваются, въ чемъ мы убѣдимся нѣсколько ниже. Получается въ результатѣ интересное соотношеніе: количества болѣе окисленныхъ продуктовъ, какими являются креновая и апокреновая кислоты, увеличиваются какъ бы на счетъ окисленія гуминовой кислоты, и процессъ этотъ идетъ тѣмъ интенсивнѣй, чѣмъ въ болѣе анаэробной обстановкѣ находится разлагающійся матеріалъ. Правда, этотъ фактъ, выведенный опытнымъ путемъ, какъ нельзя лучше освѣщаетъ намъ тотъ своеобразный типъ почвообразованія, который мы наблюдаемъ въ районахъ избыточнаго увлажненія и

который протекает въ условіяхъ образованія именно такихъ легко подвижныхъ сравнительно продуктовъ, и такихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, энергичныхъ реактивовъ, каковыми являются креповая и отчасти апокреповая кислота; помогаетъ этотъ выводъ и выясненію другого вопроса, — почему въ болѣе аэробныхъ условіяхъ, какъ, напр., въ черноземной зонѣ, — упомянутыхъ кислотъ образуется сравнительно немного, и разложеніе растительныхъ массъ останавливается здѣсь на стадіи, главнымъ образомъ, гуминовой кислоты; короче говоря, сдѣланное нами выше заключеніе — на основаніи лабораторнаго опыта — находится въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣми явленіями, которыя мы наблюдаемъ въ природѣ, при естественныхъ условіяхъ. Но вопросъ о ближайшемъ выясненіи вышеупомятой непонятной реакціи — мы оставляемъ пока открытымъ ¹⁾.

В) Если мы обратимся теперь къ учету гуминовой кислоты въ водныхъ вытяжкахъ изъ такихъ растительныхъ матеріаловъ, которые разлагались при повторныхъ промываніяхъ, то увидимъ нѣсколько иное соотношеніе; а именно:

Количество гуминовой кислоты въ ‰ С.

¹ / ₂ влаг.	Полн. влаг.	Двойн. влаг.
‰	‰	‰

Вытяжка изъ сѣна разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс. (испытываго за это время 2 промыванія). Сумма 2-хъ вытяжекъ

0,6758	0,2741	0,0181
--------	--------	--------

¹⁾ А. Mayer („D. l. Vers-Stat.“, 1903, Bd. 58), анализируя ортштейнъ, нашелъ въ немъ безусловно болѣе окисленные органическіе продукты, чѣмъ въ почвенномъ горизонтѣ (типа, гл. обр., апокреповой кислоты). Авторъ пытается объяснить этотъ странный фактъ — проникновеніемъ воздуха вглубь почвы въ сухое время года, но объясненіе это, конечно, ни въ коемъ случаѣ нельзя признать удовлетворительнымъ.

Быть можетъ, констатированный изложенными выше опытами фактъ — объясняется процессами окисленія гуминовой кислоты тѣми кислотами, которыя накаплиются, какъ мы видѣли, въ большомъ количествѣ, именно въ анаэробной обстановкѣ? Вѣдь извѣстно, напр., что HNO_3 окисляетъ гуминовую кислоту легко — сначала въ апокреповую, а затѣмъ — въ щавелевую и муравьиную кислоты.

	¹ / ₂ влаг. %	Полн. влаг. %	Двойн. влаг. %
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ мѣс. Сумма 3-хъ вытяжекъ	0,7340	0,3185	—
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3-хъ мѣс. Сумма 4-хъ вытяжекъ	0,7712	0,3395	0,0685

Т.-е., мы видимъ здѣсь совершенно обратную картину: чѣмъ большее время разлагался матеріалъ, и чѣмъ большее число разъ онъ промывался водой—тѣмъ большее количество накоплялось въ немъ гуминовой кислоты. Выводъ этотъ находится въ полномъ соотвѣтствіи съ констатированнымъ нами выше фактомъ—вообще болѣе угнетеннаго хода процессовъ разложенія матеріала при повторномъ промываніи послѣдняго водой, вслѣдствіе чего тормозились окислительныя реакціи, и распадъ органическаго вещества останавливался на стадіи образованія именно гуминовой кислоты ¹⁾. Если же мы будемъ сравнивать цифры опять по горизонтальнымъ линіямъ, и попытаемся выяснитъ частный вопросъ, какъ отражалось на накопленіи гуминовой кислоты избыточное увлажненіе разлагающагося матеріала, то снова вынуждены будемъ признать, что въ анаэробной обстановкѣ гуминовая кислота превращается какимъ то образомъ въ болѣе окисленныя формы. Когда будетъ итти рѣчь о креновой и апокреновой кислотахъ, то цифры анализовъ подтвердятъ намъ это положеніе.

Креновая и апокреновая кислоты.

Выше, при изученіи количествъ гуминовой кислоты, образующейся въ разлагающемся матеріалѣ, мы констатировали тотъ, не совсѣмъ понятный съ точки зрѣнія химической, но вполне подтверждаемый наблюденіями въ природѣ фактъ, что,

¹⁾ Этими же соображеніями объяснить надо и соотвѣтствующую разницу въ количествахъ гуминовой кислоты, которую мы замѣчаемъ, если будемъ сравнивать цифры послѣднихъ обѣихъ таблицъ между собою.

съ появленіемъ условій избыточнаго увлажненія, а, слѣдовательно, съ созданіемъ анаэробной среды—гуминовые соединенія разлагающагося матеріала начинаютъ уступать мѣсто креновымъ и апокреновымъ. Фактъ уменьшенія при этомъ количества гуминовой кислоты констатированъ нами выше. Теперь мы приведемъ цифры анализа, показывающія параллельное этому явленію повышеніе въ разлагающейся растительной массѣ количества креновой и апокреновой кислотъ.

I. Клеверное сѣно, не подвергавшееся промыванію.

Креновая кислота въ ‰ С.

	¹ / ₂ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль	0,0570	не опред.	0,8280
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣсяца	0,0522	0,0725	0,0638
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3-хъ мѣс.	0,0390	0,0540	0,1590

Апокреновая кислота въ ‰ С.

	¹ / ₂ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль	0,5280	не опред.	0,5700
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣсяца	0,1624	0,1537	0,1972
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ мѣс.	0,1080	0,1650	0,2340
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3-хъ мѣс.	0,0570	0,0870	0,1290

II. Тотъ же объектъ, подвергавшійся повторнымъ промываніямъ.

Креновая кислота въ ‰ С.

	¹ / ₂ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,1035	0,1219	1,0136
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ мѣс.	0,1035	0,1234	1,0451
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3-хъ мѣс.	0,1105	0,1354	1,0991

Апокреновая кислота въ $\%$ С.

	$\frac{1}{2}$ влаг. $\%$	Двойн. влаг. $\%$
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,6701	0,6934
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3-хъ мѣс.	0,8131	1,9059

Изложенными опытами констатируется, такимъ образомъ, наличность именно въ водныхъ вытяжкахъ изъ растительныхъ остатковъ такихъ соединений, которыя мы считаемъ неотъемлемой составной частью почвеннаго гумуса, а именно—наличность гуминовой, креновой и апокреновой кислотъ. Этимъ выводомъ съ несомнѣнностью устанавливается тотъ фактъ, что ближайшимъ и непосредственнымъ источникомъ гумусовыхъ образований почвы—могутъ быть уже водные растворы, получающіеся изъ отмирающихъ на поверхности почвы растительныхъ остатковъ, и, слѣдовательно, не надо искать въ почвѣ какого-либо спеціальнаго щелочного растворителя, который объяснялъ бы намъ условія образованія, просачиванія и распредѣленія гумусовыхъ соединений въ почвѣ;—процессы эти находятъ себѣ мѣсто въ природѣ—при воздѣйствіи уже каждаго выпадающаго дождя на отмершіе растительные объекты ¹⁾).

Конечно, при разложеніи растительныхъ массъ образуются между прочимъ и амміачныя соединения, которыя, способствуя накопленію въ почвѣ растворимыхъ перегнойно-амміачныхъ

¹⁾ На XII Сѣздѣ Русскихъ Естеств. и Врачей мною сдѣланъ былъ докладъ („Нѣсколько соображеній по поводу существующихъ классификацій гумусовыхъ образований въ почвѣ“—см. Дневникъ Сѣзда, стр. 638), въ которомъ я сообщалъ о найденныхъ мною прямыхъ соотношеніяхъ между составомъ водныхъ вытяжекъ изъ нѣкоторыхъ растительныхъ остатковъ (различныхъ растит. формаций) и составомъ зольной части гумуса тѣхъ почвъ, на которыхъ скоплялись упомянутые растительные объекты. Нахожденіе такихъ соотношеній представляетъ собой, несомнѣнно, одно изъ лучшихъ доказательствъ, говорящихъ въ пользу взглядовъ, высказываемыхъ нами въ настоящей работѣ.

веществъ, также будутъ содѣйствовать процессамъ просачиванія и распредѣленія гумуса въ почвѣ, но процессы эти вторичные и, во всякомъ случаѣ, не могущіе имѣть такого широкаго и повсемѣстнаго значенія, которое мы должны отнести непосредственному воздѣйствію атмосферныхъ осадковъ.

Чтобы освѣтить вопросъ о количествѣ образующихся амміачныхъ соединений при разложеніи растительныхъ матеріаловъ, приведемъ соотвѣтствующіе анализы изъ вышеизложенныхъ опытовъ—съ объектами, не подвергавшимися промыванію ¹⁾.

N амміачный (въ ‰ N).

	¹ / ₂ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавша- гося въ теченіе 2-хъ недѣль. . . .	0	0	0,0428
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавша- гося въ теченіе 1 мѣс.	0,0084	0,0137	0,0005
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавша- гося въ теченіе 2 мѣс.	0,0098	0,0280	0,0070
Вытяжка изъ клеv. сѣна, разлагавша- гося въ теченіе 3 мѣс.	0,0084	0,0224	0,0798

Съ цѣлью придать этимъ цифрамъ болѣе конкретное значеніе,—приведемъ, для сравненія, анализы—общаго количества въ вытяжкахъ азота, азота бѣлковъ, азота амидокислотъ и азота амидовъ амидокислотъ.

Общее количество N (въ ‰ ²⁾).

	¹ / ₂ влаг. ‰	Полн. влаг. ‰	Двойн. влаг. ‰
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль.	0,0476	0,0596	0,2520
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,0898	0,1299	0,1260

¹⁾ Вытяжка подкислялась слабой соляной кислотой и, въ присутствіи жженной магнезін, перегонялась въ титрованную H₂SO₄.

²⁾ 100 cc. вытяжки вносились въ Кьельдалевскую колбу и кипятилось въ присутствіи крѣпкой H₂SO₄. N опредѣлялся въ дальнѣйшемъ по методу Кьельдала.

	$\frac{1}{2}$ влаг. %	Полн. влаг. %	Двойн. влаг. %
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,0644	0,0784	0,0610
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,0392	0,0700	0,1120

N бѣлковъ (въ $\frac{0}{100}$) ¹⁾.

	$\frac{1}{2}$ влаг. %	Полн. влаг. %	Двойн. влаг. %
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль.	0,0340	0,0434	0,0644
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,0431	0,0380	0,0407
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,0392	0,0266	0,0434
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,0224	0,0294	0,0196

N амидокислотъ (въ $\frac{0}{100}$ N) ²⁾.

	$\frac{1}{2}$ влаг. %	Полн. влаг. %	Двойн. влаг. %
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль.	0,0080	0,0078	0,1350
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,0	0,0644	0,0487
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,0234	0,0	0,0050
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,0084	0,0182	0,0128

N амидовъ амидокислотъ (въ $\frac{0}{100}$ N) ³⁾.

¹⁾ 200 сс. вытяжки осаждалось при кипяченіи свинцовымъ уксусомъ. По охлажденіи осадокъ отфильтровывался, высушивался и вмѣстѣ съ фильтромъ вносился въ колбу Кьельдаля, гдѣ и подвергался сжиганію съ крѣпкой H_2SO_4 и т. д.

²⁾ Опредѣлялся по разности (общее количество азота за вычетомъ N амміачнаго, бѣлковаго и амидовъ амидокислотъ).

³⁾ Опредѣлялся въ фильтратѣ послѣ осажденія бѣлковъ. 100 сс. вытяжки подкислялось 5 сс. крѣпкой HCl и подвергалось кипяченію съ обратнымъ холодильникомъ въ теченіе $1\frac{1}{2}$ часа. По нейтрализаціи до слабо кислой реакціи производилась перегонка въ титрованную H_2SO_4 . Найденное количество азота составляетъ собой сумму азота амміачнаго + $\frac{1}{2}$ количества азота амидовъ амидокислотъ. Вычитая азотъ амміачный и умножая разность на два—находимъ количество азота амидовъ амидокислотъ.

	$\frac{1}{2}$ влг. %	Полн. влг. %	Двойн. влг. %
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2-хъ недѣль	0,0056	0,0084	0,0100
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 1 мѣс.	0,0420	0,0137	0,0360
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 2 мѣс.	0,0	0,0476	0,0056
Вытяжка изъ сѣна, разлагавшагося въ теченіе 3 мѣс.	0,0	0,0	0,0

Крайне важнымъ считаю отмѣтить тотъ фактъ, что ни одна вытяжка, ни при какихъ условіяхъ разложенія, ни разу не показала даже и слѣдовъ азотистой или азотной кислоты, въ чемъ легко всегда можно было убѣдиться при примѣненіи даже такихъ чувствительныхъ реактивовъ, какъ дифениламинъ и бруцинъ.

Объяснить ли это интересное явленіе тѣмъ, что наличность большого количества органическихъ веществъ тормазила дѣятельность нитрифицирующихъ бактерій (Виноградскій) или тѣмъ, что азотисто-кислыя соли при соприкосновеніи съ амидосоединеніями, въ присутствіи CO_2 , разлагались, — съ выдѣленіемъ свободнаго азота — сказать, конечно, трудно. Аналогичный вопросъ, касающійся процессовъ разложенія въ навозѣ, породилъ вокругъ себя, какъ извѣстно, обширную противорѣчивую литературу ¹⁾.

Всѣми изложенными выше опытами и наблюденіями устанавливается, такимъ образомъ, тотъ фактъ, что уже дистиллированная вода въ состояніи вымывать изъ растительныхъ остатковъ извѣстное количество органическихъ соединеній, и что въ составъ этихъ послѣднихъ несомнѣнно

¹⁾ Какъ извѣстно — взгляды, высказанные въ этомъ отношеніи Виноградскимъ (и Омелянскимъ) оспариваются Müntz'омъ и Lainé. (Сравнительно недавно Макриновъ (см. „Дневникъ XII Съѣзда рус. ест. и врачей“, стр. 528) указалъ, что угнетающее дѣйствіе органическаго вещества на нитрифицирующие микробы замѣчается лишь въ жидкой средѣ, что какъ разъ и имѣло, вѣроятно, мѣсто въ нашихъ опытахъ.

входятъ вещества перегнойнаго характера ¹⁾. Переносясь мысленно въ природу — мы можемъ уже предвидѣть, какихъ громадныхъ размѣровъ можетъ достигать въ естественныхъ условіяхъ процессъ просачиванія въ почву водно-растворимыхъ органическихъ соединеній — уже, какъ мы видѣли, при взаимодействіи атмосферныхъ осадковъ съ отмирающими ежегодно тѣми или другими растительными остатками. Конечно, нарисовать себѣ эту картину во всѣхъ деталяхъ, какъ она происходитъ въ природѣ, въ настоящее время почти невозможно — слишкомъ разнообразно могутъ въ природныхъ условіяхъ комбинироваться элементы указаннаго процесса: количество отмирающей ежегодно растительной массы, ея химическій составъ и физическое строеніе, количество выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ и время ихъ выпаденія, условія разложенія растительныхъ остатковъ и пр. и пр. — все это должно налагать свой особый отпечатокъ на условія поступленія въ почву органическихъ веществъ и на самый характеръ послѣднихъ.

Закрѣпляются ли однако эти водно-растворимыя органическія соединенія въ почвѣ, или они претерпѣваютъ въ послѣдней судьбу воды, т.-е., странствуютъ, въ зависимости отъ физическихъ свойствъ почвы и метеорологическихъ условій внизъ и вверхъ? Дѣйствительно-ли могутъ эти соединенія служить источникомъ образованія и накопленія прочныхъ, мало-подвижныхъ, перегнойныхъ веществъ почвы?

Нѣсколько выше при разсмотрѣніи соотвѣтствующей лите-

¹⁾ Для сужденія, въ частности, о растительныхъ остаткахъ, какъ объ источникахъ азотистыхъ соединеній перегноя, — необходимо считаться съ работами Ненгу („Revue des eaux et forêts“, 1904, № 2 п 3; „Ann. de la Sc. Agron.“, t. II; „Journ. d'agr. pratique“, 1907, № 18—22), Montemartini („Centralbl. für Bacteriol.“, 1907, XVIII) и др., доказавшихъ, что опавшіе листья различныхъ древесныхъ породъ обладаютъ способностью усваивать атмосферный азотъ. См. также работу Froëlich'a („Centralbl. für Agrikulturchemie“, 1909, s. 121).

ратуры, мы видѣли, что мои прежніе опыты ¹⁾ (отчасти и наблюденія проф. Слѣзкина) рѣшаютъ этотъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ: въ опытахъ съ черноземной почвой, путемъ, такъ сказать, насыщенія ея указанными водно-растворимыми и легко подвижными органическими растворами, въ теченіе сравнительно небольшого промежутка времени, удалось дѣйствительно повысить содержаніе гумуса въ ней съ 6,97% до 8,08%; опыты же съ сѣрой лѣсной почвой дали еще болѣе рельефные результаты: за тотъ же промежутокъ времени (75 дней) она повысила содержаніе гумуса съ 2,83% до 5,88%. Что здѣсь мы имѣли дѣло съ образованіемъ въ почвѣ именно какого то прочнаго химическаго соединенія — доказывалось тѣмъ, что почвы эти, передъ анализомъ на гумусъ, были промыты предварительно 14 литрами воды, что исключало, такимъ образомъ, возможность предположенія о задержаніи данными почвами органическихъ соединеній лишь въ силу своихъ физическихъ свойствъ — напр., влагоемкости и т. п. Опыты же проф. Слѣзкина, съ которыми мы также познакомились въ началѣ этой главы, и которые касались, какъ мы видѣли, изученія дальнѣйшей судьбы въ почвѣ просочившагося воднаго настоя растительныхъ матеріаловъ, — съ большой убѣдительностью, какъ намъ кажется, показали, что въ процессахъ закрѣпленія почвой воднорастворимыхъ органическихъ соединеній — главнымъ и необходимымъ факторомъ является известъ, благодаря чему органическое вещество переходитъ изъ растворимаго и отчасти коллоидальнаго состоянія въ свернутое, нерастворимое. Именно этимъ положеніемъ вполне удовлетворительно разъяснилась вся та запутанная картина, которая рисовалась мнѣ въ моихъ прежнихъ опытахъ, касающихся вообще взаимодѣйствія растворимыхъ продуктовъ разложенія

¹⁾ Кравковъ „Матер. къ изученію процессовъ разложенія“ и пр., 1908, стр. 116 и 125.

растительныхъ матеріаловъ съ составными частями почвы ¹⁾. Далѣе, опыты Hilgard'a ²⁾, Ramann'a ³⁾, Suzuki ⁴⁾ и др., наконецъ — многочисленныя, подтверждающіе указанное положеніе, факты изъ природы — все это вынуждаетъ насъ признать, что въ известковыхъ соединеніяхъ почвы мы должны видѣть, дѣйствительно, главнѣйшихъ дѣателей по закрѣпленію въ ней притекающихъ сверху изъ отмирающихъ растительныхъ остатковъ водно-растворимыхъ формъ органическихъ соединеній.

Въ дальнѣйшихъ, излагаемыхъ ниже опытахъ — я попытался выяснитъ, въ общихъ чертахъ, количественную сторону даннаго вопроса, а именно рѣшить вопросъ о возможности поглощенія и закрѣпленія упомянутыхъ растворимыхъ органическихъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ различными типами почвъ. Въ этой области пришлось встрѣтиться, какъ сейчасъ увидимъ, съ нѣкоторыми, весьма любопытными, соотношеніями.

Съ цѣлью имѣть для опытовъ возможно болѣе разнообразныя объекты — мною были умышленно отобраны изъ всего, весьма большого проанализированнаго въ нашей лабораторіи матеріала, такіе типы почвъ, которые, по степени выщелоченности своихъ минеральныхъ составныхъ частей, и по относительному богатству перегноемъ, — представляли какъ бы постепенный переходъ отъ типичныхъ подзоловъ къ тучнымъ черноземамъ. Въ качествѣ такихъ именно объектовъ служили — (гориз. А.):

№ 1) Супесчаный подзолъ (Петербургск. губ.)

№ 2) Подзолистая суглино-супесь. (Витебской губ.)

№ 3) Дерново-подзолистый суглинокъ, слабо-оподзолен. (Новгор. губ.).

¹⁾ I. с., напр., стр. 83—87, 109 и др.

²⁾ Hilgard — „Forsch. auf dem Geb. der Agr. physik“, 1892, s. 400.

³⁾ Ramann — „Organog. Ablag. der jetztzeit“.

⁴⁾ Bied. Centralbl. 1908, V.

- № 4) Лѣсной сѣрый суглинокъ (Рязанск. губ.)
 № 5) Темнокоричневый лѣсной суглинокъ (Курской губ.)
 № 6) Деградированный черноземъ (суглинист.) (Тульск. губ.)
 № 7) Черноземъ суглинистый (Тульской губ.)
 № 8) Черноземъ глинистый. (Симбирск. губ.)

По сравнительному содержанію перегноя, а изъ зольныхъ соединений — особенно извести — объекты эти, дѣйствительно, представляютъ собой довольно постепенный переходъ отъ весьма бѣднаго подзола съ 0,51% перегноя къ типу „высшему“ — чернозему съ 14,21% перегноя.

Химическій валовой составъ въ % высушенной при 105° почвы
 (разложениемъ 33% HF).

	Въ 100 ч. сухой почвы содержится:												
	Гумусъ	Химич.-связан. Н ₂ O	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Mn ₂ O ₄	SO ₂	K ₂ O	Na ₂ O	P ₂ O ₅	Остат. нер. въ кисл.
песчаный под- м.	0,51	0,47	89,81	3,81	0,61	0,08	0,11	0,07	0,01	1,06	1,15	0,01	2,30
одзолист. сугл.- п.	2,12	0,97	86,01	6,02	1,05	0,28	0,22	0,14	0,04	1,14	0,66	0,02	1,33
ерново-подзол. п.	2,24	1,13	85,16	6,21	1,03	0,31	0,28	0,16	0,03	1,26	0,87	0,03	1,29
ѣсной сѣр.- п.	3,61	0,72	83,61	6,13	1,08	0,67	0,47	0,14	0,05	1,12	0,89	0,05	1,46
Темнокоричн. п.	4,98	1,21	80,30	7,13	1,28	0,82	0,56	0,13	0,07	1,08	0,67	0,08	1,69
еградиров. чер- з. суглин. . .	7,33	1,53	75,40	8,13	2,03	1,27	0,58	0,21	0,10	1,41	0,46	0,12	1,69
ерноземъ суг- лн.	9,89	2,48	66,11	10,89	3,11	1,92	0,81	0,33	0,17	2,17	1,01	0,17	0,94
ерноземъ гли- ст.	14,21	3,47	55,31	12,31	4,40	2,54	1,23	0,51	0,22	2,70	1,38	0,26	1,46

Всѣ эти почвы, предварительно просѣянные черезъ сито въ 1 mm, были помѣщены въ количествѣ 300 gr. въ стеклянные чашки, гдѣ и подвергались продолжительному систематическому „насыщенію“ тѣми растворами, которые получались при воз-

дѣйствию дистиллированной воды на растительные остатки. Опыты эти были организованы слѣдующимъ образомъ.

Прежде всего, съ цѣлью получить возможно болѣе концентрированный растворъ органическихъ соединений, — 100 gr. размельченного клевернаго сѣна, скошеннаго въ полномъ цвѣтѣ, подвергались на голомъ огнѣ нагрѣванію съ водой (взятой въ размѣрѣ 1 1/2 литровъ) въ теченіе около 2 часовъ. Получался въ результатѣ этой операціи „клеверный чай“ почти совершенно чернаго цвѣта. Послѣ нѣкотораго охлажденія — растительный матеріалъ отжимался руками и вся стекающая жидкость фильтровалась черезъ твердый бумажный фильтръ. Такимъ образомъ готовились постоянно все новыя и новыя порціи этихъ растворовъ, которыя временно хранились въ бутылкахъ, закупоренныхъ пробкой изъ ваты. Въ виду того, что расходъ на эти растворы, какъ сейчасъ увидимъ, былъ довольно большой — оперировать приходилось всегда со свѣжими, не подвергавшимися загниванію, жидкостями.

Количество органическихъ соединений въ описываемыхъ растворахъ было опредѣлено (сжиганіемъ) лишь въ первой порціи. Въ виду того, что всѣ послѣдующія порціи готовились съ точнымъ соблюденіемъ однихъ и тѣхъ же условій — можно было предположить, что данныя этого перваго анализа болѣе или менѣе приложимы были и къ послѣдующимъ вытяжкамъ. Такимъ образомъ, — точный учетъ объемныхъ количествъ раствора, приводимаго въ соприкосновеніе съ почвами, указывалъ намъ одновременно и на тѣ вѣсовыя абсолютныя количества органическихъ соединений, которыя заключались въ этихъ объемахъ. Самая операція взаимодѣйствія этихъ растворовъ съ почвами производилась слѣдующимъ, довольно кропотливымъ, образомъ. Въ упомянутыхъ выше чашкахъ та или другая почва обрабатывалась точно-опредѣленнымъ количествомъ настоя изъ сѣна, взятымъ въ такомъ объемѣ, который не доводилъ бы данную почву до полной влагоемкости (для удобства

послѣдующихъ операцій). Въ такомъ увлажненномъ состояніи почва оставалась обычно въ теченіе 2 — 4 сутокъ, послѣ чего она быстро высушивалась (на ящикѣ воздушной бани). Послѣ подсушиванія—описанная операція повторялась снова и т. д.

Опыты продолжались около 3 мѣсяцевъ. Черезъ опредѣленные промежутки времени бралась небольшая порція почвы (12—15 gr.) и обрабатывалась большимъ количествомъ воды (200 с. с.). По истеченіи 6 часовъ вода сливалась сифономъ ¹⁾, а осѣвшая почва переносилась на фильтръ и затѣмъ высушивалась. Опредѣленная часть ея подвергалась анализу на гумусъ (способомъ проф. Густавсона).

Предварительная обработка водой производилась съ цѣлью отмыть отъ данной почвы всѣ тѣ органическія вещества, которыя закрѣплены были ею въ силу физическихъ явленій и не вошли съ ней въ прочное химическое соединеніе.

Результаты химическихъ анализовъ сведены въ слѣд. таблицѣ:

Образцы почвы.	Какое количество органич. вѣщ. было приведено въ соприкосновеніе съ почвой за все время опыта.	Количество гумуса въ % (сух. вѣщ.).					
		До опытовъ.	Черезъ 2 недѣли.	Черезъ 4 недѣ.	Черезъ 6 недѣ.	Черезъ 9 недѣ.	Черезъ 12 недѣ.
1. Супесчан. подзолъ	gr. 64,1744	0,51	0,50	0,52	0,48	0,49	0,52
2. Подзол. сугл. суп.	88,1035	2,12	2,21	2,26	2,20	2,27	2,24
3. Дерново-подзол. сугл.	74,4416	2,24	2,49	2,58	2,49	2,60	2,58
4. Лѣсн. сѣрый сугл.	94,9949	3,61	4,21	—	4,40	4,33	4,38
5. Темнокоричн. „	107,1614	4,98	6,24	6,52	6,46	6,41	6,48
6. Деградированн. черноземъ	127,0134	7,33	—	7,89	8,01	7,96	7,99
7. Черноземъ. сугл.	172,3477	9,89	—	10,17	10,24	10,22	10,20
8. Черноз. глинист.	211,7801	14,21	—	—	14,17	14,34	14,30

¹⁾ Въ опытахъ съ глинистымъ черноземомъ приходилось вытяжку непосредственно пропускать черезъ фильтръ, безъ предварительной декантаци—въ виду большого количества не осѣдавшихъ пластичныхъ частицъ.

Прежде чѣмъ разсматривать полученныя цифры анализовъ — необходимо отмѣтить, что параллельно искусственнымъ стремленіямъ „насытить“ ту или другую почву органическими соединеніями, или естественнымъ путемъ въ самой почвѣ противоположные процессы, клонящіе къ уменьшенію въ ней запаса перегноя, это — процессы разложенія почвеннаго перегноя подъ вліяніемъ постоянного увлаженія, и процессы выщелачиванія изъ почвы, принадлежащихъ ей самой, растворимыхъ формъ гумуса путемъ вышеописанныхъ водныхъ вытяжекъ.

Для точности опытовъ — слѣдовало бы, быть можетъ, учитывать эти два фактора. Но въ данномъ случаѣ этого не было сдѣлано — въ виду того, что едва ли указанные процессы могли произвести въ почвѣ существенныя измѣненія; по крайней мѣрѣ, они должны были совершенно ступшеваться передъ огромнымъ количествомъ приводимыхъ въ соприкосновеніе съ почвой органическихъ соединеній извнѣ, почему едва ли могли затемнить изучаемое явленіе. Дѣйствительно, — количество органическихъ веществъ, переходящее въ водныя вытяжки изъ почвы, какъ извѣстно, всегда ничтожно. Что же касается того, какъ быстро можетъ разрушаться почвенный перегной подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій t° и влаги, то и этотъ процессъ надо считать процессомъ весьма медленнымъ. Въ одномъ изъ моихъ прежнихъ опытовъ ¹⁾, имѣвшемъ цѣлью изучить какъ разъ количественную сторону обоихъ указанныхъ процессовъ, анализы показали, что черноземная, напр., почва, будучи постоянно увлажняема и подвергаема сравнительно высокой t° , а подъ конецъ опытовъ, будучи промыта весьма большимъ количествомъ воды, потеряла гумуса за 75 дней — всего 0,060%; сѣрый же лѣсной суглинокъ, въ тѣхъ же усло-

¹⁾ „Матеріалы къ изученію процессовъ разложенія растит. остатковъ въ почвѣ“, 1908, стр. 116 и 125.

віяхъ опыта, остаѣся даже и безъ всякаго въ этомъ отношеніи измѣненія.

Принимая во вниманіе высказанныя соображенія, обратимся теперь къ цифрамъ вышеприведенной таблицы и попытаемся вывести, на основаніи ихъ, нѣкоторыя заключенія.

Прежде всего надо указать на то, что фактъ прочнаго закрѣпленія и поглощенія почвами притекающихъ водно-растворимыхъ органическихъ соединеній вполне подтверждается описанными опытами. Но различные типы почвъ проявляютъ въ этомъ отношеніи, оказывается, совершенно различную способность и энергію. Любопытнѣй всего то, что нѣкоторыя изъ нихъ, а именно почвы, стоящія на противоположныхъ концахъ вышеприведенной таблицы, т.-е. какъ разъ наиболѣе бѣдная и наиболѣе богатая перегноемъ, повидимому, совершенно лишены способности поглощенія и закрѣпленія органическихъ веществъ. Промежуточные типы занимаютъ въ этомъ отношеніи какъ бы постепенный переходъ къ верху и къ низу. Чтобы нагляднѣй представить полученные цифры поглощенія—выразимъ послѣднія въ видѣ слѣд. сравнительной таблицы:

	%
1. Подзолъ супесчаный приблизительно за 90 дней опыта увеличилъ %-содержаніе гумуса на	0,01
2. Подзолист. сугл.—супесь	0,12
3. Дерново-подзолист. суглин.	0,34
4. Лѣсной сѣрый суглин.	0,77
5. Темнокоричн. лѣсп. суглин.	1,50
6. Деградированный черноземъ	0,66
7. Черноземъ суглинистый	0,31
8. Черноземъ глинистый	0,09

Прежде чѣмъ такъ или иначе объяснять данные факты, обратимъ вниманіе предварительно на другую сторону вопроса, а именно: если мы будемъ слѣдить за самымъ ходомъ постепеннаго обогащенія почвъ во времени, то увидимъ, что „насыщать“ ту или другую почву органическими веществами мы

можемъ не безпредѣльно, а, что своего рода тахітисъ этого поглощенія достигается почвой сравнительно скоро, послѣ чего дальнѣйшая прибавка органическихъ растворовъ оказывается уже безрезультатной. Короче говоря — каждая почва имѣетъ свой такъ сказать, предѣлъ насыщенія гумусомъ, достигнувъ котораго, она уже не въ состояніи, даже несмотря на самыя благопріятныя къ тому условія, повысить его содержаніе.

Существованіемъ именно такого предѣла насыщенія гумусомъ — объясняется, какъ мнѣ кажется, удовлетворительно тотъ фактъ, что почва № 8 (тучный глинистый черноземъ съ 14,21% перегноя) оказалась совершенно индифферентной къ тому весьма большому количеству органическихъ веществъ, которое поступало въ нее изъ растворовъ клевернаго сѣна. Съ этой точки зрѣнія возможно допустить, что данная почва естественнымъ путемъ уже достигла этого насыщенія и является, такимъ образомъ, со стороны содержанія перегноя, вполне уже константной единицей ¹⁾).

Константированнымъ же фактомъ существованія для каждаго вида почвъ своего опредѣленнаго предѣла насыщенія перегноемъ, — можно объяснить и другія подмѣченныя нами выше, явленія, какъ, напр., сравнительно большую „поглодательную способность“ къ органическимъ веществамъ такихъ почвъ, которыя являются какъ бы низшими, по сравненію съ упомянутымъ черноземомъ, представителями. Почвы эти рисуются намъ съ этой стороны способными какъ бы еще расти, формироваться и накапливать въ себѣ перегнойныя вещества. И чѣмъ дальше подвигаемся мы отъ типичнаго чернозема въ сторону деградаціонныхъ реакцій — тѣмъ, какъ будто, почвы способны къ все большему поглощенію органическихъ веществъ. Цифры нашихъ анализовъ показываютъ однако, что и въ этомъ

¹⁾ Объ обратныхъ процессахъ „деградаціонныхъ“ — рѣчь будетъ нѣсколько ниже.

отношеніи существуетъ извѣстный предѣлъ, перешагнувъ который почвы сразу начинаютъ терять способность къ поглощенію и закрѣпленію гумусовыхъ веществъ; крайній же представитель далеко зашедшихъ деградационныхъ процессовъ (почва № 1—подзолъ) является уже совершенно не способной увеличивать въ себѣ количество перегноя—даже несмотря на существованіе благоприятныхъ къ тому условий. Съ этой точки зрѣнія и данную почву мы можемъ охарактеризовать, какъ объектъ, уже вполне закончившій свое формированіе, безъ надежды превратиться въ какой-либо „высшій“ типъ.

Въ частности — въ данныхъ опытахъ съ данными почвами ¹⁾ — наибольшей способностью къ поглощенію органическихъ веществъ обладаетъ, какъ мы видѣли, почва № 5 (темно-коричневый лѣсной суглинокъ). Поднимаясь выше—къ почвамъ № 4 и № 3—сѣрому лѣсному суглинку и дерново-подзолистой почвѣ—способность эта значительно падаетъ, выражаясь у почвы № 2 (подзолистый суглинокъ) уже совершенно ничтожной величиной. У подзола, наконецъ, способность эта равна почти нулю. Такое же паденіе въ энергіи поглощенія органическихъ веществъ мы констатируемъ, если будемъ итти отъ темнокоричневаго лѣсного суглинка въ обратную сторону, т. е., приближаться къ типичному чернозему. Крайній представитель такихъ почвъ (№ 8) является почти совершенно лишеннымъ указанной способности.

Изложенными выше опытами обрисовывается, такимъ образомъ, въ общихъ чертахъ—какъ количественная сторона процессовъ поглощенія и закрѣпленія почвами водно-растворимыхъ органическихъ соединений, такъ указывается и качественная

¹⁾ Конечно, выводы описываемыхъ опытовъ приложимы лишь къ даннымъ объектамъ. Изучить съ этой точки зрѣнія всѣ тѣ разнообразныя виды и разновидности почвъ, которыя мы видимъ въ природѣ — является еще крайне трудной, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ высшей степени интересной, задачей.

разница, проявляемая въ этомъ отношеніи различными типами почвъ. Если бы мы захотѣли теперь взглянуть въ самую сущность описываемыхъ явленій и выяснить вопросъ, — какія именно составныя части почвы являются въ этомъ отношеніи главнѣйшимъ поглощающимъ факторомъ, то прямого отвѣта на поставленный вопросъ въ нашихъ опытахъ мы не найдемъ. Почвы для изслѣдованія были выбраны, какъ я объ этомъ уже говорилъ, умышленно такимъ образомъ, чтобы, по общему содержанію перегноя а также и отдѣльныхъ минеральныхъ элементовъ, представляли бы по возможности постепенный переходъ другъ въ друга. Какая именно изъ составныхъ частей всѣхъ этихъ почвъ играла наибольшую роль въ изучаемыхъ процессахъ поглощенія органическихъ соединений — сказать, конечно, трудно; для этого слѣдовало бы изолировать каждый въ отдѣльности факторъ, подведя остальные къ одному, такъ сказать, знаменателю. Выясненіе этого важнѣйшаго вопроса могло бы представить собой предметъ особаго, спеціальнаго изслѣдованія, весьма, вѣстать сказать, сложнаго и труднаго. Но нельзя все-таки не отмѣтить того факта, что энергія поглотительной способности данныхъ почвъ къ органическимъ веществамъ довольно рельефно растетъ — параллельно именно увеличенію въ нихъ количествъ извести (см. табл. валового анализа этихъ почвъ). Правда, начиная съ темнокоричневаго лѣснаго суглинка, поглотительная способность, несмотря на значительное повышеніе въ слѣдующихъ типахъ почвъ количествъ извести, начинаетъ тѣмъ не менѣе рѣзко же понижаться, но тутъ возможно предположить, припоминая наши соображенія о существованіи предѣла насыщенія гумусомъ, что большая часть извести въ данныхъ почвахъ является уже соединенной съ перегнойными веществами и притекающій излишекъ органическихъ растворовъ совсѣмъ не находилъ, такимъ образомъ, или находилъ слишкомъ мало, „свободныхъ“ известковыхъ соединений. Рѣзкое повышеніе въ первоначальномъ содержаніи

гумуса, которое мы видимъ у деградированнаго чернозема, у чернозема суглинистаго и пр.—по сравненію съ упомянутымъ выше лѣснымъ суглинкомъ—подтверждаетъ высказанное предположеніе. Крайній представитъ—богатѣйшій глинистый черноземъ (№ 8), содержа большое количество извести ($2,54^0\%$), является вмѣстѣ съ тѣмъ обладателемъ и огромнаго количества гумуса ($14,21^1\%$), что указываетъ на возможное уже достиженіе имъ, естественнымъ путемъ, предѣла насыщенія этимъ продуктомъ; въ результатѣ—выказанная имъ полная индифферентность къ притекающимъ растворамъ органическихъ соединений.

Переносъ всѣ эти выводы въ природу — мы прежде всего можемъ до нѣкоторой степени освѣтить вопросъ о возможности, въ естественныхъ условіяхъ, явленій „реградациі“, т.-е. процессовъ обратнаго перехода бѣдныхъ перегноемъ почвъ въ типы „вышніе“¹⁾, — напр., лѣсныхъ суглинковъ, подзолистыхъ почвъ и пр. въ типы черноземные.

Основываясь на тѣхъ данныхъ, которыя получены были въ нашихъ опытахъ,—мы можемъ сказать, что съ точки зрѣнія принципиальной — процессы эти, вообще говоря, въ природѣ вполне мыслимы. На такой именно, начинающійся метаморфозъ, въ естественныхъ условіяхъ, указываетъ въ одной изъ своихъ работъ, между прочимъ, Н. И. Прохоровъ²⁾. Однако, указанныя „реградационныя“ явленія въ природѣ мы должны считать на основаніи вышеописанныхъ опытовъ, ограниченными лишь извѣстными, во всякомъ случаѣ — узкими рамками. Даже въ нашемъ случаѣ, несмотря на наличность, можно сказать, оптимальныхъ условій для поглощенія органическихъ веществъ, когда почвамъ предоставлялось въ распоря-

¹⁾ Упомянутый процессъ „реградациі“—надо понимать, конечно, значительно шире. Но въ данномъ случаѣ насъ интересуетъ пока лишь одна сторона этого процесса—возможность обогащенія почвы именно гумусомъ.

²⁾ См. „Почвовѣдѣніе“, 1906 г.

женіе огромное количество послѣднихъ (чего въ природѣ, конечно, наблюдаться не можетъ),—даже и въ этихъ условіяхъ—подзолъ, напр., оказался совершенно не способнымъ къ указаннымъ „реградационнымъ“ реакціямъ; что же касается другихъ, близкихъ къ нему типовъ почвъ, какъ-то: подзолистой суглино-супеси, дерново-подзолистаго суглинка и пр., то проявленіе у нихъ способности къ „реградации“ сказывалась слишкомъ слабо. Только у тѣхъ почвенныхъ типовъ, которые находятся въ значительно болѣе близкомъ генетическомъ родствѣ съ черноземомъ (напр. — у деградированнаго чернозема, темнаго лѣснаго суглинка), мы можемъ наблюдать довольно рѣзко-выраженную способность къ описываемымъ процессамъ.

Такимъ образомъ, если мысленно представить себѣ какую-нибудь почву, богатую перегноемъ и минеральными веществами (напр., черноземъ), находящуюся, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ естественно-историческихъ условій, на пути къ обѣднѣнію, деградации,—то обратные, „реградационные“ процессы въ ней вполне возможны (при измѣненіи окружающихъ условій), но только до тѣхъ поръ, пока данная почва, на пути своего обѣднѣнія, не перешагнула извѣстнаго предѣла, послѣ котораго возвратъ къ первоначальному типу является уже невозможнымъ. Задача будущихъ изслѣдованій — болѣе точно опредѣлить эти границы для различныхъ типовъ почвъ.

Установленный описанными выше опытами фактъ существованія для каждаго типа почвъ своего предѣла насыщенія гумусовыми веществами—также даетъ намъ возможность освѣтить нѣкоторыя стороны процессовъ почвообразованія. Этимъ именно фактомъ можно до нѣкоторой степени удовлетворительно объяснить, напр., явленіе извѣстной константности въ содержаніи нѣкоторыми почвами своего перегноя, которую мы наблюдаемъ въ нихъ изъ года въ годъ—несмотря на цѣлый рядъ такихъ сельско-хозяйственныхъ операцій, которыя стремятся именно къ разрушенію въ нихъ перегноя—

путемъ, напр., тѣхъ или иныхъ способовъ механической обработки и т. п. Въ этомъ случаѣ можно предположить, что часть разложившихся перегнойныхъ соединений снова возобновляется въ почвѣ, притомъ — на счетъ тѣхъ, всегда имѣющихся въ ней, органическихъ растворовъ, которые постоянно поступаютъ въ данную почву изъ отмершихъ стеблей, корней и другихъ частей культурныхъ или дикихъ растений; при этомъ указанное возобновленіе идетъ снова всегда лишь до опредѣленнаго предѣла. Вѣроятно, этими же соображеніями надо объяснить себѣ и тотъ фактъ, что, напр., степной черноземъ Екатеринославской губерніи, испытывая на себѣ болѣе, чѣмъ 60-лѣтнее вліяніе искусственно-насажденнаго лѣса (Велико-Анадольскаго), тѣмъ не менѣе нисколько не уменьшилъ содержанія въ себѣ гумуса, какъ въ томъ пришлось мнѣ убѣдиться на основаніи многочисленныхъ сравнительныхъ анализовъ почвъ изъ подъ лѣса и съ сосѣдней степи. Само собой разумѣется, что указанное равновѣсіе немедленно можетъ нарушиться въ почвѣ, лишь только измѣнится кореннымъ образомъ окружающія естественно-историческія условія; такъ, измѣненіе, напр., климатическихъ условій, можетъ повернуть самый характеръ разложенія растительныхъ остатковъ и перегноя, какъ извѣстно, совершенно въ другую сторону; результатомъ такого измѣнившагося характера разложенія могутъ явиться, напр., кислотные продукты, которые растворятъ и выщелочаютъ часть извести и другихъ основаній и т. д. Въ этомъ случаѣ, типъ почвообразованія будетъ въ корни измѣненъ, а съ нимъ вмѣстѣ измѣнятся и условія поглощенія и закрѣпленія данной почвой перегнойныхъ соединений.

Указаннымъ же фактомъ существованія предѣла насыщенія гумусомъ, можно объяснить себѣ и другой, противоположный упомянутому выше, случай изъ сельско-хозяйственной практики, — это когда даже усиленное уваживаніе нѣкоторыхъ почвъ или запахиваніе въ послѣднія растительныхъ

массъ въ видѣ зеленого удобренія—очень часто совершенно не отражается на увеличеніи въ нихъ количествъ перегноя. Анализъ многихъ черноземныхъ образцовъ, взятыхъ изъ подъ коноплянниковъ (Курской губ.), произведенный въ нашей лабораторіи—показалъ, что, несмотря на долготнее усиленное уваживаніе такихъ участковъ, $\frac{0}{0}$ гумуса въ нихъ оказывался почти безъ измѣненія,—конечно, при условіи самаго тщательнаго при анализѣ отбора неперегнившихъ остатковъ соломы, обрывковъ корней и т. п. Въ этомъ случаѣ можно было считать, что мы имѣли дѣло съ почвами, насыщенными органическими веществами до присущаго имъ предѣла.

Изложенными въ настоящей главѣ наблюденіями и опытами мы хотѣли выяснить, въ общихъ чертахъ, роль растительныхъ мертвыхъ остатковъ, въ качествѣ источниковъ гумусообразованія въ почвѣ. Въ слѣдующей главѣ мы рассмотримъ эти объекты, въ качествѣ источниковъ удобоподвижныхъ зольныхъ элементовъ въ почвѣ.

ГЛАВА III.

Растительные остатки, какъ источникъ въ почвѣ водно-растворимыхъ соединенийъ зольнаго характера.

Вліяніе различныхъ температуръ на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ (опыты съ листьями клена).—Спеціальныя опыты съ очень высокой и очень низкой t° (опыты съ березовыми листьями). Вліяніе на процессы отщепленія водно-растворимыхъ минеральныхъ соединений—поперемѣннаго замораживанія и оттаиванія разлагающихся растительныхъ остатковъ.—Вліяніе различной степени увлажненія на процессы минерализаціи (опыты съ листьями клена).—Вліяніе на эти процессы хлороформа (опыты съ клевернымъ сѣномъ).—Вліяніе различныхъ сочетаній t° и влажности на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ (опыты съ березовыми листьями и со степнымъ сѣномъ).

Атмосферная вода, при первомъ своемъ соприкосновеніи съ отмершими растительными остатками, выщелачиваетъ изъ послѣднихъ не только цѣлый рядъ органическихъ соединений, какъ то мы видѣли въ предыдущей главѣ, но несетъ въ растворъ и самыя разнообразныя минеральныя продукты. И тѣ и другіе, въ виду своей легкой растворимости и удобо-подвижности, принимаютъ во всѣхъ жизненныхъ отправленияхъ почвы, конечно, самое дѣятельное участіе.

Когда у насъ шла рѣчь о растительныхъ остаткахъ, какъ объ источникѣ органическихъ соединенийъ въ почвѣ, то мы въ правѣ были говорить именно объ обогащеніи послѣдней этими веществами: органическія соединения синтезируются зеленымъ растеніемъ вновь, и это послѣднее, послѣ своего от-

миранія, является, такимъ образомъ, источникомъ, дѣйстви-
тельно, совершенно новыхъ для почвы продуктовъ. Что
касается соединеній зольнаго характера, то дѣло обстоитъ
здѣсь, конечно, нѣсколько иначе. Упомянутыя соединенія
воспринимаются растительнымъ организмомъ изъ почвы-же, коли-
чество ихъ, въ силу этого, въ почвѣ уменьшается, и только
послѣ смерти растенія, позаимствованныя послѣднимъ мине-
ральныя соединенія возвращаются, и то лишь въ извѣстной
своей части, обратно въ почву. Такимъ образомъ, при изученіи
тѣхъ сложныхъ взаимоотношеній, которыя существуютъ между
растительнымъ организмомъ и минеральными веществами
почвы, казалось бы, рѣчь можетъ идти только объ истощеніи
послѣдней этими веществами. Съ точки зрѣнія суммарнаго
количественнаго баланса минеральныхъ соединеній въ почвѣ,
конечно, это такъ. Но если бы мы обратили вниманіе на
качественную сторону дѣла, то встрѣтились бы съ цѣлымъ
рядомъ фактовъ, свидѣтельствующихъ, наоборотъ, объ увели-
ченіи въ почвѣ, при произрастаніи на ней растеній, под-
вижныхъ, удобоусвояемыхъ формъ минеральныхъ соединеній,
и въ этомъ случаѣ мы также могли бы говорить объ обога-
щеніи (качественномъ) почвы минеральными продуктами.
Укажемъ, напр., на такіе факты, какъ переведеніе кислот-
ными выдѣленіями растительныхъ корней трудно-растворимыхъ
зольныхъ соединеній почвы въ свое тѣло и возвращеніе ихъ
обратно въ почву, послѣ своего отмиранія, — въ видѣ уже
легко растворимыхъ даже въ водѣ продуктовъ, или вспомнимъ
возможность извлеченія длиннокорными растеніями минераль-
ныхъ веществъ изъ глубокихъ горизонтовъ почвы и послѣ-
дующее скопленіе ихъ въ болѣе верхнихъ и пр. и пр., все
это такіе процессы, которые могутъ повлечь за собой уве-
личеніе въ почвенныхъ горизонтахъ удобоподвижныхъ
минеральныхъ соединеній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе интен-
сивный ходъ всѣхъ почвенныхъ реакцій.

Въ наши задачи не входитъ разсмотрѣніе вопроса объ истощеніи почвы; производимомъ тѣми или другими растеніями. На основаніи химическаго состава золь растеній, эта сторона дѣла является болѣе или менѣе выясненной и мы можемъ въ настоящее время отвѣтить даже на такіе, напр., вопросы, въ какомъ количествѣ того или другого зольнаго элемента нуждается то или другое растеніе для нормальнаго своего развитія и т. под. Намъ интересуетъ въ данный моментъ совершенно другой вопросъ, а именно: выясненіе процесса обратнаго отщепленія зольныхъ элементовъ изъ отмершаго растительнаго организма и обратнаго поступленія ихъ въ почву, принимая во вниманіе различныя условія и различныя стадіи разложенности растительнаго объекта. И какъ при изученіи органическихъ соединений, отщепляющихся изъ разлагающихся растительныхъ остатковъ, намъ интересовали, главнымъ образомъ, тѣ изъ нихъ, которыя являются легко-растворимыми въ водѣ, такъ и въ данномъ случаѣ, мы обратимъ вниманіе исключительно лишь на водно-растворимые минерализованные продукты разложенія растительныхъ остатковъ.

Несмотря на то, что упомянутые продукты представляютъ собой самое обычное и естественное явленіе въ природѣ — всюду, гдѣ есть растительность и достаточное количество атмосферныхъ осадковъ, и что, по своей легкой подвижности, они должны считаться однимъ изъ важнѣйшихъ естественныхъ факторовъ почвообразованія, а по своей легкой удобоусвояемости призваны играть главную роль въ питаніи растеній — необходимо тѣмъ не менѣе указать, что продукты эти являются до настоящаго времени крайне мало изученными.

При изученіи процессовъ разложенія органическихъ остатковъ исключительное, можно сказать, вниманіе обращалось лишь на конечные газообразные продукты (главнымъ образомъ — CO_2), и на основаніи количественнаго учета ихъ — со-

ставлялось понятіе о ходѣ и характерѣ этого распада. Между тѣмъ — непосредственное изученіе отщепляющихся при этомъ процессѣ минеральныхъ продуктовъ, ни съ количественной, ни даже съ качественной стороны, почти не затрагивалось. Имѣющіяся же (весьма немногочисленные) работы, касающіяся изученія вообще водно растворимыхъ минеральныхъ продуктовъ, трактуютъ почти исключительно лишь о растворяющемъ дѣйствіи воды на свѣжіе, неподвергавшіеся разложенію, растительные остатки. Литература всѣхъ такихъ изслѣдованій сведена въ моей прежней работѣ ¹⁾. Что же касается изученія тѣхъ растворимыхъ въ водѣ зольныхъ соединений, которые отщепляются изъ разлагающагося при различныхъ условіяхъ матеріала, то свѣдѣнія наши объ этихъ процессахъ болѣе чѣмъ скудны. Это обстоятельство и побудило меня нѣсколько лѣтъ тому назадъ, — подвергнуть указанные продукты болѣе подробному и систематическому изученію. Часть полученныхъ мною результатовъ уже опубликована въ цитированной выше работѣ. Прежде чѣмъ начать теперь изложеніе новыхъ добытыхъ въ этой области данныхъ — я въ самыхъ краткихъ словахъ сообщу предварительно главнѣйшіе выводы моихъ предъидущихъ работъ, такъ какъ они послужатъ исходнымъ пунктомъ и для всего послѣдующаго изложенія.

Не останавливаясь на тѣхъ опытахъ, которые произведены были мною съ цѣлью выяснить силу растворяющаго дѣйствія воды на различные свѣжіе растительные матеріалы (о нихъ нѣсколько словъ сказано было въ предыдущей главѣ), мы прямо перейдемъ къ тѣмъ даннымъ, которые получены были въ опытахъ съ разлагающимися объектами.

Во-1-хъ, изучая количество отщепляющихся минеральныхъ продуктовъ въ опредѣленные промежутки времени изъ различныхъ растительныхъ матеріаловъ, — удалось, прежде всего, составить

¹⁾ „Матер. къ изуч. процессовъ разложенія“ и пр. стр. 15 и слѣд.

себѣ извѣстное понятіе о сравнительной быстротѣ процессовъ разложенія у различныхъ объектовъ. Такъ, оказалось, что у корней (ячменя) процессъ этотъ протекаетъ съ такой быстротой и энергіей, что уже спустя 3 мѣсяца отъ начала разложенія элементы зольныя оказывались вымытыми водой почти нацѣло; такъ, напр.:

SiO_2 перешло въ растворъ спустя 3 м. отъ нач. опыт. до 70% отъ первонач. кол.

K_2O	свыше 90	"	"	"
P_2O_5	до 70	"	"	"
Fe_2O_3	" 80	"	"	"
SO_3	" 82	"	"	"

и т. д.

Болѣе стойкой оказалась листва дуба. Приблизительно такія же количества зольныхъ элементовъ стали переходить въ растворъ изъ этого объекта—лишь спустя 11½ мѣсяцевъ разложенія его; степное сѣно минерализовалось еще болѣе медленнымъ темпомъ и, наконецъ, хвоя сосны показала въ этомъ отношеніи исключительную стойкость: даже спустя 20 мѣс. отъ начала опыта—процессы минерализаціи можно было считать въ этомъ матеріалѣ далеко еще не законченными.

То разнообразіе въ быстротѣ и характерѣ отщепленія воднорастворимыхъ минеральныхъ соединений, которое пришлось наблюдать у различныхъ растительныхъ объектовъ при ихъ разложеніи,—обязываетъ насъ, при характеристикѣ ихъ въ качествѣ источниковъ обогащенія почвы легкоусвояемыми минеральными веществами, принимать во вниманіе не только внѣшнія условія разложенія (t° окружающей среды, влажность, притокъ воздуха и пр.), и не только количество отмирающей въ данномъ районѣ растительности, но и способность послѣдней къ разлагаемости вообще, обусловливаемую свойствами ея строенія, состава и т. п. Съ этой точки зрѣнія, напр., корневую систему растеній, вѣроятно, надо считать наиболѣе

подвижнымъ и богатымъ ¹⁾ источникомъ въ почвѣ легко-растворимыхъ, а, слѣдовательно, и удобоусвояемыхъ для растений, соединений; хвою различныхъ хвойныхъ породъ, наоборотъ, надо, вѣроятно, считать въ этомъ отношеніи наиболѣ инертнымъ матеріаломъ, что въ свою очередь, конечно, нельзя не принимать во вниманіе при изученіи, напр., условій накопленія и обогащенія почвъ изъ-подъ хвойныхъ лѣсовъ легко-растворимыми минеральными соединениями и т. д.

Во-2-хъ, изучая далѣе послѣдовательность отщепленія растворимыхъ минеральныхъ продуктовъ у различныхъ растительныхъ матеріаловъ при процессахъ ихъ разложенія, — удалось подмѣтить слѣдующія, болѣе или менѣе общія, для всѣхъ взятыхъ объектовъ, явленія: а) быструю и энергичную отдачу водѣ разлагающейся массой своихъ щелочно-земельныхъ основаній, при чемъ послѣднія часто оказывались вымытыми почти нацѣло — въ первыя же стадіи процесса разложенія растительныхъ остатковъ. По мѣрѣ однако развитія процессовъ распада послѣднихъ — упомянутыя соединенія снова закрѣплялись какимъ то образомъ при разлагающемся матеріалѣ, и тогда въ водныхъ вытяжкахъ приходилось констатировать весьма небольшія сравнительно количества ихъ. Послѣднее явленіе я объяснялъ постепеннымъ образованіемъ въ разлагающемся матеріалѣ нерастворимыхъ перегнойно-известковыхъ соединений; б) въ большихъ же количествахъ шли въ растворъ изъ разлагающейся массы также полуторіе окислы, Na_2O , SO_3 , отчасти SiO_2 . Что касается P_2O_5 и отчасти K_2O , то хотя и эти соединенія отщеплялись отъ органической массы въ первыя же стадіи разложенія ея въ довольно крупныхъ количествахъ, но въ дальнѣйшемъ замѣчалось довольно, такъ сказать, скупое поступленіе ихъ въ водный растворъ и сравнительно болѣе долгое закрѣпленіе ихъ при разлагающемся ма-

¹⁾ Анализы показали въ золѣ корневой системы весьма высокое содержаніе всѣхъ элементовъ.

теріалѣ; с) указанная послѣдовательность отщепленія минерализованныхъ продуктовъ, довольно правильно наблюдавшаяся нами въ опытахъ съ различными растительными объектами,—должна считаться однако таковой лишь въ томъ случаѣ, когда растворимые въ водѣ продукты разложенія органическихъ остатковъ остаются при разлагающемся матеріалѣ, и не выходятъ изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда упомянутые продукты систематически удаляются изъ разлагающагося матеріала и выходятъ изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ,—тогда получается, какъ показали наши опыты, совершенно другая картина: разлагающаяся масса, обѣднѣнная въ первыя же стадіи переживаемаго процесса основаніями (главнымъ образомъ, какъ мы видѣли, щелочно-земельными), начинаетъ накапливать въ себѣ въ большихъ количествахъ продукты кислотнаго характера. Дальнѣйшій ходъ нормальнаго разложенія растительныхъ остатковъ, въ силу этого, начинаетъ итти угнетеннымъ темпомъ, что и обуславливаетъ въ своемъ конечномъ результатѣ, сравнительно меньшее количество идущихъ въ растворъ минеральныхъ продуктовъ.

Въ-3-хъ, изслѣдуя дальнѣйшую судьбу, претерпѣваемую водно-растворимыми минеральными продуктами при поступленіи послѣднихъ въ почву, и задавшись при этомъ прежде всего цѣлью ознакомиться съ количественной стороной вопроса о поглощеніи и закрѣпленіи почвами вымываемыхъ въ нее вышеупомянутыхъ продуктовъ,—мною были организованы съ черноземной почвой и съ сѣрымъ лѣснымъ суглинкомъ соотвѣтствующіе опыты (постановка ихъ описана вкратцѣ на стр. 105 настоящей работы), которые и показали возможность прочнаго закрѣпленія и поглощенія этими почвами всѣхъ элементовъ, входящихъ въ составъ воднорастворимыхъ минеральныхъ продуктовъ разложенія растительныхъ объектовъ. Такъ, черноземной почвой было поглощено изъ притекающихъ въ него

растворовъ (полученныхъ при промываніи водой разлагающихся осиновыхъ листьевъ):

	%
SiO_2	2,42
K_2O	15,86
Na_2O	18,69
CaO	54,89
MgO	35,42
P_2O_5	25,53
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	92,11
Mn_2O_4	1,64
SO_2	61,70

Изъ того-же раствора — сѣрой лѣсной почвой было поглощено:

	%
SiO_2	0,62
K_2O	13,11
Na_2O	9,74
CaO	38,85
MgO	29,02
P_2O_5	20,16
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	48,78
Mn_2O_4	1,43
SO_2	49,20

А такъ какъ одновременно съ поглощеніемъ минеральныхъ соединенийъ была констатирована въ описываемыхъ опытахъ способность тѣхъ же почвъ закрѣплять въ себѣ и извѣстныя количества органическихъ соединенийъ, отщепляющихся отъ разлагающихся растительныхъ остатковъ, то мнѣ казалось тогда возможнымъ говорить вообще о вѣроятности въ природѣ случаевъ „реградационныхъ“ процессовъ ¹⁾).

Вотъ тѣ главнѣйшіе выводы, къ которымъ привели меня мои прежнія работы — въ области изученія растительныхъ остатковъ, какъ источника воднорастворимыхъ солевыхъ соединений.

Изложенная работа имѣла своею задачей намѣтить лишь общую схему изучаемыхъ явленій. Вотъ почему условія, при

¹⁾ Въ предыдущей главѣ процессамъ этимъ дано, какъ мы видѣли, болѣе полное освѣщеніе.

которых разлагались тѣ или другіе растительные объекты, не подвергались при этомъ учету. Упомянутые выше объекты за все время опытовъ, правда, поддерживались во влажномъ состояніи, но увлажненіе это производилось нерегулярно, лишь по мѣрѣ подсыханія матеріала, а, главное, — степень увлажненія послѣдняго оставалась въ точности неизвѣстной. Также не подвергалась точному учету и t° окружающаго воздуха. Между тѣмъ различные растительные объекты, въ силу своихъ физическихъ свойствъ и химическаго состава, реагируютъ на одну и ту же влажность или на t° — совершенно различнымъ образомъ (см. объ этомъ I-ую главу), и безъ точнаго учета тѣхъ окружающихъ условій, въ которыхъ протекаютъ процессы разложенія органическихъ остатковъ — нельзя, конечно, получить цѣльной и детальной картины происходящихъ при этихъ процессахъ явленій минерализаціи.

Какъ извѣстно, вліяніе каждаго въ отдѣльности фактора (t° , влаги, O воздуха и пр.) и ихъ комбинацій на энергію процессовъ разложенія органическихъ остатковъ по выделяющейся при этихъ процессахъ углекислотѣ, изучено подробнѣйшимъ образомъ ¹⁾.

Значительно болѣе интереснымъ и важнымъ представляется мнѣ подвергнуть изученію вліяніе тѣхъ же факторовъ на энергію и характеръ процессовъ отщепленія изъ разлагающейся массы водно-растворимыхъ минеральныхъ продуктовъ. Вопросъ этотъ является до настоящаго времени почти не затронутымъ.

Въ видахъ систематическаго изученія этой интереснѣйшей области, въ нашей лабораторіи предпринять рядъ соответствующихъ работъ какъ мною самимъ, такъ и моими уче-

¹⁾ См. напр., монографію Wollny „Die Zersetzung der Organisch. Stoffe und die Humusbildungen“... etc 1897; Костычевъ—Почвы черноземн. Области Россіи ч. I, 1886, и мн. др.

низами-сотрудниками. Къ изложенію этихъ работъ я сейчасъ и перехожу.

Г) Вліяніе различной температуры на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ.

(студ. Петровъ).

Для опытовъ служили листья клена, собранные въ среднихъ числахъ сентября непосредственно съ дерева (изъ Ботанич. Сада С.-Петербургскаго Университета). Матеріалъ былъ высушенъ при комнатной t° и слегка растертъ руками, для полученія болѣе однородной массы. Въ три объемистыхъ стеклянныхъ сосуда помѣщено было по 150 гр. воздушно-сухихъ листьевъ. Влажность ихъ за все время опытовъ поддерживалась равной половинѣ влагоемкости этого матеріала (влагоемкость эта = 484%). Сосудъ № I былъ помѣщенъ въ термостатъ, гдѣ t° поддерживалась все время около 37° — 38° С. Сосудъ № II помѣщался въ аудиторіи Агрономическаго кабинета, гдѣ t° воздуха колебалась отъ 15° до 19° С. Наконецъ, сосудъ № III помѣщался между оконными рамами, гдѣ колебанія t° были, правда, наиболѣе значительны, но большую часть времени послѣдняя держалась все-таки на уровнѣ $(-2^{\circ}) + 6^{\circ}$ С. По истеченіи опредѣленнаго промежутка времени, растительные матеріалы обрабатывались 20-ти кратнымъ количествомъ дистиллированной воды, (въ теченіе 8 мин.) фильтровались быстро черезъ плотную марлю, послѣ чего водная вытяжка поступала въ глиняные фильтры Шамберлана. Опредѣленный объемъ ея выпаривался до суха, высушивался и подвергался медленному и осторожному сжиганію. Въ золѣ опредѣлялись элементы обычными методами анализа.

Переходимъ къ полученнымъ результатамъ.

Количество золы въ листьяхъ клена	% 7,86
---	-----------

Содержаніе въ золѣ важнѣйшихъ соединений слѣд.:

	%
SiO_2	19,54
$(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$	10,12
CaO	23,44 ¹⁾
MgO	4,91
P_2O_5	10,44
K_2O	11,64

Изъ свѣжихъ, неподвергавшихся разложенію листьевъ, дистиллированная вода (взятая въ 20-ти кратномъ количествѣ) извлекала:

	%
SiO_2	0,509
$(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$	1,306
CaO	2,135
MgO	1,271
P_2O_5	4,751
K_2O	5,264 ²⁾

Изъ каждаго сосуда получены были 4 вытяжки (3 изъ нихъ черезъ 15 дней другъ за другомъ, послѣдняя спустя 20 дней).

Результаты анализовъ стекающихъ жидкостей сведены въ слѣдующихъ таблицахъ:

¹⁾ Какъ извѣстно, ко времени листопада (когда часть составныхъ частей изъ листьевъ уходитъ въ стволъ, а содержаніе другихъ, наоборотъ, процентно повышается) замѣчается довольно значительное повышение, въ частности, % CaO . (См., напр., Wolff „Aschen-Analysen von landw. Producten“, ... etc, 1871., в. 156). Приведенный выше анализъ, показавшій такой сравнительно невысокій % CaO , указываетъ, что описанный процессъ во взятыхъ для опыта листьяхъ далеко не закончился.

²⁾ Какъ видимъ, объектъ этотъ, будучи въ свѣжемъ состояніи, отдаетъ водѣ слишкомъ малыя количества своихъ зольныхъ соединений (ср. данныя Ramanp'a, Schröder'a и мои, полученные по отношенію къ листьямъ другихъ древесныхъ породъ). Это обстоятельство уже предвѣщаетъ вопросъ о малой вообще разлагаемости данного объекта (всп. зависимость, установленную нашими прежними опытами по отношенію къ этимъ двумъ величинамъ).

Сосудъ I ($T^{\circ} = 36^{\circ} - 38^{\circ} \text{C.}$).

	Перешло въ водный растворъ въ %.					
	SiO_2	$\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{+ \text{Fe}_2\text{O}_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O
Изъ листьевъ клёна разлагавш. въ теченіе 15 дней .	2,49	5,09	5,86	18,87	22,46	?
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	2,49	2,55	3,69	12,26	8,42	29,25
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	3,54	1,03	3,09	4,12	3,68	14,89
Еще черезъ 20 дней перешло въ растворъ	2,14	1,10	3,14	7,17	1,34	10,25
Всего за 65 дней опыта .	10,66	9,77	15,78	42,42	35,90	?

Сосудъ II ($T^{\circ} = 15^{\circ} - 19^{\circ} \text{C.}$).

	Перешло въ водный растворъ въ %.					
	SiO_2	$\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{+ \text{Fe}_2\text{O}_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O
Изъ листьевъ, разлагавшихся въ теченіе 15 дней .	2,47	5,52	5,42	20,49	41,77	38,59
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	1,72	1,76	3,03	9,21	16,05	23,13
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	2,41	0,76	2,73	4,12	7,05	14,90
Еще черезъ 20 дней перешло въ растворъ	2,16	1,00	3,09	6,21	2,50	7,96
Всего за 65 дней опыта .	8,76	9,04	14,27	40,03	67,37	84,58

Сосудъ III ($T^{\circ} = (-2^{\circ}) - (+6^{\circ} \text{C.})$).

	Перешло въ водный растворъ въ %.					
	SiO_2	$\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{+ \text{Fe}_2\text{O}_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O
Изъ листьевъ разлагавшихся въ теченіе 15 дней .	1,51	3,77	2,80	11,90	36,39	31,74
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	1,33	1,26	2,73	9,10	18,85	18,98
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	0,81	0,50	1,57	0,97	8,11	2,41
Еще черезъ 20 дней перешло въ растворъ	1,17	1,26	0,86	8,75	5,15	5,50
Всего за 65 дней опыта .	4,82	6,79	7,76	30,72	67,50	58,63

Разсматривая цифры этихъ анализовъ, мы находимъ возможнымъ сдѣлать на основаніи ихъ слѣдующія обобщенія:

1) Вліяніе температуры на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ связывается въ описанныхъ опытахъ весьма рельефно. Оставляя пока въ сторонѣ P_2O_5 , какъ давшую совершенно неожиданные результаты, мы можемъ по отношенію ко всѣмъ другимъ соединеніямъ подмѣтить то общее для всѣхъ нихъ явленіе, что по мѣрѣ повышенія t° количество отщепляющихся зольныхъ веществъ увеличивается. Наиболѣе рѣзко это видно, если мы будемъ сравнивать между собою общія суммы перешедшихъ въ растворъ упомянутыхъ соединеній за всѣ 65 дней опыта. Но та же самая тенденція замѣчается—правда, не столь наглядно—и при сравненіи соотвѣствующихъ цифръ по отдѣльнымъ періодамъ наблюденій. Указанная закономерность касается, какъ я уже сказалъ, всѣхъ зольныхъ соединеній (кромѣ P_2O_5). Что касается, въ частности, K_2O , то, хотя общая сумма его, перешедшая въ водный растворъ изъ сосуда № I остается, въ сущности говоря, неизвѣстной (такъ какъ въ первой вытяжкѣ, полученной спустя 15 дней отъ начала опыта— K_2O случайно не былъ опредѣленъ), тѣмъ не менѣе, сравнивая цифры по отдѣльнымъ періодамъ, мы подмѣчаемъ ту же особенность, а именно, меньшую выщелачиваемость этого соединенія по мѣрѣ паденія t° , откуда съ большой долей вѣроятности можемъ заключить (по аналогіи съ другими элементами) и о соотвѣствующемъ уменьшеніи при этомъ также и общаго количества его, перешедшаго въ водный растворъ за всѣ 65 дней наблюденія.

2) Фосфорная кислота даетъ въ этомъ отношеніи совершенно обратную зависимость: чѣмъ въ лучшихъ температурныхъ условіяхъ находится разлагающійся матеріалъ, тѣмъ меньшее количество P_2O_5 отщепляется отъ послѣдняго. Если при оптимальныхъ условіяхъ t° перешло въ водный растворъ за 65 дней разложенія 35,90% P_2O_5 ,

то при 15° — 19° С.—почти вдвое больше, а именно 67,37%. Такое же приблизительно количество перешло въ водный раствор фосфорной кислоты и изъ матеріала, разлагавшагося при еще болѣе низкой t° (67,50%). Это неожиданное явленіе подтверждается и при сравненіи соответствующихъ цифръ во всѣхъ сосудахъ по отдѣльнымъ періодамъ.

Фактъ закрѣпленія фосфорной кислоты при разлагающемся матеріалѣ, наблюдаемый при оптимальныхъ внѣшнихъ условіяхъ этого разложенія, находитъ себѣ объясненіе, какъ мнѣ кажется, отчасти въ образованіи при этомъ различныхъ нерастворимыхъ органо-минеральныхъ соединений, въ составъ которыхъ входитъ P_2O_5 , отчасти и въ образованіи при этомъ процессовъ нерастворимыхъ солей извести и желѣза; но главную роль играли здѣсь, вѣроятно, біологическіе факторы: оптимальныя условія увлаженія и t° способствовали появленію на разлагающейся массѣ богатѣйшей микроскопической флоры, которая и закрѣпила отщепляющуюся P_2O_5 въ своемъ тѣлѣ, въ формѣ сложныхъ неуклеиновыхъ соединений ¹⁾.

¹⁾ Присутствіе сложныхъ фосфорно-органическихъ соединений не только въ растительномъ царствѣ, но и въ почвѣ, надо считать въ настоящее время прочно установленнымъ. К. Азо („Bull. of the College of Agric. Tokyo“, Т. VI), нашелъ въ одной почвѣ большую часть принадлежащей ей P_2O_5 —именно въ формѣ нуклеиновыхъ веществъ. Дамонт („Comptes Rendus“, 1906, Т. 143), доказываетъ своими анализами присутствіе въ почвѣ фосфорно-гуминовыхъ соединений, какъ продуктъ разложенія растительныхъ остатковъ, богатыхъ нуклеиномъ и лецитиномъ.

Въ 1894 г. проф. Палладинымъ („Zeitschr. für Biologie“, s. 199) открыта въ растительномъ царствѣ особая форма органическаго фосфора—„фитинъ“ (= ангидро-оксип-метилент-дифосфоринокислый Са и Mg), являющаяся какъ бы промежуточной формой между нѣкоторыми соединениями органической и неорганической природы. Присутствіе фитина также и въ почвѣ, едва ли можетъ быть подвергнуто сомнѣнію. См. также работу Winterstein'a („Zeitschr. für Physik. Chemie“, XXII).

Въ только что вышедшей своей работѣ Stoclasa („Centralbl. für Bakteriologie“, 1911, II Abt. № 15—19), доказываетъ цифровыми данными присутствіе въ растительномъ царствѣ и въ почвѣ значительнаго количества фосфатидовъ.

Предположеніе это находитъ себѣ полное подтвержденіе въ опытахъ съ клевернымъ сѣномъ студ. Н. Розова, о которыхъ подробнѣй рѣчь будетъ впереди. Пока укажу лишь, что изъ клевернаго сѣна, находившагося также въ оптимальныхъ условіяхъ разложенія, дистиллированная вода при этихъ опытахъ выщелочила 10,53% P_2O_5 (спустя 56 дней отъ начала разложенія), между тѣмъ—изъ такого же количества того же объекта, но находившагося все время въ соприкосновеніи съ хлороформомъ, въ водный растворъ, спустя также 56 дней, перешло уже 87,42% P_2O_5 ! ¹⁾

Указанный фактъ лишній разъ подчеркиваетъ намъ, какія неполныя и часто ошибочныя заключенія можемъ мы дѣлать въ области изученія процессовъ распада органическаго вещества, основываясь на измѣреніи лишь количествъ CO_2 , выделяющихся при этихъ процессахъ: самый распадъ можетъ, напр., при благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, итти энергичнымъ

¹⁾ И наблюдавшійся въ моихъ прежнихъ опытахъ фактъ, сравнительно долгаго закрѣпленія P_2O_5 при разлагающемся матеріалѣ объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что опыты эти велись въ условіяхъ сравнительно весьма благопріятной влажности и t° .

Примѣчаніе. Появившаяся недавно работа С. Северина (см. „Вѣстникъ бактер.-агрономич. Станціи“, 1910, № 17) „Мобилизація почвенной фосфорной кислоты подъ вліяніемъ жизнедѣятельности бактерій“ констатируетъ, оказывается, совершенно аналогичный фактъ. На основаніи своихъ опытовъ авторъ пришелъ, по его собственному признанію, совершенно къ неожиданнымъ результатамъ, а именно: чѣмъ болѣе выделялось изъ разлагающейся массы CO_2 , тѣмъ болѣе падало количество „растворимой“ фосфорной кислоты; такимъ образомъ „этотъ главный, казалось бы, растворитель (т.-е. CO_2) въ почвѣ фосфатовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ главный показатель энергіи разрушенія и мобилизаціи органической матеріи... сыгралъ какъ бы отрицательную роль“. На основаніи этихъ данныхъ, авторъ считаетъ несомнѣннымъ, что параллельно работѣ однѣхъ бактерій, энергично растворявшихъ фосфорную кислоту (органическаго вещества почвы) идетъ болѣе интенсивная работа другихъ микроорганизмовъ, наоборотъ, потребляющихъ ее и превращающихъ въ сложныя органическія соединенія живой матеріи.

Такимъ образомъ, цитированной работой г. Северина, съ одной стороны, и излагаемыми опытами, произведенными въ нашей лабораторіи, съ другой, устанавливается, независимо другъ отъ друга, совершенно аналогичный фактъ.

путемъ, углекислоты можетъ выделяться при этомъ весьма большое количество, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ разлагающейся массѣ можетъ происходить при этомъ цѣлый рядъ внутреннихъ перетасовокъ химическаго характера, которыя въ суммарномъ своемъ итогѣ могутъ отразиться въ смыслѣ, напр., значительно меньшаго количества тѣхъ или другихъ, переходящихъ въ растворъ, удобоподвижныхъ минерализованныхъ соединений и т. п.

При сужденіяхъ далѣе о распредѣленіи и накопленіи фосфорной кислоты въ почвахъ сѣверныхъ холодныхъ широтъ и въ почвахъ, находящихся въ болѣе благоприятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, весьма возможно, что и констатированный выше фактъ о значительно болѣеи закрѣпленіи этого соединения, наблюдаемомъ именно при лучшихъ условіяхъ разложенія отмирающихъ растительныхъ остатковъ, также долженъ оставаться не безъ вниманія.

3) Если мы будемъ слѣдить за каждымъ въ отдѣльности элементомъ, переходящимъ въ водный растворъ, по отдѣль-

Интереснѣйшія данныя объ этомъ „біологическомъ“ поглощеніи P_2O_5 сообщает Stoclasa въ своей, только что выпедней работѣ, „Біохимическій круговоротъ іоновъ P_2O_5 въ почвѣ“ („Centralbl. für Bakteriол.“, 1911, II Abt.). Работая съ *Azotobacter*, цитируемый авторъ нашелъ напр., что организмъ этотъ усвоилъ фосфорной кислоты (привожу лишь нѣкоторыя цифры):

	‰
Изъ двуосновного фосфата <i>Ca</i>	20,13
„ трѣхъосновного „	15,75 и т. п.
„ флоридскаго фосфорита.	12,66
„ алжирскаго „	15,73

Что же касается почвъ, то синтезъ P_2O_5 упомянутымъ организмомъ достигается, оказывается, огромныхъ величинъ; такъ,

	‰
Изъ почвы, образовавшейся на гранитѣ, усвоено было P_2O_5 . .	49,02
„ „ „ „ паносахъ „ „ „ .	99,44 (1)
„ „ „ „ базальтѣ „ „ „ .	50,27 и т. д.

Всѣ эти количества P_2O_5 были синтезированы *Azotobacter*’омъ въ такіхъ сложныхъ соединеніяхъ, какъ нуклеопротенды, фосфатиды, фитинъ и т. п.

нымъ періодамъ опыта, то замѣтимъ, что, чѣмъ дальше подвигалось разложеніе даннаго матеріала, тѣмъ все меньшія количества отщеплялись отъ послѣдняго минеральныхъ соединений (за нѣкоторыми несущественными исключеніями). Фактъ этотъ наблюдается во всѣхъ категоріяхъ опытовъ и находится въ полномъ соотвѣтствіи съ аналогичными же выводами Wollny, проф. Костычева и др., констатировавшихъ аналогичное явленіе, на основаніи измѣренія количествъ выделяющей при этомъ CO_2 .

4) Наконецъ, рассмотрѣніе сравнительныхъ количествъ различныхъ элементовъ, идущихъ въ растворъ, при процессѣ разложенія даннаго объекта, (кромѣ P_2O_5 , о которой мы говорили выше), показываетъ намъ, что особенно обѣдняется разлагающійся матеріалъ соединениями калія и магнія; полуторные окислы и кремнекислота переходятъ въ растворъ въ значительно меньшихъ количествахъ. Выводъ этотъ вполне совпадаетъ съ данными Ramann'a, Schröder'a, а также и мои. Меньше, чѣмъ слѣдовало бы ожидать, переходитъ въ растворъ CaO ; объясняется этотъ фактъ отчасти тѣмъ, что взятый для опытовъ объектъ, какъ и уже и указалъ выше, является довольно бѣднымъ этимъ соединеніемъ, отчасти, быть можетъ, и тѣмъ, что явленіе обратнаго закрѣпленія извести при разлагающемся матеріалѣ, которое такъ рельефно, какъ мы видѣли, сказывалось во всѣхъ моихъ прежнихъ опытахъ, произошло въ данномъ матеріалѣ спустя сравнительно очень короткій промежутокъ времени отъ начала разложенія.

Описанные опыты съ вліяніемъ различной t° на процессы минерализаціи, я могу дополнить еще собственными наблюденіями надъ изученіемъ вліянія на тѣ же процессы весьма высокой и весьма низкой температуръ. Съ этой цѣлью листва березы (составъ ея приведенъ въ гл. II, стр. 117) въ количествѣ 150 гт. помѣщалась въ воздушную баню, гдѣ t° поддерживалась приблизительно около $130^\circ C$. Въ виду силь-

нѣйшаго испаренія воды изъ даннаго матеріала, послѣдній приходилось тарировать раза 3—4 въ день, поддерживая въ немъ все время влажность, равную $\frac{1}{2}$ влагосмкости. Въ теченіе ночи объектъ оставался однако безъ поливки (сосудъ I). Другой такой же сосудъ съ такимъ же количествомъ матеріала помѣщался непосредственно на открытомъ воздухѣ. Температура воздуха (опыты велись въ декабрѣ мѣсяцѣ) колебалась въ предѣлахъ отъ -9° до -21° C (Сосудъ II). Подливать воды въ этотъ сосудъ почти не приходилось, такъ какъ испареніе было ничтожное; растительный объектъ всегда былъ смерзшимъ; весьма часто приходилось наблюдать даже нѣкоторый привѣсъ въ матеріалѣ, что указывало на то, что количество сгустившейся влаги окружающаго болѣе теплаго воздуха (взвѣшиваніе производилось въ тепломъ помѣщеніи) на стѣнкахъ стекляннаго сосуда, несмотря на быструю операцію этого взвѣшиванія, превышало количество испарившейся изъ матеріала воды за предыдущій день. Опытъ продолжались 15 дней, послѣ чего изъ растительныхъ матеріаловъ получены были описаннымъ выше способомъ водныя вытяжки. Матеріалъ изъ сосуда II-го, передъ тѣмъ какъ подвергнуться анализу, растался тонкимъ слоѣмъ на столѣ и послѣ оттаиванія (спустя минутъ 8—10), немедленно обрабатывался 3 литрами воды. Полученные результаты анализовъ сведены въ слѣдующей таблицѣ:

	Перешло въ водный растворъ въ %.	
	Сосудъ I (t° 130° C). %	Сосудъ II [(t° -9°) до (-21°)] %
SiO_2	12,32	1,59
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	14,18	—
CaO	73,71	6,16
MgO	59,46	19,03
K_2O	34,78	12,97
Na_2O	29,94	1,06
P_2O_5	48,47	12,41
SO_3	39,98	20,09

Чтобы такъ или иначе оцѣнить эти цифры—намъ необходимо сравнить ихъ съ тѣми величинами, которыя получены были нами по отношенію къ тому же объекту, но разлагавшемуся при другихъ внѣшнихъ условіяхъ (см. подробнѣе ниже въ § V „Вліяніе различныхъ сочетаній t° и влажности на процессы минерализаціи“). Сопоставляя эти цифры между собою, мы убѣждаемся, что даже при такъ называемыхъ оптимальныхъ условіяхъ t° и увлаженія, изъ даннаго объекта за 15 дней его разложенія перешло въ растворъ значительно меньшее количество водно-растворимыхъ зольныхъ соединений сравнительно съ тѣмъ, что мы видимъ по отношенію къ объекту, разлагавшемуся при 130° C.

Дѣйствительно, анализъ показываетъ (см. ниже), что при $t^{\circ} = 38^{\circ}$ C и влажности = $\frac{1}{2}$ влагоемкости, перешло изъ листьевъ березы въ растворъ, спустя 15 дней отъ начала опыта:

	%
SiO_2	4,02
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	6,14
CaO	38,22
MgO	43,10
P_2O_5	11,11
K_2O	20,33
Na_2O	12,02
SO_2	26,12

Съ другой стороны—изъ растительной массы, подвергавшейся въ теченіе 15 дней замораживанію, перешло въ водный растворъ такое незначительное количество упомянутыхъ соединений, которое весьма мало отличается отъ соответствующихъ величинъ, найденныхъ нами по отношенію къ свѣжему, не разлагавшемуся объекту. Дѣйствительно изъ свѣжей березовой листвы переходить въ растворъ (см. ниже):

	%
SiO_2	1,40
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	слѣды

	%
CaO	5,72
MgO	17,03
P_2O_5	9,11
K_2O	12,01
Na_2O	слѣды
SO_2	19,33

Итакъ, описываемыми опытами констатируется необычайно энергичный распадъ органическихъ веществъ даннаго растительнаго объекта, совершающійся при очень высокихъ температурахъ, и, наоборотъ, почти полная консервированность его—при низкихъ.

Что касается перваго факта, то онъ интересенъ тѣмъ, что указываетъ вполне опредѣленно на возможность и естественность процессовъ минерализации, идущихъ безъ участія биологическихъ агентовъ ¹⁾, а лишь подъ вліяніемъ однихъ физическихъ и химическихъ. Съ другой стороны, припоминая работы Моллера, Фодора, Wollny, Костычева и др., констатировавшія, по количеству выделяемой CO_2 , наоборотъ, сильное угнетеніе процессовъ разложенія органическихъ веществъ при температурахъ, превышающихъ 60° — 80° , мы должны предположить, что при очень высокихъ температурахъ, когда біологическіе факторы являются всѣ убитыми и когда выступаютъ на сцену одни лишь химическіе и физическіе—распадъ органическаго вещества происходитъ (и очень энергично), главнымъ образомъ, лишь до стадіи различныхъ промежуточныхъ соединений, легко растворимыхъ въ водѣ, и что дальнѣйшее, окончательное стораніе ихъ до CO_2 и др. газообразныхъ продуктовъ идетъ уже подъ непосредственнымъ вліяніемъ микроорганизмовъ ²⁾. Такимъ образомъ, несмотря на

¹⁾ Отсутствіе факта закрѣпленія P_2O_5 при 130° —лишній разъ подтверждаетъ высказанное выше предположеніе о біологическихъ причинахъ этого закрѣпленія.

²⁾ Впрочемъ, намъ извѣстенъ цѣлый рядъ микроорганизмовъ, которые, поглощая кислородъ, не доводятъ реакцій окисленія до ихъ конечнаго пре-

малое количество выделяющейся при процессах разложения CO_2 —все же внутри самой органической массы могут идти энергичнѣйшія реакціи распада вплоть до образованія легко-подвижныхъ растворимыхъ (органо-минеральныхъ?) продуктовъ. Въ излагаемыхъ ниже опытахъ съ вліяніемъ хлороформа на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ—мы встрѣтимся совершенно съ аналогичнымъ явленіемъ: хотя присутствіемъ хлороформа въ нашихъ опытахъ убивались (или, по крайней мѣрѣ, сильно угнетались) біологическіе факторы, тѣмъ не менѣе анализы показывали весьма большое количество отщепляющихся при этомъ изъ растительной массы легко подвижныхъ (органо-минеральныхъ) соединений. Между тѣмъ, опыты Wollny и мн. др. показываютъ, что прибавленіе различныхъ антисептиковъ рѣзко отражается именно на уменьшеніи количества выделяющейся при процессахъ разложения CO_2 . Это кажущееся противорѣчіе устранится, по моему мнѣнію, вполнѣ удовлетворительно высказанными выше соображеніями. Если же мы допустимъ теперь возможность въ природѣ такого факта, что одновременно съ сильнѣйшимъ распадомъ органическаго вещества происходятъ энергичныя обратныя регенераціонныя явленія въ тѣлѣ микроскопическихъ существъ ¹⁾, то мыслимо вполнѣ и обратное явленіе: при громадномъ количествѣ выделяющейся CO_2 изъ разлагающагося объекта, въ послѣднемъ, наоборотъ, будутъ идти усиленнымъ

дѣла и CO_2 при этомъ не выделяютъ (напр., уксуснокислыя бактеріи, окисляющія этиловый спиртъ въ уксусную кислоту, далѣе—нѣкоторыя плѣсени, окисляющія сахаръ съ образованіемъ щавелевой и лимонной кислоты и пр.).

¹⁾ Съ такимъ фактомъ мы встрѣтились уже въ описанныхъ выше опытахъ по отношенію къ P_2O_5 . Ниже мы приведемъ этимъ фактамъ еще другія доказательства. И какъ разъ процессы эти идутъ тѣмъ энергичнѣй, чѣмъ въ болѣе благоприятныхъ внѣшнихъ условіяхъ находится разлагающійся матеріалъ.

См. также цитированную выше (въ примѣчаніи) недавно появившуюся работу г. Северина и Stoclasa.

темномъ процессы именно синтетическіе, и въ результатѣ мы будемъ открывать, напр., въ водныхъ вытяжкахъ изъ даннаго объекта, наоборотъ, ничтожное количество легко-подвижныхъ продуктовъ и т. п.

Все это указываетъ на то, что изученіе сложнѣйшихъ процессовъ разложенія органическихъ остатковъ только методомъ измѣренія количествъ CO_2 , даетъ намъ слишкомъ общія, лишь суммарныя представленія о характерѣ указанныхъ явленій, не выясняя внутренней сущности ихъ ¹⁾.

Возвращаясь къ цифрамъ нашихъ анализовъ и обращаясь теперь къ другому (II) сосуду, который находился, какъ мы видѣли, все время въ условіяхъ замораживанія, мы наблюдаемъ весьма ничтожную разницу въ количествахъ отщепляющихся изъ такого матеріала водно-растворимыхъ соединений — по сравненію со свѣжимъ неразлагавшимся объектомъ, что указываетъ на полное угнетеніе не только биологическихъ, но и химическихъ процессовъ въ немъ при низкихъ температурахъ. Но вотъ какое любопытное явленіе пришлось намъ наблюдать позднѣе по отношенію къ тому же объекту. Подъ впечатлѣніемъ тѣхъ крупныхъ количествъ минерализованныхъ продуктовъ, которые идутъ въ водную вытяжку изъ тѣхъ растительныхъ остатковъ, которые разлагаются въ условіяхъ почти полного устраненія, или, по крайней мѣрѣ, сильнаго ослабленія биологическихъ агентовъ (очень высокая t° , прибавленіе хлороформа) ²⁾, чѣмъ доказывалась возможность глубокаго рас-

¹⁾ Помимо высказанныхъ выше соображеній, необходимо еще указать на возможность, примѣнительно въ частности къ почвѣ, разложенія карбонатовъ тѣми кислотами, которыя являются продуктомъ жизнедѣятельности бактерій, съ выдѣленіемъ CO_2 , что также можетъ служить причиной ошибочныхъ заключеній о характерѣ и интенсивности разложенія органическихъ веществъ въ почвѣ. Съ этой точки зрѣнія методъ, предложенный для учета жизнедѣятельности бактерій въ почвѣ по количеству выдѣляющейся CO_2 , Нез-ван Suchtelen'омъ („Centr. für Bakteriologie“ Bd. XXVIII) едва ли можно считать точнымъ.

²⁾ Опыты эти изложены нѣсколько ниже.

пада, и притомъ въ очень большихъ размѣрахъ, органическаго вещества подъ вліяніемъ однихъ лишь физическихъ и химическихъ факторовъ,—я задался цѣлью выяснитъ, какимъ образомъ отражается на этихъ процессахъ фактъ попеременнаго замораживанія и оттаиванія разлагающагося объекта. Отчасти на эту мысль натолкнули меня извѣстные факты довольно скорого загниванія различныхъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, испытавшихъ предварительное замораживаніе (клубни картофеля и пр.).

Результаты поставленнаго съ цѣлью выяснитъ этотъ вопросъ опыта оказались весьма любопытными. Самая постановка опыта была такова: вышеупомянутая листва березы, въ размѣрѣ 150 gr., съ влажностью, равной $\frac{1}{2}$ влагоемкости этого матеріала, періодически находилась то на внѣшнемъ воздухѣ (гдѣ t° все время опытовъ была съ минусами (отъ -2° C до -10° C), то въ термостатѣ (съ $t^\circ = 27^\circ - 29^\circ$ C). На внѣшнемъ воздухѣ сосудъ обычно оставался 2 дня, въ термостатѣ—одинъ день. Опытъ продолжался 18 дней. По истеченіи этого срока, матеріалъ въ замерзшемъ состояніи, разотланъ былъ тонкимъ слоемъ въ помѣщеніи лабораторіи и послѣ оттаиванья, подвергнутъ былъ обработкѣ водой.

Анализъ водной вытяжки далъ слѣдующія цифры:

Перешло въ водный растворъ въ %	
	%
SiO_2	16,36
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	20,18
CaO	76,44
MgO	84,37
K_2O	57,16
Na_2O	40,06
P_2O_5	51,13
SO_3	49,16

Весьма крупныя количества всѣхъ зольныхъ соединений, переходяція въ водную вытяжку, показываютъ намъ, что операція попеременнаго замораживанія и оттаиванія

того или другого растительного объекта влечет за собой энергичнѣйшій распадъ органическихъ веществъ съ образованіемъ весьма большого количества минеральныхъ, водно-растворимыхъ соединений. Рѣзкія колебанія t° , такимъ образомъ, какъ бы „распатываютъ“ прочные химическіе комплексы, и способствуютъ распаденію ихъ на менѣ сложные, но болѣе подвижныя соединенія ¹⁾.

Фактъ этотъ даетъ намъ возможность предположить, что, напр., весеннія талыя воды, приходя въ соприкосновеніе съ опавшими прошлой осенью листьями, и другими отмершими растительными остатками, выносятъ изъ послѣднихъ въ первые же дни весьма большое количество водно-растворимыхъ, органическихъ и минеральныхъ, соединений, и что въ теченіе послѣдующихъ мѣсяцевъ атмосферной водѣ приходится имѣть дѣло съ совершенно обѣднѣнными, выщелоченными уже, объектами. Этотъ фактъ объясняетъ намъ, между прочимъ, и то извѣстное явленіе, почему листья древесныхъ породъ, даже опавшіе очень поздно, непосредственно передъ наступленіемъ морозовъ и выпаденіемъ снѣга (слѣдовательно, съ осени еще не разлагавшіеся), послѣ схода снѣга являются обыкновенно дряблыми, легко рвущимися и пр. — все указываетъ на то, что они претерпѣли въ своей химической конституціи глубокія измѣненія. Наконецъ, цвѣтъ стекающихъ, напр., въ лѣсу, весеннихъ водъ, своей окраской показываетъ намъ, какія большія количества различныхъ соединений выщелочены ими изъ отмершихъ растительныхъ остатковъ.

¹⁾ Г. Ковшовъ („Ботанич. Журн.“, 1906, № 5), примѣняя выработанный проф. Палладинымъ способъ замораживанія, нашелъ, что протеолитическая энзима при замораживаніи не разрушается, и что послѣ оттаиванія наблюдается въ убитыхъ морозомъ частяхъ растений весьма энергичный распадъ бѣлковыхъ веществъ.

II) Вліяніє різничої степені увлажненія на процеси минерализаціи растителныхъ остатковъ
(студ. В. Аболенскій).

Опыты были организованы совершенно аналогично выше-описаннымъ. Объектомъ для наблюденій служилъ тотъ же матеріалъ (листья клёна). Болѣе или менѣе разработанныя данныя имѣются у насъ пока по отношенію лишь къ двумъ крайнимъ факторамъ: въ сосудѣ I изучалось вліяніе избыточнаго увлажненія, въ сосудѣ II — вліяніе недостаточнаго увлажненія (при одной и той же t°). Съ этой цѣлью въ сосудѣ I поддерживалась все время опытовъ влажность, равная полной влагоемкости матеріала ($= 484\%$), что создавало почти совершенное „заболачиваніе“ послѣдняго, въ сосудѣ II поддерживалась влажность, равная $\frac{1}{10}$ этой влагоемкости.

Оба сосуда находились при комнатной t° ($15-19^{\circ} C$).
Результаты сведены въ слѣдующихъ таблицахъ:

Сосудъ I (полная влагоемкость).

	Перешло въ водный растворъ въ %.					
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O
Изъ листьевъ клёна, разлагавш. въ теченіе 15 дней .	3,74	10,05	5,31	12,97	16,64	31,87
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	2,62	8,53	4,50	10,42	10,24	23,77
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	3,77	3,51	2,44	11,80	5,04	10,79
Еще черезъ 20 дней перешло въ растворъ	3,74	2,13	2,27	12,51	1,77	8,38
Всего за 65 дней	13,87	24,22	14,52	47,70	33,69	74,81

Сосудъ II ($1/10$ влагоемкости).

	Перешло въ водный растворъ въ %.					
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O
Изъ листьевъ клёна, разлагавш. въ теченіе 15 дней .	2,00	6,77	3,47	12,86	21,73	27,57
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	1,09	4,51	3,03	8,80	15,21	25,10
Еще черезъ 15 дней перешло въ растворъ	1,09	3,64	2,65	7,93	6,67	10,05
Еще черезъ 20 дней перешло въ растворъ	1,53	2,76	1,24	7,17	3,33	8,27
Всего за 65 дней	5,71	17,68	10,39	36,76	46,94	70,99

Прежде чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы изъ данныхъ этихъ анализовъ — я считаю необходимымъ указать, что было бы большою ошибкой объяснять полученную разницу въ цифрахъ только тѣмъ, что въ одномъ случаѣ растительный матеріалъ разлагался энергичнѣй, въ другомъ — слабѣе. Дѣло въ томъ, что въ сосудѣ I-мъ, гдѣ матеріалъ находился все время опытовъ въ насыщенномъ водой состояніи — мы, въ сущности говоря, производили изъ него въ теченіе 65 дней непрерывную водную вытяжку, такъ какъ матеріалъ этотъ, какъ я и указалъ выше, находился все время въ „заболоченномъ“ состояніи ¹⁾. Принимая же во вниманіе, что время соприкосновенія воды съ растительнымъ матеріаломъ играетъ весьма существенную роль — въ смыслѣ непрерывнаго выщелачиванія ею все новыхъ и новыхъ порцій зольныхъ (и органическихъ) соединений изъ этого матеріала (Ramann), — мы должны были бы предвидѣть, что изъ сосуда I вода извлечетъ огромныя количества минеральныхъ соединений по сравненію съ сосудомъ II-ымъ, — тѣмъ болѣе, что растительный матеріалъ этого сосуда, находясь въ весьма неблагопріятныхъ условіяхъ

¹⁾ Въ природныхъ условіяхъ — явленіе это, конечно, самое естественное.

увлажненія, долженъ былъ бы минерализоваться очень слабо, что, такимъ образомъ, еще рѣзче должно было бы подчеркнуть указанную выше разницу.

Разница въ количествѣ переходящихъ въ растворъ минеральныхъ соединений описанными опытами, дѣйствительно, констатируется, — но такая сравнительно незначительная, которая, если мы примемъ во вниманіе всѣ только что высказанныя соображенія, даетъ намъ возможность, какъ мнѣ кажется, наоборотъ, утверждать, что въ условіяхъ заболоченности минерализація растительныхъ матеріаловъ вообще идетъ чрезвычайно медленнымъ темпомъ; въ нашемъ случаѣ — процессъ этотъ шелъ, вѣроятно, еще даже медленнѣй, чѣмъ въ условіяхъ недостаточнаго увлаженія, такъ какъ констатированную анализами разницу можно бы было пожалуй отнести на счетъ растворяющаго дѣйствія воды, бывшей въ соприкосновеніи съ растительнымъ объектомъ непрерывно въ теченіе 65 дней.

Опять-таки своеобразные результаты дала и въ описываемыхъ опытахъ фосфорная кислота. Въ то время какъ всѣ другія зольныя соединенія изъ сосуда I идутъ въ водный растворъ въ большихъ количествахъ, чѣмъ изъ сосуда II — фосфорная кислота оказывается снова какимъ-то образомъ закрѣпленной при томъ матеріалѣ, который разлагался въ условіяхъ насыщенія водой. (Изъ сосуда I-го — за всѣ 65 дней опыта P_2O_5 вымыто 33,69%, изъ сосуда II-го — значительно больше — 46,94%). Вѣроятно, и въ данномъ случаѣ фактъ этотъ надо объяснить вліяніемъ біологическихъ факторовъ — образованіемъ нерастворимыхъ нуклеиновыхъ и др. соединений, какъ результатъ жизнедѣятельности въ разлагающейся массѣ мельчайшихъ организмовъ. Почему фактъ этотъ наблюдается болѣе рѣзко именно въ условіяхъ „заболоченности“ матеріала, играютъ ли главную роль въ этомъ процессѣ какіе-либо опредѣленные анаэробные организмы и пр., — вопросы

эти мы оставляемъ пока открытыми. Болѣе детальное освѣщеніе изучаемыхъ процессовъ—мы откладываемъ до окончанія предпринятыхъ нами дальнѣйшихъ наблюденій надъ выясненіемъ вліянія возможно болѣе разнообразныхъ условій увлаженія растительныхъ остатковъ на процессы ихъ постепенной минерализаціи ¹⁾).

III) Вліяніе хлороформа на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ (студ. Н. Розовъ).

Когда мы рассматривали вліяніе различной t° на процессы отщепленія изъ разлагающейся массы водно-растворимыхъ минеральныхъ соединений, то обратили вниманіе на то обстоятельство, что въ оптимальныхъ условіяхъ разложенія— P_2O_5 оказывается какимъ-то образомъ закрѣпленной, и притомъ въ весьма большихъ количествахъ, при разлагающемся объектѣ. Въ объясненіе этого непонятнаго факта мы указали на возможность образованія въ разлагающейся массѣ нерастворимыхъ солей извести и желѣза, но главную причину готовы были видѣть въ процессахъ регенераціи сложныхъ нуклеиновыхъ образований въ тѣлѣ различныхъ микроорганизмовъ, въ изобиліи поселяющихся на разлагающемся объектѣ.

Чтобы провѣрить это предположеніе, а также выяснить одновременно вліяніе антисептиковъ на процессы отщепленія

¹⁾ Весьма возможно, что въ упомянутыхъ регенераціонныхъ явленіяхъ главное участіе принимали въ данномъ случаѣ различныя плѣсневые грибки, развитію которыхъ, какъ извѣстно, благопріятствуетъ кислая среда (см. напр., Н. Fischer—„Centralbl. für Bacteriol.“, Т. 22, с. 671). Жизнедѣятельности этихъ именно организмовъ надо, вѣроятно, приписать наличность синтетическихъ реакцій, наблюдаемыхъ нами въ условіяхъ избыточнаго увлажненія.

Сравнительно недавно—О. Treboux („Журн. Оп. Agr.“, 1906, стр. 301), на основаніи своихъ опытовъ, произведенныхъ въ Харьковск. Ботанич. Институтѣ, нашелъ, что и нѣкоторые водоросли способны пользоваться органическими кислотами, какъ единственнымъ источникомъ своего углерода.

изъ разлагающейся массы и другихъ зольныхъ соединеній — опыты были организованы слѣд. образомъ.

Клеверное сѣно, въ количествѣ 150 гр., въ размельченномъ состояніи, помѣщено было въ два стеклянныхъ объемистыхъ сосуда ¹⁾. Внѣшнія условія разложенія ($t^{\circ} = 37^{\circ}\text{C}$; влажность $= \frac{1}{2}$ влагоемкости) — были для обоихъ сосудовъ одни и тѣ же; но сосудъ II находился все время опытовъ въ соприкосновеніи съ хлороформомъ, что достигалось помѣщеніемъ въ стеклянный сосудъ, наполненный разлагающейся растительной массой, небольшой чашечки съ хлороформомъ, который, по мѣрѣ улетучиванія (сосудъ былъ закрытъ стеклянной пластинкой) возобновлялся путемъ частаго подливанія. Конечно, полнаго прекращенія биологическихъ процессовъ въ разлагающейся массѣ при такой постановкѣ опытовъ далеко не достигалось — особенно принимая во вниманіе ежедневное тарированіе этого сосуда, слѣдовательно его открываніе, приливаніе свѣжихъ порцій воды и т. д. Но извѣстная угнетенность биологическихъ процессовъ описанной операціей несомнѣнно достигалась.

Остальныя детали въ постановкѣ опытовъ — были аналогичны описаннымъ выше.

Влагоемкость клевернаго сѣна $= 280\%$.

Въ 1000 ч. сух. вещ. сѣна содержится въ граммахъ:

SiO_2	2,2276 гр.
$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	3,3595 „
CaO	15,6893 „
MgO	4,4773 „
K_2O	15,3135 „
Na_2O	3,2476 „
P_2O_5	2,8419 „
SO_2	6,6251 „

¹⁾ Сѣно было приобрѣтено на рынкѣ. Цвѣта оно было бурого, что указывало на то, что объектъ этотъ уже подвергался броженію. Такимъ образомъ, начальныя стадіи его разложенія остаются для насъ неизвѣстными. Этимъ же надо объяснить себѣ и сравнительно небольшое количество переходящихъ въ растворъ количествъ CaO и MgO .

Переходимъ къ анализамъ вытяжекъ изъ обоихъ сосудовъ:

Сосудъ I (безъ хлороформа).

	Перешло въ водный растворъ въ %.							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	P_2O_5	SO_3
Изъ клев. сѣна, разлагавш. въ теченіе 14 дней . .	5,12	4,69	13,05	20,39	40,72	50,75	6,56	23,60
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	5,23	17,26	5,97	6,88	12,76	27,67	1,35	5,80
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	4,76	слѣды	2,53	3,66	7,52	12,68	1,97	3,68
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	5,45	0,53	2,19	2,91	6,01	7,39	0,65	3,98
Всего за 56 дней опыта.	20,56	22,48	23,74	33,84	67,01	98,49	10,53	37,06

Сосудъ II (съ хлороформомъ).

	Перешло въ водный растворъ въ %.							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	P_2O_5	SO_3
Изъ клев. сѣна, разлагавш. въ теченіе 14 дней . .	3,59	5,36	11,38	16,52	38,40	49,88	38,36	16,77
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	1,79	16,52	9,99	17,31	18,16	25,65	28,27	10,19
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	5,24	0,75	6,96	10,44	12,67	15,74	14,24	4,73
Еще черезъ 14 дней перешло въ растворъ . .	3,25	1,29	3,61	6,11	4,55	6,18	6,55	4,06
Всего за 56 дней опыта.	13,87	23,92	32,94	50,38	73,78	97,45	87,42	35,75

Если мы будемъ сравнивать въ этихъ таблицахъ цифры анализовъ, относящіеся лишь къ первой вытяжкѣ, которая сдѣлана была, какъ мы знаемъ, спустя 14 дней отъ начала опыта, — то получимъ данныя, которыя можно было бы предвидѣть а priori, а именно: растительный объектъ, разлагавшійся въ присутствіи хлороформа, далъ, въ общемъ, меньшія количества воднорастворимыхъ зольныхъ соединений, и этотъ фактъ надо поставить въ логическую связь съ болѣе замедленнымъ ходомъ процессовъ распада этого объекта. Но если мы

пойдемъ дальше и обратимъ вниманіе на данныя анализы послѣдующихъ вытяжекъ и, особенно, на общія суммарныя количества отщепляющихся минеральныхъ продуктовъ въ обоихъ описанныхъ случаяхъ, то натолкнемся на совершенно неожиданныя заключенія: въ сосудѣ II (съ хлороф.)—количества CaO , MgO , (отчасти K_2O) и особенно P_2O_5 оказываются вымытыми въ весьма большихъ размѣрахъ (фосфорной кислоты, напр., оказалось въ этомъ сосудѣ по сравненію съ сосудомъ I-мъ—въ 8 разъ больше!), между тѣмъ какъ въ сосудѣ безъ хлороформа,—упомянутыя соединенія, наоборотъ, оказались въ известной своей части прочно закрѣпленными. Что касается полоторныхъ окисловъ, а также Na_2O и SO_3 , то количества ихъ въ обоихъ случаяхъ представляются намъ болѣе или менѣе одинаковыми. Наконецъ SiO_2 —является единственнымъ соединеніемъ, которое идетъ навстрѣчу нашимъ апіорнымъ предположеніямъ о болѣе энергичной и быстрой минерализаціи растительной массы, разлагающейся безъ участія обеззараживающихъ веществъ.

Конечно, самъ по себѣ фактъ довольно энергичной минерализаціи растительнаго матеріала въ сосудѣ II-мъ—несмотря на присутствіе хлороформа—не можетъ возбуждать особыхъ сомнѣній; мы знаемъ вѣдь, что распадъ органическаго вещества можетъ совершаться въ природѣ и подъ вліяніемъ однихъ физическихъ и химическихъ агентовъ, безъ участія микроорганизмовъ ¹⁾, а кромѣ того—условія самой операціи хлороформирования, примѣнявшейся въ описываемыхъ опытахъ, были таковы, что въ нашемъ случаѣ отнюдь не исключалась, какъ о томъ я говорилъ выше, возможность участія въ этихъ про-

¹⁾ См. данныя Wollny, Dehérain'a, Gayon'a, Костычева и др.

Необходимо указать, что съ развитіемъ современнаго ученія объ энзимахъ—все болѣе и болѣе необходимымъ является въ настоящее время коренной пересмотръ вопроса о вліяніи различныхъ внѣшнихъ факторовъ на процессы разложенія органическихъ остатковъ.

цессахъ и живыхъ дѣтелей (а только угнеталась). Принимая все это во вниманіе — фактъ постепеннаго отщепленія извѣстнаго количества минерализованныхъ продуктовъ изъ матеріала, находившагося въ сосудѣ II, намъ не долженъ казаться страннымъ. Но то обстоятельство, что въ этомъ случаѣ намъ придется констатировать значительно болѣе полную минерализацію, чѣмъ въ сосудѣ I-мъ (по крайней мѣрѣ по отношенію къ нѣкоторымъ соединеніямъ) — является довольно неожиданнымъ. Какихъ-либо особыхъ поясненій фактъ этотъ теперь однако не требуетъ; достаточнымъ разъясняющимъ обстоятельствомъ его является самая постановка описываемыхъ опытовъ: P_2O_5 , CaO , MgO (отчасти K_2O) закрѣплены при разлагающемся матеріалѣ, главнымъ образомъ, благодаря жизнедѣятельности, въ изобиліи поселяющихся на послѣднемъ, различныхъ мельчайшихъ организмовъ. ¹⁾ Въ виду совершенно идентичныхъ условій температуры, увлаженія и пр., въ которыхъ находились эти два сосуда — наиболѣе естественнымъ предположеніемъ неминусемо должна явиться мысль о болѣе энергичныхъ регенераціонныхъ явленіяхъ именно въ томъ сосудѣ, въ которомъ дѣятельность живыхъ агентовъ не была нарушена присутствіемъ хлороформа ²⁾. Въ частности—по отношенію къ P_2O_5 мы имѣемъ полное подтвержденіе того же факта, который мы уже видѣли въ описанныхъ выше опытахъ съ вліяніемъ различной t° на рассматриваемые процессы, поставленныхъ

¹⁾ Не отсутствіемъ ли этого „біологическаго“ поглощенія надо объяснить себѣ случаи повышенія плодородія почвъ при обработкѣ послѣднихъ хлороформомъ, сѣроуглеродомъ и пр.? См. М. Егоровъ „Къ вопросу о вліяніи CS_2 на почву и на растеніе“ („Журн. Оп. Агр.“, 1908).

²⁾ Фактъ одновременнаго закрѣпленія съ P_2O_5 и щелочно-земельныхъ основаній даетъ намъ возможность предполагать, что отчасти наблюдаемое явленіе связано и чисто-химическимъ реакціямъ (образованію въ разлагающейся массѣ нерастворимыхъ фосфорно-известковыхъ соединеній); но сравнивая степень закрѣпленія этихъ соединеній въ разлагающемся матеріалѣ съ тѣми громадными количествами, которыя характеризуютъ процессъ закрѣпленія P_2O_5 —мы должны признать, что химическимъ явленіямъ принадлежитъ въ данномъ случаѣ лишь частичная роль.

съ другимъ растительнымъ объектомъ при совершенно другихъ условіяхъ разложенія. Быть можетъ, — въ зависимости отъ различнаго состава микроскопической флоры ¹⁾ будутъ находиться и различные, съ точки зрѣнія количественной и качественной, процессы закрѣпленія при разлагающемся субстратѣ то одного, то другого элемента, и не всегда, такимъ образомъ, мы будемъ встѣчаться съ явленіемъ большаго закрѣпленія именно P_2O_5 , а не другихъ какихъ-либо соединений — это вопросъ будущихъ, болѣе детальныхъ изслѣдованій, — но намъ интересно въ данномъ случаѣ установить какъ общее положеніе лишь тотъ фактъ, что одновременно съ энергично-идущими процессами распада органическихъ остатковъ, а, слѣдовательно и весьма интенсивнаго выдѣленія при этихъ процессахъ CO_2 — какъ главнаго показателя этого распада, могутъ итти параллельно процессы закрѣпленія и перехода въ нерастворимое состояніе извѣстной части тѣхъ или другихъ зольныхъ продуктовъ, отщепляющихся, какъ результатъ усиленной минерализаціи, отъ разлагающагося матеріала ²⁾. Болѣе детальное изслѣдованіе даннаго вопроса представило бы собой весьма большой интересъ и для чисто агрономическихъ цѣлей: изученіе съ этой стороны, напр., процессовъ минерализаціи разлагающагося навоза, ближайшее знакомство съ судьбой образующихся въ немъ растворимыхъ минеральныхъ соединений и пр. — могло бы подвинуть насъ въ

¹⁾ Мнѣ много приходилось работать (для другихъ цѣлей) надъ микроскопическимъ изслѣдованіемъ различныхъ разлагающихся растительныхъ остатковъ и всегда то, что открывалъ микроскопъ, превышало всякія, самыя смѣлыя, ожиданія и предположенія — столь многочисленнымъ и разнообразнымъ представлялось всегда глазу микроскопическое населеніе этихъ субстратовъ.

²⁾ Случаи биологическаго закрѣпленія въ почвѣ, напр., нитратовъ, какъ результатъ также регенераціонныхъ явленій, указаны, между прочимъ, А. Ключаревымъ („О нитрифицирующей способности нормальныхъ почвъ“... etc.), Душечкинымъ („Къ вопросу о вымываніи нитратовъ изъ почвъ“... etc. — „Хозяйство“, 1910, № 30) и др.

рѣшеніи многихъ существенныхъ вопросовъ, связанныхъ съ этимъ комплексомъ, какъ удобрительнымъ матеріаломъ и т. д.

IV) Вліяніе различныхъ сочетаній температуры и влажности на процессы минерализаціи растительныхъ остатковъ.

Во II-ой главѣ настоящей работы, при разсмотрѣніи количествъ органическихъ водно-растворимыхъ соединений, отщепляющихся изъ различныхъ растительныхъ остатковъ,—нами изложены были опыты, въ которыхъ изучалось вліяніе на этотъ процессъ сочетанія различныхъ степеней увлаженія и t° . Тамъ мы обратили исключительное вниманіе именно на органическія соединения; что же касается минеральныхъ, то мы ограничились, сообразно поставленной задачѣ, приведеніемъ лишь суммарныхъ количествъ ихъ. Теперь мы можемъ остановиться на этихъ опытахъ болѣе подробно и обратить главное вниманіе уже на зольныя водно-растворимыя соединения. Въ качествѣ растительныхъ объектовъ служили намъ, какъ мы видѣли, листья березы, степное (ковыльное) сѣно и хвоя ели. Обстановка опытовъ и методъ наблюденій описаны во II главѣ. Напомню лишь, что въ I категоріи опытовъ растительные матеріалы разлагались въ условіяхъ *optim'*альной t° (около $38^{\circ}C$) и *optim'*альной влажности ($= \frac{1}{2}$ влагоемкости объекта). Въ категоріи II-ой—въ условіяхъ сравнительно низкой t° (5° — $7^{\circ}C$) и нѣсколько избыточнаго увлаженія ($=$ полной влагоемкости) и, наконецъ, въ III-ей категоріи—въ условіяхъ довольно высокой t° (около $25^{\circ}C$) и низкой влажности ($= \frac{1}{10}$ влагоемкости).

Одни матеріалы, въ опредѣленные сроки, промывались водой, что давало, такимъ образомъ, возможность слѣдить также и за постепеннымъ ходомъ ихъ минерализаціи, другіе, наоборотъ, все время опытовъ оставались безъ такой обработки, и водныя

вытяжки изъ нихъ сдѣланы были лишь разъ, по окончаніи опытовъ—для общаго суммарнаго представленія о степени минерализаціи растительныхъ объектовъ, находившихся въ различныхъ условіяхъ увлажненія и t° .

Мы рассмотримъ въ настоящее время данныя анализовъ, полученныя по отношенію къ листьямъ березы и къ степному сѣну. Что касается хвои ели, то результаты опытовъ съ ней получились нѣсколько неясные и дѣлать какія-либо опредѣленные заключенія изъ нихъ не представляется пока возможнымъ.

Переходимъ къ аналитическому матеріалу:

Въ 1.000 ч. сух. вѣщ. содержится (въ граммахъ).											
SiO_2	$\frac{Al_2O_3}{+Fe_2O_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3	Mn_2O_4	Cl	Сумма зольн. элем.	
листья березы . .	6,14	0,36	28,89	8,14	2,44	6,18	0,51	4,01	0,97	—	57,64
степное сѣно . .	16,49	0,24	16,75	7,12	5,09	12,56	0,10	1,88	0,06	2,43	62,72

Дѣйствіе воды на свѣжіе, неподвергавшіеся разложенію, объекты:

Изъ 1.000 ч. сух. вѣщ. перешло въ растворъ (въ граммахъ).											
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3	Mn_2O_4	Cl	Сумма зольн. элем.
листья березы . .	0,0859	слѣды	1,6525	1,3862	0,2222	0,7422	слѣды	0,7751	слѣды	—	4,8641
степного сѣна . .	0,5078	слѣды	0,5762	0,8131	0,2443	1,0751	—	0,1932	—	сл.	3,4097

Выражая полученныя цифры въ $\%$, имѣемъ:

Перешло въ растворъ (въ $\%$).										
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3	Mn_2O_4	Cl
листья березы . .	1,40	слѣды	5,72	17,03	9,11	12,01	слѣды	19,33	слѣды	—
степного сѣна . .	3,08	слѣды	3,44	11,42	4,80	8,56	—	10,28	—	слѣды

I. Опыты съ разлагающимися листьями березы.

А) $T^{\circ} = 38^{\circ} C$; влажность = $\frac{1}{2}$ влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вещ. перешло въ растворъ (въ грамм.).							
	SiO_2	$\frac{Al_2O_3}{+Fe_2O_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	0,2468	0,0221	11,0417	3,5083	0,2710	1,2563	0,0613	1,0474
2. Черезъ 30 дней перешло еще	0,1927	0,0151	1,6207	0,5893	0,0329	0,6328	0,0112	0,1527
3. Черезъ 45 дней перешло еще	0,3198	0,0074	0,9447	0,1652	0,0258	0,3170	0,0262	0,2061
4. Черезъ 65 дней перешло еще	0,3100	0,0111	0,9013	0,1961	0,0344	0,1439	0,0057	0,0874
5. Черезъ 88 дней перешло еще	0,1909	0,0083	0,2542	0,1828	0,0197	0,1297	0,0053	0,1291
Всего за 88 дней перешло въ растворъ . .	1,2602	0,0640	14,7626	4,6217	0,3838	2,5297	0,1097	1,6227

Или, выражая полученные цифры, въ %:

	Перешло въ растворъ (въ %).							
	SiO_2	$\frac{Al_2O_3}{+Fe_2O_3}$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	4,02	6,14	38,22	43,10	11,11	20,33	12,02	26,12
2. Черезъ 30 дней перешло еще	3,14	4,21	5,61	7,24	1,35	11,05	2,21	3,81
3. Черезъ 45 дней перешло еще	5,21	2,06	3,27	2,03	1,06	5,13	5,15	5,14
4. Черезъ 65 дней перешло еще	5,05	3,11	3,12	2,41	1,41	2,33	1,13	2,18
5. Черезъ 88 дней перешло еще	3,11	2,31	0,88	2,00	0,81	2,10	1,05	3,22
Всего за 88 дней перешло въ растворъ . .	20,53	17,83	51,10	56,78	15,74	40,94	21,56	40,47

За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала, непромываемаго водой:

	Въ грамм.	Въ %
SiO_2	2,3596	38,43
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,1903	36,22
CaO	26,5874	92,03
MgO	7,2779	89,41
P_2O_5	1,5533	63,66

K_2O	3,3415	54,07
Na_2O	0,2149	42,14
SO_3	1,9452	43,51

В) $T = 5^\circ - 7^\circ C$; влажность = полной влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вѣщ. перешло въ растворъ (въ грамм.).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	0,1577	0,0113	11,5877	4,0864	0,4130	0,9473	0,0205	0,8954
2. Черезъ 30 дней перешло еще.	0,1246	0,0122	2,3198	0,6609	0,1473	0,0444	0,0058	0,0565
3. Черезъ 45 дней перешло еще.	0,0558	0,0062	1,2480	0,2800	0,1956	0,0710	0,0308	0,1235
4. Черезъ 65 дней перешло еще.	0,1246	0,0057	2,0635	0,3540	0,1320	0,0809	0,0110	0,0709
5. Черезъ 88 дней перешло еще.	0,0681	0,0036	1,4502	0,4216	0,1659	0,0729	0,0114	0,0609
Всего за 88 дней перешло въ растворъ . .	0,5308	0,0390	18,6742	5,8029	1,0538	1,2165	0,0495	1,2072

Или, выражая эти цифры въ $\%$, получаемъ:

	П е р е ш л о в ъ р а с т в о р ъ (въ $\%$).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	2,57	3,15	40,11	51,43	16,93	15,33	4,03	22,33
2. Черезъ 30 дней перешло еще.	2,03	3,41	8,03	8,12	6,04	0,72	1,14	1,41
3. Черезъ 45 дней перешло еще.	0,91	1,73	4,32	3,44	8,02	1,15	0,17	3,08
4. Черезъ 65 дней перешло еще.	2,03	1,60	7,16	4,35	5,41	1,31	2,16	1,77
5. Черезъ 88 дней перешло еще.	1,11	1,02	5,02	5,18	6,80	1,18	2,25	1,52
Всего за 88 дней перешло въ растворъ. . .	8,65	10,91	64,64	72,52	43,20	19,69	9,75	30,11

а то же время перешло въ растворъ изъ материала, непромываемаго водой:

	Въ грамм.	Въ %
SiO_2	1,1052	18,00
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,1019	28,31
CaO	19,7116	68,23
MgO	6,2490	76,77
P_2O_5	1,1016	45,15
K_2O	2,5616	41,45
Na_2O	0,1174	23,03
SO_3	1,6092	40,13

С) $T = 25^\circ C$; влажность = $1/10$ влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вещ. перешло въ растворъ (въ грамм.)							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	0,1326	0,0090	12,1655	4,4224	0,3447	0,8719	0,0214	0,934
2. Черезъ 30 дней перешло еще.	0,0693	0,0097	1,5687	0,3019	0,2447	0,0352	0,0041	0,026
3. Черезъ 45 дней перешло еще.	0,0540	0,0041	2,0858	0,2601	0,1517	0,0389	0,0102	0,045
4. Черезъ 65 дней перешло еще.	0,0865	0,0374	0,5864	0,5217	0,0222	0,0315	0,0053	0,049
5. Черезъ 88 дней перешло еще.	0,1264	0,0076	1,7449	0,2450	0,1263	0,1507	0,0156	0,067
Всего за 88 дней перешло въ растворъ	0,4688	0,0378	18,1513	5,7514	0,9496	1,1282	0,0566	1,123

Выражая въ %:

	Перешло въ растворъ (въ %)							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 15 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	2,16	2,51	42,11	54,33	14,13	14,11	4,21	23,31
2. Черезъ 30 дней перешло еще.	1,13	2,70	5,43	3,71	10,03	0,57	0,81	0,6
3. Черезъ 45 дней перешло еще.	0,88	1,14	7,22	3,20	6,22	0,63	2,00	1,14
4. Черезъ 65 дней перешло еще.	1,41	2,08	2,03	6,41	3,37	0,51	1,05	1,2
5. Черезъ 88 дней перешло еще.	2,06	2,13	6,04	3,01	5,18	2,44	3,07	1,6
Всего за 88 дней перешло въ растворъ	7,64	10,56	62,83	70,66	38,93	18,26	11,14	28,0

За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала, непромываемаго водой:

	Въ грамм.	Въ %
SiO_2	1,1801	19,22
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0968	26,89
CaO	19,4785	67,43
MgO	5,8054	71,32
P_2O_5	0,9779	40,08
K_2O	2,3014	37,24
Na_2O	0,0939	18,43
SO_3	1,4985	37,37

II. Опыты съ разлагающимися степеннымъ съномъ.

А) $T = 38^\circ C$; влажность $= \frac{1}{2}$ влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вѣщ. перешло въ растворъ (въ грам.).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	0,8475	0,0202	4,4086	2,4321	0,3135	1,6428	0,0103	0,2846
2. Черезъ 36 дней перешло еще.	0,6958	0,0049	0,7386	0,6436	0,0727	0,4031	0,0011	0,0785
3. Черезъ 51 день перешло еще.	0,6711	0,0048	0,5058	0,1431	0,0549	0,4282	0,0037	0,0757
4. Черезъ 66 дней перешло еще.	0,2028	0,0035	0,5360	0,2513	0,0646	0,5551	0,0011	0,0438
5. Черезъ 95 дней перешло еще.	0,1170	0,0055	0,4405	0,1011	0,0666	0,7548	0,0020	0,0453
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	2,5342	0,0389	6,6295	3,5712	0,5723	3,7840	0,0182	0,5279

Выражая полученные цифры въ %:

	Перешло въ растворъ (въ %).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	5,14	8,42	26,32	34,16	6,16	13,08	10,37	15,14
2. Черезъ 36 дней перешло еще.	4,22	2,08	4,41	9,04	1,43	3,21	1,12	4,18
3. Черезъ 51 день перешло еще.	4,07	2,00	3,02	2,01	1,08	3,41	3,71	4,03
4. Черезъ 66 дней перешло еще.	1,23	1,47	3,20	3,53	1,27	4,42	1,12	2,33
5. Черезъ 95 дней перешло еще.	0,71	2,32	2,63	1,42	1,31	6,01	2,04	2,41
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	15,37	16,29	39,58	50,16	11,25	30,13	18,36	28,09

За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала, неуплотняемого водой:

	Въ грамм.	Въ %
SiO_2	2,8247	17,33
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0538	22,42
CaO	12,2509	73,14
MgO	5,4418	76,43
P_2O_5	2,5078	49,27
K_2O	4,8242	38,41
Na_2O	0,0260	26,02
SO_2	0,7527	40,04

В) $T^\circ = 5-7^\circ C$; влажность=полной влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вещ. перешло въ растворъ (въ грамм.).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_2
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ	0,6628	0,0077	5,8809	2,7860	0,6118	1,2710	0,0031	0,2185
2. Черезъ 36 дней перешло еще	0,1170	0,0079	1,0569	0,7290	0,3634	0,2951	0,0022	0,0278
3. Черезъ 51 день перешло еще	0,1055	0,0052	1,0117	0,3866	0,3064	0,3026	0,0031	0,0396
4. Черезъ 66 дней перешло еще	0,3347	0,0024	0,6901	0,2285	0,1735	0,2022	—	0,0268
5. Черезъ 95 дней перешло еще	0,1418	0,0048	0,9396	0,4293	0,2906	0,3768	0,0020	0,0675
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	1,3618	0,0280	9,5792	4,5594	1,7457	2,4477	0,0104	0,4002

Выражая полученные цифры въ %:

	Перешло въ растворъ (въ %).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_2
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ	4,02	3,24	35,11	39,13	12,02	10,12	3,15	13,22
2. Черезъ 36 дней перешло еще	0,71	3,32	6,31	10,24	7,14	2,85	2,21	1,43
3. Черезъ 51 день перешло еще	0,64	2,18	6,04	5,43	6,02	2,41	3,17	2,11
4. Черезъ 66 дней перешло еще	2,08	1,04	4,12	3,21	3,41	1,61	—	1,43
5. Черезъ 95 дней перешло еще	0,86	2,02	5,61	6,03	5,71	3,00	2,08	3,06
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	8,26	11,80	57,19	64,04	34,30	19,49	10,61	21,30

За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала, непроницаемаго водой:

	Въ грам.	Въ %
SiO_2	2,0315	12,32
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0457	19,05
CaO	10,7937	64,44
MgO	4,7974	67,38
P_2O_5	1,9550	38,41
K_2O	2,5207	20,07
Na_2O	0,0194	19,45
SO_3	0,5482	29,16

С) $T^\circ = 25^\circ C$; влажность = $\frac{1}{10}$ влагоемкости объекта.

	Изъ 1.000 ч. сух. вѣщ. перешло въ растворъ (въ грам.).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	0,6793	0,0055	5,4320	2,5916	0,5665	1,2760	0,0031	0,2280
2. Черезъ 36 дней перешло еще.	0,1352	0,0082	0,9396	0,5788	0,3262	0,1419	0,0030	0,0195
3. Черезъ 51 день перешло еще.	0,0923	0,0049	1,2009	0,5275	0,4087	0,1796	0,0014	0,0266
4. Черезъ 66 дней перешло еще.	0,0626	0,0072	0,5876	0,4371	0,3685	0,3039	0,0081	0,0409
5. Черезъ 95 дней перешло еще.	0,1500	0,0051	1,0552	0,5062	0,2804	0,1298	0,0021	0,0197
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	1,1194	0,0309	9,1653	4,6412	1,9503	2,0307	0,0127	0,3347

Или, выражая полученные цифры въ %:

	Перешло въ растворъ (въ %).							
	SiO_2	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	CaO	MgO	P_2O_5	K_2O	Na_2O	SO_3
1. Черезъ 19 дней отъ начала опыта перешло въ растворъ.	4,12	2,32	32,43	36,40	11,13	10,16	3,16	12,13
2. Черезъ 36 дней перешло еще.	0,82	3,43	5,61	8,13	6,41	1,13	3,01	1,04
3. Черезъ 51 день перешло еще.	0,56	2,05	7,17	7,41	8,03	1,43	1,43	1,42
4. Черезъ 66 дней перешло еще.	0,38	3,01	3,21	6,14	7,24	2,42	3,16	2,18
5. Черезъ 95 дней перешло еще.	0,91	2,16	6,30	7,11	5,51	1,03	2,17	1,05
Всего за 95 дней перешло въ растворъ	6,79	12,97	54,72	65,19	38,32	16,17	12,93	17,82

За то же время перешло въ растворъ изъ матеріала, непромываемаго водой:

	Въ грамм.	Въ %
SiO_2	2,0365	12,35
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$.	0,0412	17,19
CaO	10,2024	60,91
MgO	4,5689	64,17
P_2O_5	2,0013	39,32
K_2O	2,2243	17,71
Na_2O	0,0154	15,42
SO_4	0,5510	29,31

Попробуемъ теперь сдѣлать изъ вышеприведенныхъ аналитическихъ данныхъ нѣкоторыя заключенія и обобщенія:

1) Обращая прежде всего вниманіе на то количество минеральныхъ соединений, которое переходитъ въ водную вытяжку изъ свѣжихъ, неподвергавшихся еще разложенію, растительныхъ остатковъ, — мы можемъ видѣть, что взятые для опытовъ объекты содержать въ себѣ такихъ водно-растворимыхъ соединений довольно значительное количество. Для бѣльшей наглядности, представимъ эти цифры въ болѣе конкретной формѣ, подобно тому, какъ мы сдѣлали это по отношенію къ соединеніямъ органическаго характера (гл. II).

Мы видѣли (см. гл. I), что ежегодный отпадъ листьвъ въ лиственныхъ насажденіяхъ можно, согласно Ебергмауеру, считать равнымъ приблизительно 4182 кгг. на гектаръ.

Въ этихъ мертвыхъ растительныхъ остаткахъ будетъ, слѣдовательно, заключаться такое количество водно-растворимыхъ соединений (въ круглыхъ цифрахъ) ¹⁾:

SiO_2	около 0,4 кгг. на 1 десятину.
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	" — " " "
CaO	" 7 " " "
MgO	" 6 " " "
P_2O_5	" 1 " " "
K_2O	" 3 " " "
Na_2O	" — " " "
SO_4	" 3,5 " " "

¹⁾ Предполагая, что мы имѣемъ дѣло съ чистымъ березовымъ насажденіемъ.

Принимая, далѣе, урожай степныхъ травъ равнымъ, въ среднемъ, 3500 kgr. на 1 дес. (возд. — сух.) — мы можемъ видѣть, что первыми же осенними дождями въ почву можетъ вымываться изъ нихъ слѣдующее количество различныхъ зольныхъ веществъ:

SiO_2	около 1,8 kgr. на 1 десятину.
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	" — " " "
CaO	" 2 " " "
MgO	" 3 " " "
P_2O_5	" 0,8 " " "
K_2O	" 4 " " "
Na_2O	" — " " "
SO_4	" 0,8 " " "

Не забудемъ, что вышеприведенныя цифры характеризуютъ лишь то количество минеральныхъ соединений въ данныхъ растительныхъ остаткахъ, которое отдается уже первымъ порціямъ атмосферныхъ осадковъ свѣжимъ, неподвергавшимся разложенію, матеріаломъ. Послѣдующее же дѣйствіе осадковъ на начавшіе уже разлагаться объекты будетъ сопровождаться, какъ мы видѣли это выше, несравненно, конечно, болѣе энергичнымъ выносомъ большинства заключающихся въ этихъ остаткахъ зольныхъ веществъ.

Кромѣ того, въ первомъ изъ разсматриваемыхъ случаевъ, мы не принимаемъ совершенно во вниманіе ту, часто богатѣйшую, растительность, которая ютится подъ пологомъ древесныхъ породъ, и которая представляетъ собой, конечно, также весьма большой источникъ тѣхъ же соединений; во второмъ — игнорируемъ корневую систему, которая, какъ мы знаемъ изъ нашихъ прежнихъ опытовъ, является именно наиболѣе богатымъ источникомъ удобоподвижныхъ минеральныхъ (и органическихъ) соединений. Эти соображенія заставляютъ насъ признать, что въ естественныхъ условіяхъ, процессъ вымыванія водно-растворимыхъ минеральныхъ соединений въ почву изъ отмершихъ растительныхъ остатковъ совершается въ гораздо

болѣе обширномъ масштабѣ, чѣмъ то представляютъ наши вышеприведенныя цифры. Прибавимъ къ сказанному, что процессы эти идутъ регулярно, изъ года въ годъ, и, суммируясь, дѣйствительно, должны быть въ силу этого признаны однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ почвообразованія: достаточно хотя бы указать на возможность, въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, качественного и количественного перераспределенія при этомъ составныхъ частей почвы по различнымъ горизонтамъ, вызываемаго указанными выше, періодически повторяющимися, процессами вымыванія въ нее растворимыхъ зольныхъ продуктовъ. Качественное перераспределение надо понимать въ томъ смыслѣ, что растительный организмъ кислотными выдѣленіями своихъ корней можетъ переводить въ свое тѣло цѣлый рядъ трудно-растворимыхъ, или даже совершенно нерастворимыхъ въ водѣ минеральныхъ соединений почвы, послѣ же своей смерти возвращать ихъ въ извѣстной части, съ первыми же дождями, обратно почвѣ, — но уже въ видѣ легко-подвижныхъ, растворимыхъ формъ. Съ этой точки зрѣнія, роль растительности въ процессахъ выѣтриванія, къ сожалѣнію, совершенно еще не была подвергнута учету. Количественное же перераспределение составныхъ частей почвы по различнымъ ея горизонтамъ, можетъ имѣть мѣсто въ природныхъ условіяхъ уже въ силу того, что, напр., тѣ растенія, которыя извлекаютъ себѣ питательныя вещества изъ болѣе глубокихъ слоевъ почвы, послѣ своего отмиранія, обогащаютъ ими, главнымъ образомъ, именно верхніе горизонты послѣдней. Сочетываясь обычно вмѣстѣ, оба упомянутыхъ процесса могутъ внести, въ короткій сравнительно срокъ, въ качественный и количественный составъ почвы глубокія измѣненія.

Если, напр., представить себѣ такой случай, что питательныя вещества, извлекаемые длиннокорными растеніями изъ глубокихъ горизонтовъ почвы и накаплиющіяся, послѣ отмиранія растительности, въ болѣе поверхностныхъ, не будутъ

въ состояніи снова достигнуть глубокихъ слоевъ почвы — въ силу-ли поглотительной способности послѣдней, или въ силу опредѣленныхъ физическихъ свойствъ ея (напр., сильной плотности), или, наконецъ, въ силу тѣхъ или другихъ метеорологическихъ условій (сильнаго испаренія выпадающихъ осадковъ, малаго количества ихъ и пр.), то мы можемъ встрѣтиться въ природѣ съ такимъ случаемъ, когда данная растительность, спустя извѣстный промежутокъ времени, будетъ вымирать и гибнуть — въ силу подготавлиаемаго ею самою обѣднѣнія глубокихъ горизонтовъ почвы тѣми веществами, которыя являются для нея необходимыми, и уступать мѣсто уже другимъ растительнымъ формаціямъ.

Къ такому именно объясненію прибѣгъ я въ 1906 г., когда высказалъ свое предположеніе объ истинныхъ причинахъ усыхания и поголовной гибели Велико-Анадольскихъ лѣсныхъ посадокъ ¹⁾. Здѣсь, конечно, не мѣсто входить въ подробное рассмотрѣніе даннаго частнаго вопроса. Это отвлекло-бы насъ отъ главнаго предмета настоящаго изложенія. Я ограничусь только питированіемъ основныхъ выводовъ, полученныхъ мною въ указанной области; они явятся не лишней иллюстраціей ко всѣмъ тѣмъ соображеніямъ, которыя только что были нами высказаны по поводу возможной роли мертвыхъ растительныхъ остатковъ въ процессахъ качественного и количественнаго перераспредѣленія удобоусвояемыхъ питательныхъ веществъ по различнымъ горизонтамъ почвы.

Выводы эти слѣдующіе: на основаніи произведенныхъ мною химическихъ анализовъ почвъ и грунтовъ Велико-Анадольскаго Лѣса и сосѣдней степи надо предположить, что одной изъ воз-

¹⁾ „Химическія свойства почвъ и грунтовъ Велико-Анадольскаго Лѣсничества въ связи съ гибелью лѣсныхъ посадокъ“ („Труды опытныхъ Лѣсничествъ“, 1907); см. также „Журн. Оп. Агр.“, 1908 г. („Исслѣдованія въ области изученія причинъ усыханія искусственныхъ лѣсныхъ насажденій въ степи“).

можныхъ причинъ гибели, въ извѣстномъ возрастѣ, искусственныхъ насажденій является крайне незначительное количество (а иногда и полное отсутствіе) въ глубокихъ горизонтахъ почвы P_2O_5 , и N (частью и K_2O). Явленіе это, какъ показали соответствующія изслѣдованія, представляется явленіемъ вторичнымъ, вызываемымъ въ степныхъ грунтахъ уже поселившимся лѣсомъ, и наблюдается лишь въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ, въ силу-ли особаго рельефа, или въ силу особыхъ физическихъ свойствъ почвы и грунта, или, наконецъ, въ силу особыхъ метеорологическихъ условій, можно ожидать присутствія „мертвого горизонта иссушенія“. Явленіе это представляетъ собой результатъ систематическаго, ежегоднаго истощенія лѣсомъ питательныхъ веществъ глубокихъ горизонтовъ почвы: отнимая ежегодно отъ послѣднихъ громадные количества питательныхъ веществъ, лѣсной массивъ часть ихъ скопляетъ въ своей листвѣ; послѣдняя, съ окончаніемъ вегетаціоннаго періода, опадаетъ на поверхность почвы, унося съ собой весьма значительное количество различныхъ зольныхъ (и органическихъ, конечно) составныхъ частей. Эти послѣднія, въ извѣстной своей части, обратно вымываются въ почвенные горизонты. Въ тѣхъ районахъ, гдѣ сквозного промачиванія грунта нѣтъ („мертвый горизонтъ иссушенія“ Высоцкаго), тамъ всѣ эти продукты вымываются лишь до опредѣленной границы, не достигая глубоко распространяющихся частей корня. Въ этомъ случаѣ мы встрѣчаемся съ явленіемъ ежегодно увеличивающагося истощенія глубокихъ горизонтовъ почвы, влекущимъ за собой неизбежно и гибель лѣсныхъ насажденій. Тѣ-же пункты, гдѣ по тѣмъ или другимъ условіямъ, можно ожидать сквозного промачиванія (вершины впадинокъ, котловинки и пр.) мы должны признать лѣсопригодными: тамъ лѣсной массивъ, истощая ежегодно глубокіе горизонты почвы питательными веществами, самъ-же себя ежегодно, такъ сказать, и удобряетъ. Аналогичный процессъ мы наблюдаемъ въ лѣсной и лѣсо-степной области.

Разсмотрѣнное явленіе гибели искусственныхъ лѣсонасаженій въ степи даетъ намъ, такимъ образомъ, одинъ изъ рѣзкихъ примѣровъ, иллюстрирующихъ значеніе въ жизни растений водно-растворимыхъ зольныхъ соединений, содержащихся въ отмирающихъ растительныхъ остаткахъ.

Теперь вернемся къ цифрамъ нашихъ анализовъ, приведенныхъ выше и займемся тѣми минеральными соединениями, которыя выщелачиваются водой уже изъ разлагающихся при различныхъ условіяхъ растительныхъ матеріаловъ.

2) Какимъ образомъ отражаются на процессахъ отщепленія воднорастворимыхъ зольныхъ соединений изъ растительныхъ остатковъ различныя комбинаціи увлаженія и тепла?

Во II-й главѣ настоящей работы, рассматривая количества органическихъ соединений, переходящихъ въ водный растворъ при различныхъ условіяхъ разложенія растительной массы—мы одновременно указали на общія суммарныя количества также и минеральныхъ веществъ, отщепляющихся при этихъ процессахъ, и на основаніи всѣхъ этихъ данныхъ старались такъ или иначе нарисовать себѣ общую схему процессовъ разложенія взятыхъ для опыта объектовъ. Однако, эти общія суммарныя количества переходящихъ въ растворъ зольныхъ соединений не могутъ, конечно, дать намъ возможности болѣе глубоко и детально вникнуть въ самое теченіе изучаемаго процесса.

Приведенные выше анализы водныхъ вытяжекъ даютъ намъ возможность разсмотрѣть интересующій насъ вопросъ именно по отдѣльнымъ соединеніямъ.

А) Обратимъ прежде всего вниманіе на тѣ растительные матеріалы, которые систематически, черезъ извѣстные промежутки времени, промывались водой. И по отношенію къ березовой листьѣ и къ сѣну—мы встрѣчаемся здѣсь съ одной и той-же характерной картиной: весьма сильнымъ

сравнительно выщелачиваніемъ въ опытахъ I-й категоріи ($t=38^{\circ}$; влажность $=\frac{1}{2}$ влагоемкости) SiO_2 , полуторныхъ окисловъ, SO_3 , Na_2O и K_2O по сравненію съ опытами II и III категорій и весьма ощутительнымъ, наоборотъ, закрѣпленіемъ P_2O_5 а также и щелочно-земельныхъ окисловъ. Сравнивая-же между собою данныя, полученные по отношенію къ двумъ послѣднимъ категоріямъ (II и III) — мы подмѣчаемъ вообще нѣсколько большее количество всѣхъ водно-растворимыхъ соединений именно въ условіяхъ низкой t° и полной влагоемкости (кат. II) по сравненію съ условіями другого опыта, шедшаго при болѣе высокой t° ($25^{\circ} C$) и болѣе низкой влажности ($=\frac{1}{10}$ влагоемкости). Сказанное относится также къ P_2O_5 и щелочно-земельнымъ окисламъ.

Такимъ образомъ, въ ортим'альныхъ условіяхъ разложенія, растительный матеріалъ отдавалъ водѣ весьма большія количества минеральныхъ соединений, что указываетъ на энергично шедшіе при этомъ процессы распада органическихъ веществъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этихъ-же условіяхъ совершается въ разлагающейсѣ массѣ, оказывается, и наиболѣе энергичное закрѣпленіе P_2O_5 и щелочно-земельныхъ окисловъ. Останавливаясь на этомъ фактѣ мы уже не будемъ: мы его разбирали нѣсколько выше. Укажу только, что въ описываемыхъ сейчасъ опытахъ мы встрѣчаемся еще съ однимъ вѣсскимъ доказательствомъ въ пользу именно біологическаго характера этого интереснаго явленія.

Что касается вопроса, какимъ образомъ отразились на количествахъ переходящихъ въ растворъ зольныхъ соединений — двѣ другихъ комбинаціи условій тепла и увлаженія, то, какъ мы видѣли, на основаніи нѣсколько большихъ количествъ упомянутыхъ соединений въ опытахъ II-ой категоріи (низкая t° и полная влагоемкость), можно было-бы предположить о болѣе энергичномъ въ этихъ условіяхъ ходѣ распада органическихъ веществъ, чѣмъ въ условіяхъ болѣе высокой t° ($=25^{\circ} C$) и

низкой влажности ($= 1/10$ влагоемкости). Но едва-ли такое предположеніе являлось бы правильнымъ. Какъ я на это указалъ нѣсколько выше (при разсмотрѣніи вопроса о вліяніи различной влажности на процессы минерализаціи), — доводя растительный матеріалъ до полной влагоемкости, мы создаемъ весьма благопріятныя условія для прямого непосредственнаго растворенія его водой, такъ какъ при этомъ получаются условія почти совершенной заболоченности. Факторъ этотъ, при обсужденіи даннаго вопроса, нельзя не принимать во вниманіе. И съ этой-то точки зрѣнія—мы должны скорѣй удивляться тому ничтожному сравнительно увеличенію растворимыхъ соединений, которое отърывается анализомъ въ водныхъ вытяжкахъ опытовъ II-ой категоріи, а потому можемъ съ большою долей вѣроятія предположить, наоборотъ, о болѣе угнетенномъ ходѣ процессовъ минерализаціи въ этихъ условіяхъ — сравнительно съ условіями болѣе высокой t° и болѣе низкой влажности. Въ противномъ случаѣ — болѣе энергичный ходъ процессовъ минерализаціи, суммируясь съ непосредственнымъ растворяющимъ дѣйствіемъ воды, долженъ былъ-бы дать совершенно иную картину — въ смыслѣ весьма большой разницы въ количествѣ водно-растворимыхъ зольныхъ соединений въ обоихъ случаяхъ. Что касается въ частности P_2O_5 и щелочно-земельныхъ окисловъ, показавшихъ такое интересное соотношеніе въ опытахъ I категоріи, то въ данномъ разбираемомъ случаѣ по этому вопросу надо дать отвѣтъ отрицательный: въ опытахъ II и III категоріи соединенія эти подчиняются участи другихъ минеральныхъ соединений, и о большемъ или меньшемъ закрѣпленіи ихъ въ томъ или другомъ случаѣ говорить не приходится. Это впрочемъ и понятно, если вспомнить, въ какихъ неблагопріятныхъ (для біологическихъ процессовъ) условіяхъ находился разлагающійся растительный матеріалъ: съ одной стороны

низкая t° и почти полная заболоченность ¹⁾, съ другой—довольно благоприятныя условія тепла, но крайне низкая влажность.

В) Если мы теперь обратимъ вниманіе на анализы, относящіеся къ тѣмъ растительнымъ матеріаламъ, которые водой въ теченіе всего времени опытовъ не промывались, то, сравнивая цифры этихъ послѣднихъ опытовъ съ соотвѣтствующими цифрами только что разобранныхъ выше данныхъ, мы прежде всего констатируемъ тотъ фактъ, что объекты, непромываемые водой, дали въ конечномъ результатѣ гораздо большія количества растворимыхъ въ водѣ минеральныхъ соединеній. Этотъ фактъ одинаково повторяется во всѣхъ трехъ категоріяхъ опытовъ и по отношенію къ обоимъ взятымъ растительнымъ матеріаламъ. Такимъ образомъ, и въ описанныхъ опытахъ, шедшихъ притомъ при довольно разнообразныхъ внѣшнихъ условіяхъ—мы снова видимъ подтвержденіе того факта, что въ условіяхъ продолжительнаго соприкосновенія продуктовъ разложенія между собою и съ разлагающимся матеріаломъ—процессъ минерализаціи органическихъ веществъ идетъ значительно энергичнѣй и глубже, чѣмъ въ условіяхъ систематическаго промыванія разлагающагося матеріала водой, когда, слѣдовательно, продукты этого разложенія все время выходятъ изъ среды взаимодѣйствія другъ съ другомъ и съ разлагающимся матеріаломъ. Одна изъ возможныхъ причинъ такого явленія, какъ мы знаемъ, заключается въ томъ, что при начавшемся разложеніи растительнаго матеріала, вода, въ первые же періоды, извлекаетъ изъ послѣдняго весьма большія количества основаній (главнымъ образомъ, CaO и MgO) и, такимъ образомъ, способствуетъ

¹⁾ Если въ описанныхъ нѣсколько выше опытахъ студ. Аболенскаго мы замѣчали нѣкоторое закрѣпленіе P_2O_5 и въ условіяхъ полной заболоченности растительнаго матеріала, то не забудемъ, что тамъ t° была равной $17^{\circ} - 19^{\circ} \text{ C.}$; здѣсь-же мы имѣемъ какъ разъ комбинацію обоихъ неблагоприятныхъ факторовъ (и t° и влаги).

накопленію въ разлагающейся массѣ кислыхъ продуктовъ, которые угнетающе дѣйствуютъ на дальнѣйшій ходъ правильной ея минерализаціи.

Сопоставляя теперь цифры анализовъ, относящіяся къ непромываемымъ водою матеріаламъ по всѣмъ тремъ категориямъ опытовъ, мы можемъ подмѣтить, во-1-хъ, что въ условіяхъ оптимальной t° и оптимальной влажности, совершается сравнительно съ другими сочетаніями этихъ двухъ факторовъ, энергичнѣйшее отщепленіе растворимыхъ зольныхъ веществъ, причемъ факта закрѣпленія какого-либо соединенія здѣсь совершенно не наблюдается, и во-2-хъ, что, въ условіяхъ опытовъ II-ой категоріи (низкая t° и избыточная влажность), количества упомянутыхъ веществъ настолько незначительно превосходятъ соотвѣтствующія количества въ опытахъ III-ей категоріи ($t^{\circ} = 25^{\circ}$, влажность = $1/10$ влагоемкости), что, принимая во вниманіе высказанныя нѣсколько выше соображенія о необходимости учитывать при разсмотрѣніи цифръ относящихся до опытовъ II-ой категоріи, и непосредственное растворяющее дѣйствіе самой воды ¹⁾, едва ли будетъ ошибкой высказать предположеніе, что на послѣднемъ мѣстѣ по энергіи распада органическихъ веществъ надо поставить именно обстановку опытовъ II-ой категоріи, т.-е., комбинацію низкой t° съ недостаточнымъ увлажненіемъ.

Какимъ же образомъ объяснить себѣ теперь тотъ фактъ, что случаи закрѣпленія P_2O_5 или вообще какихъ-либо другихъ зольныхъ соединеній при разлагающемся матеріалѣ наблюдаются лишь въ томъ случаѣ, когда матеріалъ этотъ систематически промывается водою? Почему тѣхъ же самыхъ явленій мы не видимъ въ разлагающихся массахъ, не испытывающихъ повторныхъ промываній? Казалось бы, что разъ процессы закрѣпленія тѣхъ или другихъ соединеній мы готовы отнести

¹⁾ Напомню, что избыточное увлажненіе матеріала создаетъ какъ бы длительную водную вытяжку изъ него.

къ явленіямъ біологическаго характера, то въ дѣйствительности мы должны были бы встрѣтиться именно съ обратнымъ случаемъ, а именно наличностью закрѣпленія ихъ въ растительныхъ массахъ, непромываемыхъ, и отсутствіемъ этого явленія въ объектахъ, систематически промываемыхъ (слѣдов.,—накапливающихъ въ себѣ кислые продукты, угнетающіе біологическіе процессы). Дать однако какой-либо опредѣленный отвѣтъ на данный вопросъ не представляется пока возможнымъ. Непосредственное изученіе процессовъ минерализаціи органическаго вещества слишкомъ мало еще подвинуто впередъ, чтобы можно было бы совершенно ясно и точно нарисовать себѣ ту сложную, съ точки зрѣнія химической и біологической, картину, которая открывается намъ при ближайшемъ изученіи этихъ интереснѣйшихъ процессовъ. Быть можетъ, въ растительныхъ массахъ, не испытывающихъ сквозного промыванія, процессъ распада, вообще говоря, идетъ съ такой энергіей (и это наглядно доказано нашими прежними опытами), что регенераціонныя явленія не имѣютъ возможности въ такой средѣ фиксироваться и совершаются, въ силу этого, лишь мимолетнымъ такъ сказать, образомъ. Какъ извѣстно, въ навозѣ, напр., процессы закрѣпленія въ тѣлѣ микроорганизмовъ азота, и временное, такимъ образомъ, пониженіе удобоусвояемости его для высшихъ растений, также представляются процессами обычными, но достаточно поставить эту массу въ условія благоприятныя для энергичнаго ея разложенія, чтобы явленія регенераціи бѣлковыхъ веществъ уступили мѣсто процессамъ усиленнаго распада ихъ. Весьма возможно, поэтому что если бы мы слѣдили за процессами минерализаціи непромываемыхъ водой растительныхъ объектовъ по возможности въ самые короткіе промежутки времени (по днямъ и даже, быть можетъ, по часамъ), то имѣли бы возможность наблюдать и въ данномъ случаѣ временныя регенераціонныя явленія. Что же касается растительныхъ объектовъ, испытывающихъ систематическое промываніе водой, то, правда біоло-

гическіе процессы въ такой средѣ идутъ нѣсколько болѣе замедленнымъ темпомъ (въ силу образованія кислыхъ продуктовъ), но, во-1-хъ, и процессы химическаго распада въ ней органическихъ веществъ совершаются, какъ показали наши прежніе опыты, также сравнительно очень слабо, а во-2-хъ, о полномъ прекращеніи въ этихъ условіяхъ біологическихъ процессовъ не можетъ быть, конечно, и рѣчи: по крайней мѣрѣ богатѣйшая флора плѣсневыхъ грибовъ, всегда наблюдаемая въ этихъ случаяхъ, указываетъ намъ на полную возможность регенераціонныхъ явленій и въ данной обстановкѣ.

Наконецъ, въ интересующемъ насъ явленіи замѣшанъ цѣлый рядъ и чисто химическихъ реакцій: возможность образованія различныхъ нерастворимыхъ органо - минеральныхъ соединений, въ составъ которыхъ входитъ, между прочимъ, P_2O_5 , а также нерастворимыхъ солей извести и желѣза и пр. и пр. Ближайшее изученіе всѣхъ этихъ сложнѣйшихъ процессовъ, совершающихся въ разлагающейся растительной массѣ, потребуетъ еще не мало совмѣстныхъ трудовъ химиковъ и бактериологовъ.

До сихъ поръ, при изученіи тѣхъ органическихъ и минеральныхъ соединений, которые выщелачиваются водой изъ свѣжихъ и разлагающихся растительныхъ остатковъ, мы смотрѣли на эти водно-растворимыя соединения, главнымъ образомъ, какъ на источникъ возможнаго обогащенія почвы органическими и зольными веществами.

Несомнѣнно, однако, что вымываемыя въ почву, вмѣстѣ съ атмосферными осадками, соединения эти производятъ одновременно тамъ цѣлый рядъ и противоположныхъ реакцій, а именно — растворяютъ имѣющіяся въ почвѣ составныя части, уносятъ ихъ въ болѣе глубокіе горизонты, вступаютъ съ ними въ реакціи обмѣннаго разложенія, такъ или иначе воздѣйствуютъ на перегнойныя соединенія почвы и пр. Характеръ этихъ реакцій, а также количественная ихъ сто-

рона, всецѣло зависитъ отъ цѣлаго ряда привходящихъ условій: характера почвы, состава притекающихъ сверху растворовъ, количества и состава отмирающей растительности, характера разложенія послѣдней, метеорологическихъ условій и пр. и пр.

Въ послѣдующей главѣ мы представимъ тѣ данныя, которыя имѣются у насъ сейчасъ въ рукахъ, и которыя касаются одной изъ сторонъ этого обширнаго и интереснаго вопроса, а именно — той роли, которую могутъ играть отмирающіе растительные остатки въ деградационныхъ процессахъ почвы.

ГЛАВА IV.

Растительные остатки, какъ источникъ деградационныхъ явленій въ почвѣ.

Литература этого вопроса. Вліяніе химическаго состава растительныхъ остатковъ на процессы деградациі (опыты съ листьями дуба и суглинистымъ черноземомъ). Процессы оподзоливанія поверхностныхъ горизонтовъ у суглинистыхъ и супесчаныхъ почвъ. О процессахъ деградациі въ различныхъ типахъ почвъ (опыты съ суглинистымъ черноземомъ, съ деградированнымъ черноземомъ, съ сѣрымъ лѣснымъ суглинкомъ и съ подзолистой суглини-супесью). Выводы и заключенія.

Благодаря дружной работѣ, главнымъ образомъ, русскихъ почвовѣдовъ — явленія деградациі, наблюдаемыя въ природѣ, въ естественныхъ условіяхъ, описаны довольно полно и подробно. Сущность этого процесса по отношенію въ частности къ чернозему, рисуется обычно въ слѣдующемъ видѣ ¹⁾: при заростаніи чернозема лѣсомъ, послѣдній вноситъ въ поверхностные горизонты этой почвы лучшія условія увлаженія (въ силу меньшей испаряемости, болѣе лучшей утилизаціи талыхъ водъ и пр.); въ силу этого — процессы разложенія степного гумуса начинаютъ итти болѣе энергичнымъ темпомъ, что ве-

¹⁾ Любопытно, что деградированные черноземы для Западной Европы указаны и описаны впервые, если не ошибаемся, русскимъ же изслѣдователемъ — проф. Н. Богословскимъ (см. „Почвовѣдніе“, 1902, № 4).

дети за собой неизбежно осветляние гумусовых горизонтов чернозема. Предполагается при этом, что разложение органических веществ в данном случае идет до стадии, главным образом, креновой кислоты, которая, обладая, большой подвижностью, вмѣстѣ съ тѣмъ энергично растворяетъ минеральные элементы почвенной массы. Въ результатѣ—на ряду съ уничтоженіемъ запасовъ гумуса данной почвы идетъ и оподзоливаніе поверхностныхъ горизонтовъ ея. Короче говоря, типъ почвообразованія здѣсь рисуется аналогичнымъ тѣмъ процессамъ, которые мы наблюдаемъ, въ болѣе рѣзкихъ формахъ, у почвъ подзолистыхъ.

Необходимо однако указать, что если строеніе деградированныхъ почвъ и цѣлый рядъ другихъ морфологическихъ ихъ особенностей, а также районъ ихъ распространенія и пр. описаны, можно сказать, съ достаточной подробностью, то съ экспериментальной стороны, вопросъ о сущности деградации остается до настоящаго времени почти и не затронутымъ. Если не считать извѣстной работы г. Костычева: „Образованіе и свойства чернозема“ ¹⁾, гдѣ авторъ стремился рѣшить данный вопросъ именно опытнымъ путемъ, а также опубликованныхъ въ 1908 г. моихъ, болѣе или менѣе аналогичныхъ, опытовъ въ этой же области ²⁾, то другихъ какихъ-либо указаній экспериментальнаго характера въ интересующей насъ области—мы совершенно не имѣемъ.

Впрочемъ, частный вопросъ о томъ, что въ условіяхъ лучшаго увлажненія (вносимаго, напр., лѣсомъ въ степную почву) должны накапливаться именно болѣе подвижныя перегнойныя кислоты (апокреновая и креновая), которыя и влекутъ за собой, разсуждая теоретически,—по аналогіи съ дѣйствіемъ дру-

¹⁾ „Труды С.-Петербург. Общества Естествоиспытателей“, 1889, XX, стр. 153—155.

²⁾ „Матер. къ изученію процессовъ разложенія растит. остатковъ въ почвѣ“, 1908, стр. 100—128.

гихъ органическихъ кислотъ, — деградаціонныя явленія въ почвѣ, находятъ себѣ нѣкоторое подтвержденіе въ опытахъ Козловскаго ¹⁾, Лесневскаго ²⁾, Грачева ³⁾, Налетова ⁴⁾, Добровольскаго ⁵⁾, Захарова ⁶⁾ и др. ⁷⁾, но прямого отношенія къ разсматриваемому нами вопросу — работы эти не имѣютъ и непосредственнаго отвѣта на него не даютъ.

Значительно болѣе исчерпывающія данныя въ этой области получены были, какъ мы видѣли, въ нашей лабораторіи г. Одинцовымъ. Опыты эти подробно изложены нами во II-й главѣ. Напомню, что они даютъ уже болѣе или менѣе опредѣленный и непосредственный отвѣтъ на вопросъ, какія, именно, изъ перегнойныхъ кислотъ образуются при различныхъ условіяхъ разложенія растительныхъ остатковъ.

Что касается, наконецъ, ближайшаго изученія тѣхъ реакцій, которыя происходятъ въ почвѣ подъ воздѣйствіемъ упомянутыхъ выше подвижныхъ перегнойныхъ кислотъ, то, какъ извѣстно, въ этой области мы до сихъ поръ не имѣемъ никакихъ опытныхъ данныхъ ⁸⁾, и вопросъ этотъ приходится рѣшать лишь по аналогіи съ другими органическими или минеральными кислотами. Всестороннее экспериментальное изученіе сущности процесса деградации и построеніе вполне научнаго

¹⁾ „Матер. по изученію русскихъ почвъ“, вып. VIII.

²⁾ „Записки Ново-Алекс. Инст. Сельск. Хоз. и Лѣсов.“, Т. X, вып. 2.

³⁾ „Журн. Оп. Агрономіи“, 1902, III.

⁴⁾ „Матер. по изученію русскихъ почвъ“, вып. XIII.

⁵⁾ Ibid., вып. XIII.

⁶⁾ „Почвенные растворы; роль ихъ въ почвообразованіи“... etc. (Журн. Оп. Agr., 1906, IV).

⁷⁾ Въ нашей лабораторіи недавно закончена аналогичная работа студ. Цвѣткова, касающаяся того же вопроса. Опубликована она будетъ въ XXI вып. „Мат. по изуч. русск. почвъ“.

⁸⁾ Относительно гуминовой кислоты и ея солей—дѣло стоитъ нѣсколько иначе, и мы имѣемъ въ настоящее время не мало работъ, довольно подробно выясняющихъ намъ реакціи, которыя происходятъ въ почвѣ подъ воздѣйствіемъ упомянутыхъ соединений (см. литературу у К. Глинка: „Исслѣдованія въ области изученія процессовъ вывѣтриванія“).

объясненія его—представляет собой въ высшей степени интересную, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень сложную задачу будущаго. Съ этой точки зрѣнія надо горячо привѣтствовать всякую лишнюю попытку такъ или иначе освѣтить этотъ вопросъ опытнымъ путемъ.

Попытку экспериментальнымъ путемъ вызвать искусственную деградацию чернозема произвелъ впервые, какъ я сказалъ выше, проф. Костычевъ ¹⁾.

Черноземная почва (Екатеринославск. губ.) помѣщена была въ 2 цилиндрическіе сосуда слоемъ въ 6 д.; почвы взято было 3 kgr. Въ одномъ сосудѣ она была закрыта слоемъ дубовыхъ опавшихъ листьевъ въ количествѣ 150 gr. Послѣ этого почва поливалась водой въ такомъ количествѣ, чтобы она не могла задержать всей воды, но чтобы часть послѣдней проходила въ поставленные снизу стаканы. Всего для поливки употреблено: для чернозема съ покровомъ изъ листьевъ 10,100 с. с., для почвы же безъ покрова 10,125 с. с.

Въ поставленные снизу стаканы фильтровались совершенно безцвѣтные растворы, изъ которыхъ вскорѣ осѣдало бѣлое вещество (углекислая известь, выщелачиваемая изъ листьевъ и почвы—въ видѣ двууглекислой соли). Опытъ продолжался годъ. Вода прошедшая черезъ почву, выпаривалась и твердый остатокъ подвергался анализу.

При этомъ найдено:

	Въ сухой почвѣ %.	Въ растворѣ (gr.).	
		Съ листьвен. покров.	Безъ покр.
Органич. вѣщ.	8,461	—	—
Химич. связ. воды	3,257	—	—
Потеря при прок.	11,718	1,9012	1,2530
Растворилось въ соляной кисл.:			
SiO_2	16,508	0,3128	0,1705
Al_2O_3	6,337	0,2704	0,0204
Fe_2O_3	4,984		

¹⁾ „Тр. СПб. Общ. Естествоисп.“ 1889, XX, стр. 153—155.

	Въ сухой почвѣ %	Въ растворѣ (гр.).	
		Съ листьвен. покров.	Безъ покр.
Mn_2O_3	0,234	0,1018	0,0219
CaO	2,088	1,3569	1,7618
MgO	1,715	1,3483	0,3667
K_2O	0,736	0,0726	0,0496
Na_2O	0,103	0,0654	0,0593
P_2O_5	0,168	0,0053	сл.
SO_3	сл.	0,0839	0,1611
CO_2	0,424	—	—
Всего цеолитн. вещ.	24,938	—	—
„ нераствор. (глина, песокъ)	63,344	—	—

Послѣ опыта опредѣлено было содержаніе гумуса въ почвѣ изъ обоихъ сосудовъ; оказалось:

Въ почвѣ съ покровомъ изъ листьевъ	7, 3%
„ „ безъ покрова	6,57%

Такъ какъ въ почвѣ было въ началѣ 253,83 гр. орган. вещ., то, слѣдовательно, за годъ изъ этого количества разложилось:

Съ покровомъ	34,80 гр.
Безъ покрова	56,70 „

Черноземная почва измѣнила послѣ опыта свой цвѣтъ, приблизившись въ этомъ отношеніи къ сѣрымъ землямъ. Изъ нея извлечено было при листьвенномъ покровѣ около 6 гр. минеральн. вещ., а безъ покрова—4 гр. (0,2% и 0,13%). Кромѣ того, почва сдѣлалась менѣе связной, чѣмъ также приблизилась съ сѣрымъ землямъ.

Изложенные опыты съ полной очевидностью показываютъ намъ, какія глубокія измѣненія можетъ претерпѣвать почва при сквозномъ промываніи растворимыми продуктами разложенія растительныхъ остатковъ.

Однако, ближайшая сущность взаимодѣйствія этихъ продуктовъ съ составными частями почвы остается невыясненной. Каковъ былъ первоначальный составъ притекающихъ растворовъ изъ разлагающейся листвы, какъ шло постепенное по-

ступленіе въ почву отдѣльныхъ составныхъ частей этихъ растворовъ, почему CaO и SO_2 оказались въ стекающей жидкости изъ почвы безъ покрова въ большемъ количествѣ, чѣмъ изъ почвы съ покровомъ, почему, наконецъ, энергія разложенія органическихъ веществъ въ почвѣ, при систематическомъ удаленіи изъ послѣдней растворимыхъ продуктовъ этого разложенія, идетъ болѣе замедленныхъ ходомъ (въ теченіе года въ почвѣ разложилось всего 34,80 гт. органич. веществъ вмѣсто 56,70 гт.) и т. д. — все это вопросы, которые невольно возникаютъ при ближайшемъ изученіи вышеприведенныхъ цифръ, но которые остаются безъ достаточнаго освѣщенія ¹⁾.

Болѣе подробныя данныя относительно искусственно-вызываемой деградациі почвъ даются моими опытами, опубликованными въ 1908 г.

Опыты эти были организованы слѣд. образомъ: взять былъ высокій цилиндрическій сосудъ, состоящій изъ двухъ отдѣльныхъ частей, входящихъ другъ въ друга. Діам. сосудовъ = 15 с. Въ верхнюю часть были помѣщены осиновыя листья, въ количествѣ 750 гт., въ нижнюю — почва въ количествѣ 2 кгт. Та и другая часть сосуда отдѣлялись другъ отъ друга мелкой металлической сѣткой. Подъ описаннымъ комбинированнымъ сосудомъ помѣщенъ былъ большой стеклянный сосудъ для собиранія стекающей жидкости. Опыты продолжались 13 мѣсяцевъ. Въ началѣ опыта воды было прилито сверху большое количество, чтобы добиться сквозного промыванія. Когда изъ почвы начала почти непрерывно сочиться въ подставленный стаканъ жидкость, приливаніе сверху воды стало производиться

¹⁾ Кстати говоря, подробное разсмотрѣніе аналитическихъ данныхъ г. Костычева, что сдѣлано было мною въ другомъ мѣстѣ („Матеріалы“ и пр. стр. 97), даетъ намъ, между прочимъ, одно изъ вѣсскихъ косвенныхъ доказательствъ въ пользу тѣхъ положеній, которыя высказаны были нами раньше — относительно своеобразнаго характера разложенія растительныхъ остатковъ, наблюдаемаго въ условіяхъ систематическаго удаленія изъ послѣднихъ продуктовъ разложенія.

меньшими порціями и нерегулярно, лишь бы поддерживать непрерывное промываніе данной почвы тѣми продуктами, которые поступали въ нее изъ разлагающейся листвы. Всего воды прилито было за все время опыта около 14 литровъ. Въ качествѣ контрольнаго сосуда служилъ одновременно другой металлическій сосудъ, который представлялъ собой лишь нижнюю часть описаннаго выше. Въ немъ помѣщалась одна почва (2 kgr.), но безъ листвы. Сосудъ этотъ служилъ для параллельнаго изученія того, сколько и какихъ веществъ растворяла изъ данной почвы, сравнительно съ вышеупомянутымъ растворомъ, чистая вода. Промываніе водой въ обоихъ сосудахъ производилось одновременно. Всего было взято воды для промыванія также 14 литр. Наконецъ, для того, чтобы знать составъ раствора, получаемаго почвой изъ разлагающихся листьевъ, взять былъ третій сосудъ, представлявшій собой лишь верхнюю часть, описаннаго выше, комбинированнаго сосуда. Въ послѣдній помѣщено было 750 gr. осинowychъ листьевъ. Для промыванія этого матеріала взято было также 14 литровъ воды (въ теченіе 13 мѣсяцевъ).

Такимъ образомъ, путемъ анализа стекающихъ жидкостей во всѣхъ трехъ сосудахъ, мы имѣли возможность составить себѣ точное понятіе, во-1-хъ, о томъ, сколько и какихъ веществъ выщелачиваетъ дистиллированная вода изъ осинowychъ листьевъ, служившихъ для опыта; во-2-хъ, сколько и какихъ веществъ выщелачиваетъ вода изъ данной почвы, и, наконецъ, въ-3-хъ, о томъ, какія измѣненія претерпѣваетъ почва въ своемъ составѣ при промываніи ея растворимыми продуктами разложенія даннаго растительнаго матеріала, т.-е, какія составныя части ея были растворены и унесены водой, и какія вещества изъ притекающихъ сверху растворовъ были поглощены ею.

Опыты были поставлены съ черноземомъ и лѣснымъ суглинкомъ. Не останавливаясь на всѣхъ полученныхъ циф-

рахъ и сдѣланныхъ на основаніи ихъ вычисленій ¹⁾,—я при-
веду только конечные результаты.

I) Количество гумуса въ %:

	Черно- земъ. %	Лѣсной су- глинокъ %
Въ почвѣ передъ началомъ опытовъ .	6,97	2,83
Въ почвѣ, подвергавшейся дѣйствию воды въ теченіе 13 мѣс.	4,02	1,89
Въ почвѣ, подвергавшейся дѣйствию продуктовъ разложенія растит. остат- ковъ—въ теченіе 13 мѣс.	5,84	2,57

II) Судьба зольныхъ элементовъ:

Чистая вода выщелочила въ теченіе 13 мѣсяцевъ въ %:

	Изъ чер- нозема. %	Изъ лѣсного суглинка. %
SiO_2	0,0002	Слѣды
K_2O	0,15	0,02
Na_2O	0,72	Слѣды
CaO	30,64	24,72
MgO	31,97	16,72
P_2O_5	0,12	Слѣды
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0006	Слѣды
Mn_2O_4	—	—
SO_3	44,95	35,00

Почва, находившаяся подъ лѣственнымъ покровомъ, потеряла
въ теченіе 13 мѣсяцевъ въ %:

	Черно- земъ. %	Лѣсной су- глинокъ. %
SiO_2	0,19	0,0087
K_2O	19,08	9,73
Na_2O	1,74	0,48
CaO	96,04	80,67
MgO	90,78	66,97
P_2O_5	17,10	18,06
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	10,42	3,69
Mn_2O_4	22,91	7,57
SO_3	84,08	85,00

Ближайшее рассмотрѣніе всѣхъ этихъ цифръ, а также
цѣлый рядъ побочныхъ соображеній, основанныхъ на выво-

¹⁾ См. „Матеріалы“... и пр. стр. 102—111, и 119—124.

дахъ моихъ прежнихъ опытовъ надъ характеромъ растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, дало мнѣ возможность сдѣлать слѣдующія заключенія:

1) Деградаціонныя реакціи вызываются въ почвѣ при систематическомъ сквозномъ промываніи ея даже чистой водой. Въ этомъ случаѣ образуется въ почвѣ рядъ подвижныхъ переносимыхъ кислотъ ¹⁾, которыя свое разрушительное дѣйствіе направляютъ прежде всего на щелочно-земельныя основанія. Потеря почвою этихъ послѣднихъ — уже неудержимо ведетъ ее къ дальнѣйшей деградаціи, такъ какъ указанное явленіе способствуетъ еще болѣе появленію въ почвенной средѣ кислотныхъ продуктовъ. Цифры вышеприведенныхъ анализовъ вполне подтверждаютъ это предположеніе. Что же касается, въ частности, гумусовыхъ соединений почвы, то, какъ мы видѣли, — черноземъ, подъ вліяніемъ промыванія водой, потерялъ въ теченіе 13 мѣсяцевъ — 2,95% ихъ (соотвѣтствующія наблюденія и вычисленія показали, что изъ этого количества вымыто водой было 0,94% гумусовыхъ веществъ, и 2,01% приходится на долю разрушившихся — путемъ процессовъ разложенія), лѣсной же суглинокъ — 0,94% (0,201% — путемъ вымыванія, и 0,739% — путемъ процессовъ разложенія). Такимъ образомъ, — продолжительное промываніе почвы водою сопровождается прогрессивнымъ обѣднѣніемъ ея какъ органическими, такъ и минеральными веществами. Съ этой точки зрѣнія — процессы деградаціи, а, быть можетъ, и болѣе рѣзкія формы ея (вплоть до подзолообразованія) — мыслимы въ любомъ физико-географическомъ районѣ, лишь бы были на лицо условія постоянного сквозного просачиванія атмосферной воды. Неизбѣжно должны мы встрѣтиться съ ними и при такихъ сельско-хозяйственныхъ меліораціяхъ, какъ дренажное промываніе почвъ, или, наоборотъ, усиленное орошеніе ихъ и т. п.

¹⁾ См. гл. II.

2) Еще болѣе рѣзкія и энергичныя формы принимаютъ деградационные процессы въ почвѣ въ томъ случаѣ, когда послѣдняя систематически обрабатывается тѣми растворимыми продуктами разложенія растительныхъ продуктовъ, которые (продукты) получаютъ изъ послѣднихъ при сквозномъ промываніи ихъ водой. Въ этомъ случаѣ, основываясь на нашихъ предыдущихъ опытахъ, мы можемъ предположить, что изъ разлагающейся листвы первыми же порціями воды удаляются въ весьма крупныхъ количествахъ щелочныя и щелочно-земельныя основанія. Въ виду сквозного и непрерывнаго промыванія почвы, упомянутыя вещества этой почвой не задерживаются, а начавшіе образоваться въ разлагающейся массѣ вслѣдъ за этимъ кислые продукты будутъ способствовать еще болѣе энергичному выносу ихъ изъ почвы, что и подтверждается вышеприведенными, весьма крупными, цифрами выщелачиванія изъ послѣдней почти всѣхъ минеральныхъ веществъ ¹⁾. Что же касается, въ частности, гумуса, то, какъ показываютъ тѣ же цифры, мы констатируемъ въ условіяхъ описываемаго опыта также нѣкоторое уменьшеніе его (5,84% вмѣсто первоначальныхъ 6,97%), но разница, какъ видимъ, совсѣмъ незначительная. Принимая во вниманіе, что изъ осиновыхъ листьевъ въ теченіе 13 мѣсяцевъ перешли въ почву довольно крупныя количества органическихъ веществъ, можно было бы думать, что они разлагались тамъ почти на цѣло. Однако, изслѣдованіе количества органическихъ веществъ, попадающихъ въ стекающую жидкость изъ комбинированнаго сосуда (листва + почва) показало намъ, что вещества эти почвой не задерживались, а проходили, можно сказать, на цѣло въ сте-

¹⁾ А. Лебедевъ— („Журн. Оп. Агр.“, 1906, V) пателъ около г. Холма почву, представляющую собой перегнойно-карбонатную почву—какъ-бы на пути къ превращенію въ подзолъ; при чемъ, на основаніи данныхъ химическаго анализа, авторъ ставитъ процессъ этой деградациі въ связь съ потерей данной почвой именно своихъ карбонатовъ.

кающій растворъ ¹⁾. Обстоятельство это заставило насъ сдѣлать предположеніе, что въ условіяхъ даннаго опыта, если и шло разложеніе принадлежащаго самой почвѣ гумуса, то крайне медленнымъ, угнетеннымъ темпомъ (въ силу неблагоприятныхъ условій внѣшней среды, накопившей въ себѣ, какъ мы видѣли, кислые продукты). Переносъ эти выводы въ природу, — мы можемъ предвидѣть, что процессы деградациіи будутъ сказываться прежде всего и наиболѣе энергично именно на балансъ минеральныхъ соединеній почвы, и значительно слабѣе и медленнѣе на перегнойныхъ веществахъ ея. Такимъ образомъ, въ то время какъ морфологическое изслѣдованіе той или другой почвы (напр. — окраска ея гумусовыхъ горизонтовъ и т. п.) убѣждаетъ насъ, можетъ быть, въ отсутствіи деградационныхъ явленій, — детальный химическій анализъ этой почвы можетъ дать намъ совершенно обратную картину.

Дальнѣйшія мои работы въ области лабораторнаго изученія процессовъ деградациіи — имѣли своею задачей такъ или иначе освѣтить вопросъ, во-1-хъ о вліяніи различнаго характера и состава разлагающихся растительныхъ остатковъ на энергію деградационныхъ явленій въ почвѣ и во-2-хъ, выяснить вопросъ — о сравнительной способности къ этимъ процессамъ различныхъ типовъ почвъ. Къ изложенію этихъ опытовъ и полученныхъ результатовъ мы сейчасъ и перейдемъ.

I. Вліяніе химическаго состава растительныхъ остатковъ на процессы деградациіи.

Если, согласно нашимъ опытамъ, изложеннымъ выше, признать за фактъ, что растворимые продукты разложенія расти-

¹⁾ Что, находится, въ тѣсной связи съ фактомъ лишенія почвы тѣхъ составныхъ частей (гл. обр. *CaO*), которымъ обязаны перегнойныя вещества переходомъ въ коллоидальное, нерастворимое состояніе, а, слѣдовательно, и своимъ закрѣпленіемъ.

тельныхъ остатковъ, при сквозномъ систематическомъ промываніи ими почвы, въ состояніи вызывать въ послѣдней типичныя деградаціонныя явленія, то надо уже à priori предположить, что характеръ и энергія указанныхъ явленій должны находиться въ самой тѣсной и непосредственной связи—какъ съ количествомъ отмирающей ежегодно въ томъ или другомъ районѣ растительности, такъ и съ ея качествомъ, т.-е. химическимъ составомъ. Достаточно указать хотя бы на тотъ фактъ, что различные растительные остатки содержатъ въ себѣ различное количество золы (притомъ различнаго состава), а, слѣдовательно, получающіеся при ихъ разложеніи кислотные продукты могутъ оказаться то болѣе, то менѣе насыщенными основаніями (отчего, конечно, будетъ зависѣть степень растворяющаго дѣйствія этихъ продуктовъ), и т. п., чтобы убѣдиться какая, дѣйствительно, близкая связь существуетъ между указанными двумя явленіями.

Обращаясь къ литературѣ этого вопроса, мы убѣждаемся, что послѣдній представляется совершенно невыясненнымъ. Правда, съ тѣхъ поръ, какъ академикъ Коржинскій ¹⁾ впервые создалъ свою стройную гипотезу о возможности вырожденія или деградации чернозема подъ вліяніемъ лѣсной растительности,—въ литературѣ накопились нѣкоторыя данныя относительно именно степени участія различныхъ древесныхъ породъ въ образованіи лѣсныхъ почвъ. Но данныя эти очень немногочисленны и носятъ въ большинствѣ случаевъ отрывочный характеръ,—не говоря уже о томъ, что выяснить этотъ вопросъ въ природной обстановкѣ является вообще дѣломъ чрезвычайной трудности: вѣдь для точнаго въ этомъ отношеніи учета надо найти такіе въ природѣ районы, которые бы не переживали смѣны тѣхъ или другихъ породъ, притомъ необходимо

¹⁾ С. Коржинскій.—„Предварит. Отчетъ о почвенныхъ и гео-ботанич. изслѣдованіяхъ 1886 г.“... etc. („Тр. Каз. Общ. Естеств.“, XVI, вып. 6 и XVIII, вып. 5).

фиксировать наблюденія на совершенно чистыхъ насажденіяхъ и пр. и пр.; словомъ, въ природной обстановкѣ крайне трудно выдѣлить данный изучаемый факторъ такъ, чтобы остальные приходящія условія подведены были бы, такъ сказать, къ одному знаменателю. Тѣмъ не менѣе, нѣкоторыми работами русскихъ почвовѣдовъ все-таки приблизительно устанавливаются отдѣльные случаи преобладающаго вліянія нѣкоторыхъ древесныхъ породъ на почву ¹⁾; оказывается, напр., что сѣрыя лѣсныя земли образовались у насъ, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ дуба и его спутниковъ (ясеня, ильма, осины, лещины и др.). Müller ²⁾, изслѣдуя лѣса Даніи, пришелъ къ убѣжденію, что еще болѣе оподзаливающе дѣйствуетъ на почву букъ. Наблюденія проф. В. Докучаева надъ лѣсами Бессарабіи подтверждаютъ этотъ фактъ ³⁾. Проф. Ramann ⁴⁾ также считаетъ букъ древесной породой, способной при своемъ разложеніи давать наибольшее количество свободныхъ подвижныхъ кислотъ; хвойныя породы онъ ставитъ въ этомъ отношеніи на послѣднемъ мѣстѣ.

Въ 1908 г. появилась работа М. Ткаченко ⁵⁾, въ которой упомянутый авторъ уже ближе касается интересующаго насъ вопроса. Путемъ непосредственныхъ сравнительныхъ анализовъ на гумусъ (изслѣдованія производились въ природной обстановкѣ—въ Моховомъ Имѣніи покойнаго И. Шатилова и въ Алексѣевскомъ Имѣніи П. Левицкаго) г. Ткаченко пришелъ къ заключенію, что процессъ деградациі рѣзче всего выра-

¹⁾ См., напр., К. Глинка, Н. Сибирцевъ и П. Отоцкій. „Хрѣновской участокъ“. Тр. Эксп. проф. Докучаева, 1894.

В. Докучаевъ.—Тр. В. Эк. Общ., 1889, № 1.

Э. Нидергеферъ.—Тр. С.-Петербург. Общ. Естеств. 1885, XVI и др.

²⁾ Müller. — „Studien über die natürlichen Humusformen“... etc. 1887.

³⁾ В. Докучаевъ. — Къ вопросу о почвахъ Бессарабіи. („Почвовѣдѣніе“ 1900).

⁴⁾ Ramann.—Bodenkunde, 1911.

⁵⁾ М. Ткаченко.—„О роли лѣса въ почвообразованіи“ (Изв. Импер. Лѣсного Института, 1908, XVIII).

жень въ почвѣ подъ дубомъ. „Хвойныя породы даютъ матеріалъ пестрый, изъ котораго, во всякомъ случаѣ, не видно, какая порода больше деградируетъ почву“... Ненгу въ своей послѣдней работѣ ¹⁾ указываетъ, что особенно легко кислый гумусъ образуется при разложеніи бука, пихты, дуба и сосны.

Во время своихъ работъ въ предѣлахъ Велико-Анадольскаго Лѣсничества (1906—1907 г.) я пытался подойти къ затронутому нами сейчасъ вопросу путемъ массовыхъ параллельныхъ анализовъ на гумусъ различныхъ кварталовъ этого искусственно-насажденнаго лѣса. Несомнѣнно, — послѣдній представляетъ собой въ высшей степени удобный объектъ для такихъ наблюдений, такъ какъ разнообразныя насажденія и по своему возрасту, и по составу, и по характеру роста, давали возможность разнообразить изслѣдованія въ этомъ направленіи самымъ широкимъ образомъ. Однако, какихъ-либо опредѣленныхъ результатовъ мнѣ получить не удалось и, несмотря на самые тщательные поиски, не пришлось напасть хотя бы даже на слѣды деградации чернозема; констатированныя же колебанія въ содержаніи гумуса въ различныхъ кварталахъ удовлетворительно объяснялись вліяніемъ цѣлаго ряда другихъ почвообразователей.

Объяснить указанный фактъ можно отчасти тѣмъ, что процессы деградации въ природныхъ условіяхъ, вообще говоря, очень длительны и 60-ти лѣтній срокъ представляется для нихъ, повидимому, слишкомъ короткимъ (нѣкоторымъ, наиболѣе старымъ, В. Анад. насажденіямъ уже болѣе 60 лѣтъ), а, главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ такой сравнительно небольшой промежутокъ времени едва ли могла рѣзко сказаться разница между различными древесными породами, особенно, если принять во вниманіе, что количество золы въ опадающихъ листьяхъ и составъ ея—могутъ широко колебаться въ зависимости отъ характера погоды, отъ времени опаданія листвы и пр. и пр.

¹⁾ „Les sols forestiers“ 1908.

Желая до нѣкоторой степени выяснить данный вопросъ въ условіяхъ лабораторнаго опыта—я первое время предполагалъ оперировать именно съ листвою различныхъ древесныхъ породъ и, на основаніи этихъ наблюденій, постараться такъ или иначе выяснить ихъ деградаціонную энергію. Однако, цѣлый рядъ соображеній заставилъ меня отказаться отъ такой постановки опытовъ. Дѣло въ томъ, что количество золы въ листьѣ различныхъ породъ и ея ближайшій химическій составъ, какъ извѣстно, широко колеблется въ зависимости отъ возраста дерева, отъ физико-механическаго и химическаго состава почвы, отъ метеорологическихъ условій даннаго вегетаціоннаго періода, отъ времени опаденія листвы и пр. Въ результатъ, собирая листву различныхъ породъ и ставя съ ними соотвѣтствующіе опыты, мы не можемъ поручиться за то, что у насъ въ рукахъ имѣется не случайный объектъ случайнаго состава и не можемъ быть увѣрены въ томъ, что результаты сравнительныхъ опытовъ будутъ зависѣть именно отъ характера состава и типичныхъ свойствъ даннаго изучаемаго объекта. Предвидя, такимъ образомъ, возможность получить перелѣфные и неопредѣленные результаты—я поступилъ нѣсколько иначе, а именно для своихъ опытовъ (имѣвшихъ цѣлью, какъ я указалъ выше, выяснить значеніе различнаго состава растительныхъ остатковъ на энергію деградаціонныхъ явленій въ почвѣ) пользовался однимъ и тѣмъ же растительнымъ объектомъ, но собраннымъ въ различныя стадіи его развитія. Какъ извѣстно, ко времени, напр., листопада составъ листьевъ сильно измѣняется, а именно, часть составныхъ частей уходитъ въ стволъ и листья ими обдѣняются, а содержаніе другихъ, наоборотъ, процентно повышается ¹⁾. Ко-

¹⁾ См., напр., Wolff. „Aschen. Analysen von landw. Producten“... etc. 1871, s. 158 и др.

Обще количество золы въ листьяхъ, на различныхъ стадіяхъ ихъ развитія, колеблется также въ очень широкихъ размѣрахъ. Zöller нашелъ

нечно, выполнѣ правильной такую постановку опытовъ считать также нельзя; достаточно указать хотя бы на то, что при этомъ мы вносимъ такой новый факторъ, какъ различную способность къ разлагаемости растительныхъ объектовъ, взятыхъ на различныхъ стадіяхъ развитія, вызываемую различіемъ въ ихъ химическомъ составѣ и пр., но для выясненія лишь общей картины изучаемыхъ явленій, можно было пока игнорировать указанный факторъ.

Для опытовъ служили листья дуба, собранные въ два періода: 1) въ срединѣ мая и 2) въ концѣ сентября—оппадающіе (желтые).

Химическій анализъ золы показалъ, дѣйствительно, весьма рѣзкую разницу въ составѣ ихъ, а именно:

	Въ 1.000 ч. сухого вещества содержится въ граммахъ.										Сум. зол. эл.
	SiO_2	K_2O	Na_2O	CaO	MgO	P_2O_5	$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	Mn_2O_4	SO_3	Cl	
1. Листья дуба, собранныя въ маѣ	2,07	10,13	0,34	20,81	6,12	5,27	0,75	1,73	2,18	0,01	49
2. Листья дуба, собранныя въ концѣ сентября	8,06	5,89	0,21	49,87	9,01	2,27	0,99	1,58	2,59	—	80

въ буковыхъ листьяхъ, собранныхъ въ маѣ—4,16%, въ іюлѣ—4,73% и въ октябрѣ—7,12% чистой золы. Въ другихъ листьяхъ бука, взятыхъ изъ другого мѣста, имъ найдены еще большія колебанія: въ маѣ—5,5%, въ ноябрѣ (опавшіе листья)—9,91%. Rissmüller даетъ такіа цифры:

	% золы.
въ маѣ буков. листья содержатъ	4,67
„ іюнѣ	5,20
„ іюлѣ	7,45
„ августѣ	9,03
„ сентябрѣ	8,90
„ октябрѣ	10,80
„ ноябрѣ	11,41

Ebermayer приводятъ еще болѣе рѣзкіа колебанія: хвоя ели содержала въ іюнѣ 1,24% чистой золы, опавшая же хвоя—около 10,19%. (См. „Die gesammte Lehre der Waldstreu“. 1876, s. 86).

Т.-е., мы видимъ громадное увеличеніе какъ всей суммы зольныхъ элементовъ ко времени листопада, такъ, въ частности, весьма значительное увеличеніе количества CaO , кремнекислоты, MgO , и отчасти полуторныхъ окисловъ и SO_3 , съ другой стороны — уменьшеніе K_2O , Na_2O и P_2O_5 . Особенный интересъ представлялъ для насъ фактъ сильнаго обогащенія листьевъ къ осени щелочно-земельными основаніями, если вспомнить, какую роль соединенія эти, на основаніи нашихъ прежнихъ опытовъ, призваны играть какъ въ характерѣ разложенія растительныхъ остатковъ, такъ и въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя вызываются въ почвѣ растворимыми продуктами этого разложенія.

Почва взята была черноземная, суглинистая (Тульск. губ.). Составъ ея приведенъ во II главѣ. Самые опыты были организованы слѣд. образомъ:

Почва въ количествѣ 1 kgr. помѣщена была въ металлическій сосудъ цилиндрической формы и сверху прикрыта слоемъ размельченныхъ дубовыхъ листьевъ, взятыхъ въ количествѣ 200 gr. Для стекающей жидкости снизу поставлены были объемистые стаканы. Почва на границѣ соприкосновенія съ растительной массой была прикрыта довольно толстымъ (около 2 сант.) слоемъ стеклянной ваты, чтобы избѣжать проникновенія въ нее мелкихъ частицъ и обрывковъ изъ выше лежащей массы. Описанныхъ сосудовъ было взято два: въ одномъ — почва была прикрыта молодыми дубовыми листьями, въ другомъ — желтыми, опадающими. Для того, чтобы знать, какое количество тѣхъ или другихъ веществъ поступаетъ изъ разлагающейся листвы въ почву, взято было отдѣльно два сосуда, въ которыхъ помѣщались описанные выше листья (въ каждомъ сосудѣ — по 200 gr.). Промывались они водой приблизительно въ одно и то же время и всегда одинаковымъ количествомъ ея. Долженъ оговориться, что совершенно идентичныхъ условий для промыванія достигать не удавалось: въ то время какъ вода довольно

легко просачивалась въ тѣхъ сосудахъ, гдѣ находились одни листья, въ другихъ сосудахъ, гдѣ листья эти имѣли подъ собой почву, создавались на извѣстное время условія нѣкоторой заболоченности, въ силу оказываемаго почвой сопротивленія стекающей изъ растительной массы водѣ. Впрочемъ, съ достиженіемъ почвою полной влагоемкости, указанное неудобство давало значительно меньше себя знать.

Наконецъ, для того, чтобы имѣть понятіе о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя вносятся въ почву систематическимъ промываніемъ ея одною водою и сравнить ихъ съ тѣми измѣненіями, которыя производятъ въ почвѣ вымываемые въ послѣднюю растворимые продукты разлагающейся растительной массы—былъ взятъ еще одинъ сосудъ съ одной почвой (1 kgr.), въ которомъ послѣдняя промывалась водою приблизительно въ одно и то же время и всегда одинаковымъ количествомъ ея.

Такимъ образомъ, у насъ въ рукахъ имѣлось 5 сосудовъ, изслѣдованіе стекающихъ жидкостей изъ которыхъ давало намъ возможность составить себѣ довольно ясное понятіе о всѣхъ измѣненіяхъ, совершающихся въ почвѣ и въ растительной массѣ.

Опыты продолжались около 5 мѣсяцевъ. Воды было употреблено для промыванія 12 литровъ. Стекающая жидкость во всѣхъ сосудахъ, по мѣрѣ накопленія, измѣнялась и опредѣленный объемъ ея немедленно выпаривался. Позднѣе къ сухому остатку прибавлялись новыя порціи и т. д. ¹⁾ Въ видахъ упрощенія задачи—въ стекающихъ растворахъ опредѣлялись лишь главнѣйшія соединенія, а именно: SiO_2 , CaO , MgO , P_2O_5 , сумма полуторныхъ окисловъ, K_2O , а также—общее количество перешедшихъ въ растворъ органическихъ веществъ (сжиганіемъ).

Перейдемъ теперь къ полученнымъ даннымъ, и прежде всего обратимъ вниманіе на тѣ измѣненія, которыя произошли въ

¹⁾ Оставленіе на долгое время стекающихъ жидкостей на воздухѣ было невозможно въ виду довольно быстрого ихъ загниванія.

данной почвѣ подѣ влияніемъ долговременнаго сквозного промыванія чистой водой.

Количество гумуса:

Въ почвѣ передъ началомъ опытовъ.	9,89%
„ „ подвергавшейся сквозн. промыв. водой въ теченіе 5 мѣсяцевъ.	8,09%

Количество вымытыхъ зольныхъ соединений:

Въ 10 литрахъ просочившагося раствора изъ 1 kgr. почвы содержится (въ gr.).

	gr.
SiO_2	слѣды
CaO	4,0473
MgO	1,0335
P_2O_5	0,0030
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0011
K_2O	0,0125
Органич. вещ.	8,1311

Зная же, каковъ общій запасъ во взятомъ количествѣ данной почвы (т.-е., въ 1 kgr.) различныхъ зольныхъ соединений (см. гл. II, стр. 159), мы можемъ вычислить, сколько выщелочила дистиллированная вода тѣхъ или другихъ веществъ въ % отъ первоначальнаго количества ихъ въ данной почвѣ, а именно:

	%
SiO_2	—
CaO	21,07
MgO	12,75
P_2O_5	0,17
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0038
K_2O	0,057

Строго говоря, мы уже здѣсь встрѣчаемся съ начавшимися типичными деградационными явленіями въ почвѣ — несмотря на сравнительно короткій промежутокъ времени нашихъ наблюденій. Правда, въ этихъ опытахъ употреблено было громадное количество воды, притомъ она непрерывно, какъ мы видѣли, промывала данную почву, съ тѣмъ въ естественныхъ условіяхъ мы можемъ встрѣтиться лишь въ исключительныхъ случаяхъ, или же фиксироваться будутъ эти процессы въ уха-

занномъ направленіи лишь въ теченіе огромнаго промежутка времени, но намъ важно, въ данномъ случаѣ, установить съ точки зрѣнія общей принципіальной той фактъ, что при сквозномъ промываніи уже чистой водой той или другой почвы— послѣдняя можетъ испытывать на себѣ какъ-разъ тѣ измѣненія въ своемъ составѣ, которыя мы считаемъ за типичныя деградационныя, а именно, —уменьшеніе перегноя и потерю ею извѣстной части всѣхъ своихъ зольныхъ соединеній ¹⁾. Аналогичный процессъ мы должны наблюдать въ тѣхъ районахъ, гдѣ периодически выпадаетъ огромное количество осадковъ, или, гдѣ по условіямъ рельефа можно ожидать временнаго затопленія (напр., заливные луга), стока воды (котловинки, западинки), а также въ искусственно орошаемыхъ, или наоборотъ, дренируемыхъ почвахъ и т. п. Необходимо только прибавить къ сказанному, что въ природѣ, въ естественныхъ условіяхъ, обычно такимъ деградирующимъ факторомъ является не чистая вода, въ собственномъ смыслѣ этого слова, а тѣ же растворимые продукты разложенія органическихъ остатковъ (корневая система, отмершіе стебли, листья и пр.), всегда присутствующіе въ почвѣ. Дѣйствіе же этихъ агентовъ, какъ мы скоро убѣдимся, представляется въ процессахъ деградации несравненно болѣе энергичнымъ ²⁾.

А пока обратимся теперь къ анализу тѣхъ растворовъ, которые вымывались изъ разлагающихся листьевъ въ почву.

¹⁾ Что касается въ частности перегноя, то цифра, полученная путемъ непосредственнаго анализа по способу Густавсона (8,09%), какъ видимъ, не совпадаетъ съ цифрой, которую можно было бы вывести путемъ вычисленія (принимая во вниманіе, что изъ 1 kg. почвы, содержащей 98,9 gr. гумуса—вода выщелочила 8,1311 gr. перегнойныхъ веществъ, надо было бы ожидать, что въ почвѣ еще остается около 9,08% гумуса). Указанная, довольно большая разница (0,99%), однако, не такъ велика, если принять во вниманіе, что часть перегноя за 5 мѣсяцевъ опыта разложилась и, такимъ образомъ, не была обнаружена въ стекающемъ растворѣ.

²⁾ См. мои анализы водныхъ вытяжекъ — изъ почвъ дренируемыхъ и недренируемыхъ, опубликованные въ 1904 г. („Изъ сел.-хоз. и гео-ботаническихъ наблюденій“, — „Земл. Газ.“, 1904).

Въ 10 литр. просочившагося раствора изъ 200 гт. листьвы содержится (въ гт.).

	Молодые листья.	Опадающіе листья.
	гт.	гт.
<i>SiO₂</i>	0,1815	0,2411
<i>CaO</i>	2,3401	7,1402
<i>MgO</i>	0,6335	1,0231
<i>P₂O₅</i>	0,1386	0,1235
<i>Al₂O₃ + Fe₂O₃</i>	0,0413	0,0631
<i>K₂O</i>	0,6623	0,7032
Органич. вещ.	29,0042	6,1432

Эти цифры показываютъ намъ, какіе различные, по своему составу, растворы проникали въ обоихъ случаяхъ въ почву. Особенное вниманіе обращаетъ на себя количество щелочно-земельныхъ основаній, выщелачиваемыхъ водой изъ опадающихъ листьевъ; что касается другихъ соединеній, то, несмотря на разницу въ первоначальномъ составѣ золы тѣхъ и другихъ объектовъ, взятыхъ для опыта, особенно рѣзкихъ результатовъ въ количествѣ ихъ не наблюдается. Весьма характернымъ представляется далѣе—малое количество органическихъ соединеній въ растворахъ изъ опадающихъ листьевъ, сравнительно съ молодыми, растущими объектами. Если же мы припомнимъ, какая громадная разница (на основаніи изложенныхъ нами во II-й главѣ опытовъ), наблюдается въ кислотности (какъ общей, такъ въ особенности—вызываемой присутствіемъ свободныхъ и ненасыщенныхъ органическихъ кислотъ) тѣхъ растворовъ, которые получаются изъ растительныхъ объектовъ, систематически промываемыхъ водой и непромываемыхъ (см. стр. 142—146 настоящей работы) и если примемъ во вниманіе, что въ описываемыхъ сейчасъ опытахъ мы имѣемъ дѣло именно съ объектами, испытывающими сквозное повторное промываніе,—то можемъ съ большой долей вѣроятія предположить, что подвижныя органическія кислоты, которымъ и обязаны своимъ генезисомъ деградаціонные процессы, — будутъ во второмъ случаѣ (опадающіе листья) значительно болѣе насыщены основаніями (см. количества переходящихъ

въ растворъ CaO и MgO), чѣмъ въ первомъ (молодые листья), гдѣ, съ одной стороны—количество органическихъ веществъ (главнымъ образомъ кислотнога, слѣдовательно, характера), переходящихъ въ растворъ, какъ мы видѣли, значительно больше, съ другой—количество могущихъ связывать эти кислые продукты основаній, значительно меньше ¹⁾).

Принимая всѣ эти соображенія и аналитическія данныя во вниманіе, мы уже можемъ теперь предвидѣть, съ какой энергіей пойдутъ процессы деградациі въ обоихъ нашихъ случаяхъ. Анализъ стекающихъ растворовъ изъ тѣхъ сосудовъ, въ которые были помѣщены обѣ наши почвы, какъ нельзя лучше подтверждаетъ высказанныя предположенія, что ясно видно изъ нижеприведенныхъ таблицъ:

Въ 10 литр. просочившаго раствора изъ 1 kgt. почвы (въ gr.) содержатся:

	Изъ почвы, по- крыт. молод. листьями.	Изъ почвы, по- крыт. опад. листьями.
	gr.	gr.
SiO_2	0,9087	1,2988
CaO	18,3202	16,7804
MgO	5,1645	3,2805
P_2O_5	0,3826	0,1508
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	16,6044	1,4362
K_2O	2,6603	1,1228
Органич. вещ.	35,0291	13,0002

Если предположить съ одной стороны, что растворъ изъ разлагающихся листьевъ, поступавшій въ почву, выщелочилъ изъ послѣдней лишь то, что можетъ вымыть изъ нея дистиллированная вода, съ другой,—что изъ воднаго раствора разлагающейся массы почвою не было поглощено ничего, то цифры только-что приведенныхъ анализовъ должны были бы совпадать съ цифрами, выражающими сумму веществъ въ сте-

¹⁾ Не невозможно, что во всѣхъ описываемыхъ процессахъ принимаетъ энергичное участіе, помимо подвижныхъ перегнойныхъ кислотъ, также и гуминовая кислота, которая, являясь типичнымъ коллоидомъ, способна, какъ извѣстно, легко образовывать ложные растворы.

кающихъ растворахъ изъ сосуда, наполненнаго одной почвой (безъ покрова) и изъ сосуда, наполненнаго одной листвою (безъ почвы). Отклоненія въ ту или другую сторону покажутъ намъ, въ какомъ направленіи пошли процессы выщелачиванія, или, наоборотъ, поглощенія. Сдѣлаемъ такое перечисленіе:

	Сумма веществъ, находящихся въ стекающихъ растворахъ изъ почвы и изъ листвы.		Въ стекающей жидкости изъ почвы, покрытой молодыми листьями, находится веществъ больше, чѣмъ въ предыдущей суммѣ на	Въ стекающей жидкости изъ почвы, покрытой опадающими листьями, находится веществъ больше, чѣмъ въ предыдущей суммѣ на
	молодые листья.	опадающія листья.		
			гг.	гг.
SiO_2	0,1815	0,2411	0,7272	1,0577
CaO	6,3874	11,1875	11,9328	5,5929
MgO	1,6670	2,0566	3,4975	1,2239
P_2O_5	0,1416	0,1265	0,2410	0,0243
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0424	0,0642	16,5620	1,3720
K_2O	0,6748	0,7157	1,9855	0,4071
Орган. вещ.	37,1353	14,2743	—	—

Въ виду же того, что, на основаніи данныхъ валового анализа изучаемой почвы, намъ извѣстно, сколько содержится въ ней тѣхъ или другихъ соединений, — не трудно теперь вычислить, сколько потеряла данная почва каждого изъ этихъ элементовъ въ $\frac{0}{100}$ — подъ вліяніемъ растворимыхъ продуктовъ разложенія листьевъ молодыхъ и опадающихъ, а именно:

Въ 1 кгг. почвы Почва, покр. мо- Почва, покр. опа-
содержится въ гг. лод. листьями, дающ. листьями,
(см. стр. 159). потеряла въ $\frac{0}{100}$. потеряла въ $\frac{0}{100}$.

	гг.	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{100}$
SiO_2	661,1	0,11	0,16
CaO	19,2	62,15	29,12
MgO	8,1	43,18	15,10
P_2O_5	1,7	14,17	1,43
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$. . .	140,0	11,83	0,98
K_2O	21,7	9,14	1,87

Анализъ на гумусъ показалъ, что

	% гумуса.
1) въ почвѣ, покрытой молодыми листьями, спустя 5 мѣс. оказалось ?	7,71
2) въ почвѣ, покрытой опадающими листьями, спустя 5 мѣс. оказалось	8,11
(передъ началомъ опыта — въ почвѣ было гумуса	9,89)

Обращая прежде всего наше вниманіе на количества найденнаго перегноя, мы должны будемъ придти къ тому заключенію, во-1-хъ, что тотъ или иной химическій составъ и характеръ разлагающейся растительной массы, повидимому, не сказывается сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ на степени потери данной почвой части своего гумуса (путемъ процессовъ разложенія или выщелачиванія), такъ какъ найденная разница (0,4%),—принимая въ соображеніе характеръ постановки описываемыхъ опытовъ,—является, несомнѣнно, въ предѣлахъ погрѣшности анализа, и во-2-хъ, что вообще дѣйствіе въ указанномъ направленіи растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, можно сказать, ничѣмъ не отличается отъ аналогичнаго дѣйствія уже чистой воды. Припомнимъ, что при непрерывномъ промываніи данной почвы въ теченіе 5 мѣс. водой, мы нашли въ ней, въ концѣ опыта,—8,09% гумуса, т.-е. цифру, можно считать, равную приведенной выше.

Такимъ образомъ, деградационныя явленія подъ влияніемъ вымываемыхъ продуктовъ разложенія органическаго вещества сказываются, вѣроятно, прежде всего на обѣднѣніи почвы зольными соединеніями. Уменьшеніе же въ ней при этихъ процессахъ перегноя идетъ тѣмъ же темпомъ (по крайней мѣрѣ—въ первыя стадіи) какъ и при сквозномъ промываніи чистой водой (нѣсколько ниже мы найдемъ данному факту новое подтвержденіе). Быть можетъ, явленіе это зависитъ отъ того, что вымываемые въ почву кислые продукты разложенія, создавая неблагоприятную среду для разложенія перегноя—тѣмъ самымъ препятствуютъ обѣднѣнію почвы этимъ веществомъ.

Если же мы теперь обратимся къ цифрамъ, характеризующимъ объединѣніе данной почвы зольными соединеніями, то можемъ, наоборотъ, убѣдиться, какую громадную роль играетъ въ упомянутыхъ процессахъ почвы именно — составъ отмирающей растительности: чѣмъ большее количество зольныхъ соединеній послѣдняя содержитъ и, въ частности, чѣмъ большее количество находится въ ея золь щелочно-земельныхъ основаній, тѣмъ, какъ показываютъ цифры, медленнѣе и слабѣе протекаетъ процессъ деградаціи, вызываемый вымываемыми въ почвенные горизонты растворимыми продуктами разложенія этой растительности. Хотя тѣ или другія опредѣленные заключенія, вытекающія изъ описанныхъ выше опытовъ, относятся, строго говоря, лишь къ данному растительному объекту, тѣмъ не менѣе, въ извѣстной своей долѣ, они могутъ быть перенесены въ природную обстановку и на другіе различные растительные остатки. Дѣйствительно, если существуетъ, доказанная при томъ опытомъ, прямая связь между составомъ этихъ остатковъ и ихъ, такъ сказать, деградирующей способностью, то этимъ до нѣкоторой степени освѣщается вопросъ о значеніи въ генезисѣ такихъ почвъ, какъ деградированные черноземы, лѣсныя земли, подзолистыя и т. п. — не только ближайшаго химическаго состава отмирающихъ растительныхъ остатковъ, но и количества послѣднихъ, т.-е., густоты стоянія травянистыхъ растений, или плотности насажденія и т. п. Съ этой точки зрѣнія — деградація, напр., чернозема, отнюдь не имѣетъ единственнымъ своимъ источникомъ именно лѣсную растительность. Процессъ этотъ можетъ вызываться любой растительностью, лишь бы налицо было достаточное количество атмосферныхъ осадковъ, способныхъ промывать данную почву, и соответствующій составъ отмирающихъ растительныхъ остатковъ ¹⁾. Мы видѣли нѣсколько

¹⁾ Участвія въ этомъ процессѣ самой почвы (т.-е. ея физико-механическаго и химическаго состава) я пока не касаюсь.

выше, что даже чистая вода (но при непремѣнномъ условіи— систематическаго сквозного промыванія ея почвы) можетъ вызывать аналогичныя же реакціи въ послѣдней; а такъ какъ въ природѣ, въ естественныхъ условіяхъ, въ почву поступаютъ съ атмосферными водами неизбѣжно именно растворы (въ томъ числѣ такіе, которые и являются продуктомъ разложенія остатковъ растительности) то, при наличности указанныхъ выше условій, мы можемъ встрѣтиться съ деградационными явленіями—въ любомъ физико-географическомъ районѣ и подъ любой растительностью ¹⁾. Въ качествѣ подтвержденія этого вывода, сдѣланнаго нами на основаніи лабораторнаго изученія даннаго вопроса, можно привести хотя бы тотъ фактъ, что, не такъ давно, генезисъ подзолистыхъ, напр., почвъ ²⁾ ставили непремѣнно въ связь съ лѣсами (въ виду казавшейся приуроченности этихъ почвъ именно къ лѣснымъ районамъ); въ настоящее время подробное изученіе районовъ распространенія этихъ почвъ показало, что процессы оподзоливанія наблюдаются далеко и внѣ лѣсныхъ областей, и что они являются процессами, до нѣкоторой степени, космополитическими ³⁾.

Если процессы деградации, являются такимъ образомъ, результатомъ воздѣйствія на почву растворимыхъ продуктовъ

¹⁾ Исходнымъ пунктомъ излагаемыхъ въ данной главѣ опытовъ является полное отождествленіе нами двухъ понятій—„подзолистость“ и „выщелоченность“; а потому мы всецѣло присоединяемся къ проф. П. Земятченскому, который, съ этой точки зрѣнія, и объединилъ впервые въ одну генетическую группу подзолы и солонцы (См. „Пады“, 1894, стр. 163) и тѣмъ самымъ разъяснилъ намъ химизмъ процессовъ, напр., осолоненія орошаемыхъ участковъ и т. п. (см. работы Hilgard'a, Костычевской Опытной Станціи и др.). Попытка-же г. Тумина („Журн. Оп. Агр.“, 1911) рѣзко разграничить два указанныхъ выше понятія, намъ представляется неосновательной.

²⁾ Т.-е. почвъ съ весьма рѣзко-выраженными деградационными явленіями.

³⁾ Въ нашей лабораторіи разрабатываются въ настоящее время анализы нѣкоторыхъ дренируемыхъ почвъ, которые (анализы) показали наличность въ этихъ почвахъ типичныхъ деградационныхъ явленій. Фактъ этотъ необходимо, быть можетъ, учитывать при сужденіи о плодородіи упомянутыхъ почвъ.

разложенія растительныхъ остатковъ, то естественно ожидать, что поверхностный слой почвы, т. е. тотъ слой, который прежде всего и приходитъ въ соприкосновеніе съ упомянутыми продуктами; и долженъ былъ бы всего энергичнѣе разлагаться послѣднимъ. Обращаясь къ примѣрамъ далеко зашедшихъ деградационныхъ явленій въ почвѣ, а именно къ явленіямъ подзолообразованія, мы, на основаніи существующихъ анализовъ подзолистыхъ почвъ, дѣйствительно убѣждаемся, что въ суглинистыхъ и глинистыхъ почвахъ, наиболѣе разложеннымъ и оподзоленнымъ является именно горизонтъ *A* ¹⁾. Между тѣмъ, тѣ же анализы показываютъ намъ, что по отношенію къ песчанымъ и супесчанымъ подзолистымъ почвамъ — наблюдается совершенно обратная картина, т. е., сравнительно большая оподзоленность горизонта *B*, и малая — горизонта *A*. Проф. К. Глинка ²⁾ объясняетъ этотъ фактъ тѣмъ, что нѣкоторые минеральныя производныя перегнойныхъ кислотъ энергичнѣе дѣйствуютъ самой кислоты, а таковыя производныя могутъ лишь получиться въ поверхностныхъ горизонтахъ, а дѣйствовать имъ придется уже въ болѣе глубокихъ слояхъ. Кромѣ того, проф. К. Глинка указываетъ, что вообще скопленіе сколько-нибудь замѣтныхъ количествъ мало подвижныхъ соединений гуминовой кислоты задерживаетъ химическое разложеніе тѣхъ горизонтовъ, гдѣ эти соединенія скопляются. Наконецъ, указывая на то, что при анализахъ подзолистыхъ горизонтовъ суглинистыхъ и глинистыхъ почвъ весьма трудно отобрать мелкія зернышки ортштейновыхъ скопленій, на которыя соляная кислота прежде всего и направляетъ свое разлагающее дѣйствіе, цитируемый авторъ вообще склоняется къ тому выводу, что именно меньшая разложенность и оподзоленность поверхностныхъ горизонтовъ сравнительно съ болѣе

¹⁾ См., напр., анализы проф. Сорокина (Тр. Общ. Естествоисп. при Казанск. Univ., XXXI, вып. V).

²⁾ К. Глинка. Почвовѣдѣніе, 1908, стр. 407.

глубокими и должна, повидимому, считаться наиболее естественнымъ и нормальнымъ явленіемъ.

Этотъ интересный вопросъ подвергъ болѣе близкому разсмотрѣнію и изученію въ нашей лабораторіи студ. А. Трусовъ, который пришелъ нѣсколько къ инымъ результатамъ и, наоборотъ, призналъ наиболее естественнымъ процессомъ именно болѣе оподзоленность верхняго горизонта *A*. Кажущееся же обогащеніе горизонта *B* кремнекислотой, по сравненію съ *A* и *C*, и одновременное обѣдненіе его другими зольными соединениями, онъ объясняетъ неточной постановкой перечисленія получаемыхъ анализовъ. Дѣло въ томъ, что въ горизонтѣ *A* всегда имѣется сравнительно большое количество гумуса (до 3%), въ горизонтѣ же *B* онъ иногда совершенно отсутствуетъ; кромѣ того въ первомъ изъ упомянутыхъ слоевъ наблюдается большее количество гигроскопической и химически связанной воды; наконецъ, въ немъ констатируется избытокъ многихъ солей, по сравненію съ материнской породой. Всѣ эти факторы, — для выясненія истиннаго хода процессовъ оподзоливанія конечно, нельзя при перечисленіи принимать во вниманіе. Исключая изъ существующихъ валовыхъ анализовъ вліяніе всѣхъ этихъ моментовъ и перечисляя соответствующимъ образомъ количество SiO_2 —студ. А. Трусовъ, дѣйствительно, получилъ такіе результаты, которые не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что растворимые продукты разложенія растительныхъ остатковъ, проникая въ почву, начинаютъ свое разлагающее дѣйствіе сейчасъ же въ поверхностномъ горизонтѣ, деградируя этотъ послѣдній въ меньшей степени, чѣмъ и нижележащій. Приведу для примѣра нѣкоторые изъ такихъ перечисленій, сдѣланныхъ студ. А. Трусовымъ.

Существующій, напр., валовой анализъ супесчаного подзола Тихвинск. у., Новг. губ. ¹⁾ показываетъ, что въ верх-

¹⁾ „Мат. по изученію русскихъ почвъ“, XIII.

немъ горизонтъ процессъ оподзоливанія повидимому совершенно отсутствуетъ:

	Гигр. ода.	Потеря при про- калив.	Гу- мусъ.	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	P_2O_5
Гориз. А. .	1,22	5,86	2,8	1,24	0,4	7,47	1,95	86,06	0,09
„ В. .	0,24	0,9	0,3	0,8	0,24	4,81	0,68	91,5	0,06
„ С. .	0,97	2,4	—	1,05	0,348	7,38	1,65	86,5	слѣды

Если же устранить маскирующія вещества, вычтя ихъ для горизонта *А* изъ 100⁰/₀: [5,86 (потеря при прокаливаніи) + 0,28 (10⁰/₀ минеральн. вещ. въ гумусѣ) + 0,71 (P_2O_5 лишней въ гор. *А* по сравненію съ *С*, также лишней Fe_2O_3 и т. д.)], то получимъ 93,15⁰/₀, къ которымъ и надо относить количество SiO_2 въ гориз. *А*.

Вычтя далѣе изъ 100⁰/₀ потерю при прокаливаніи гор. *В* и 10⁰/₀ минеральныхъ солей органоминеральныхъ соединений— получаемъ истинное количество SiO_2 для этого горизонта. Такимъ образомъ, минеральной части будетъ 100⁰/₀ — (0,9 + 0,03) = = 99,07⁰/₀.

Для полученія, наконецъ, истиннаго количества SiO_2 въ гориз. *С*,—ее надо перечислить на 100⁰/₀—2,4⁰/₀, т.-е., на 97,6⁰/₀.

Сдѣлавъ подобныя перечисленія для SiO_2 получаемъ слѣдующіе результаты:

	Содержаніе SiO_2 .	
	Прежде.	Теперь.
	‰	‰
Гор. А.	86,06	92,38
„ В.	91,5	92,36
„ С.	86,5	97,60

Т.-е. мы видимъ, что энергія кислотнаго вывѣтриванія гориз. *А* не меньшая, чѣмъ въ *В*.

Подобныя же перечисленія для другихъ анализовъ показываютъ аналогичную картину:

Суглинистый подзол¹⁾

Содержаніе SiO_2

	Прежде ‰	Теперь ‰
Гориз. А.	76,6	80,11
„ В.	78,214	79,61
„ С.	70,204	72,53

Другой образец суглинистаго подзола²⁾.

Содержаніе SiO_2

	Прежде ‰	Теперь ‰
Гориз. А.	81,62	84,73
„ В.	80,97	82,70
„ С.	76,02	78,31

Чѣмъ съ болѣе тяжелой почвой мы имѣемъ дѣло, тѣмъ большую разницу въ энергіи оподзаливанія замѣчаемъ мы между гор. А и В.

Такая же картина получается, если мы обратимся къ разсмотрѣнію количества выщелоченныхъ солей изъ оподзоленного горизонта. Разсматривая послѣднія три таблички, можно видѣть, что количество солей въ гориз. А и В одинаковое, или же въ А ихъ даже меньше; а именно (вычитая количество SiO_2 изъ 100⁰/о):

	‰
Существенный подзолъ { Въ Гориз. А солей Калия, Натра, Магнія, Кальція, Аллюминія и др.	7,62
Новгор. г. { Въ Гориз. В.	7,64
Суглини- { „ „ С.	12,40
стый под- { Въ Гориз. А.	19,89
золъ. { „ „ В.	20,39
{ „ „ С.	27,47

Всѣ эти данныя и нѣкоторыя другія соображенія заставляютъ насъ признать, что вымываемые въ почву растворимые продукты разложенія растительныхъ остатковъ, начинаютъ свое деградаціонное дѣйствіе уже съ самыхъ поверхностныхъ го-

¹⁾ См. Отчетъ СПБ. Химич. Сел. Хоз. Лабораторіи, 1901—1906 г.г.

²⁾ „Мат. по изуч. русскихъ почвъ“, XIII.

ризонтовъ ея, безъ различія — съ суглинистыми или супесчаными разностями имѣють эти продукты дѣло. Необходимо, впрочемъ, оговориться, что въ случаяхъ супесчаныхъ подзоловъ, мы весьма часто можемъ наблюдать факты механическаго выноса изъ гориз. *A* въ гориз. *B* мельчайшихъ частицъ, что, конечно, можетъ обусловить собой, дѣйствительно, большую оподзоленность этого послѣдняго слоя, въ виду того, что увеличеніе илистыхъ частицъ въ немъ, вызываетъ извѣстное уплотненіе, и застой кислыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, тѣмъ самымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ будетъ способствовать дѣйствительно болѣе энергичной оподзоленности давняго горизонта.

Приведемъ механическій анализъ (по Osborn'y) вышеупомянутого супесчаного подзола, подтверждающій указанное замѣчаніе:

	Глина	Иль	Песокъ	Крупноземъ
	%	%	%	%
Гориз. <i>A</i>	11,7	8,9	74,3	5,1
<i>B</i>	6,6	50,8	35,5	7,1
<i>C</i>	5,86	16,5	53,4	24,3

II. О процессахъ деградациі въ различныхъ типахъ почвъ.

Обычно съ понятіемъ деградациі связано представленіе о процессахъ обѣднѣнія гумусомъ и зольными элементами, вызываемыхъ кислотами въѣдливаніемъ, именно черноземныхъ почвъ. Но, разсуждая теоретически, мы можемъ отъ самаго „высшаго“ типа чернозема до самаго „низшаго“ — типичнаго подзола, провести рядъ постепенныхъ переходовъ, изъ которыхъ каждый по отношенію къ своему сосѣдному болѣе „высшему“ типу, будетъ представлять деградированную почву. Выяснить такую „деградационную способность“ различныхъ генетическихъ типовъ почвъ, представляетъ собой крайне интересную задачу. Считаю необходимымъ оговориться, что излагаемые ниже опыты, поставленные мною въ цѣляхъ выясненія упомянутого вопроса, не могутъ претендовать на полученіе

точно-сравнимыхъ результатовъ, полученныхъ по отношенію къ различнымъ почвамъ. Дѣло въ томъ, что такой существенный моментъ въ деградаціонныхъ процессахъ, какъ время сопряженія продуктовъ разложенія растительныхъ массъ съ той или другой почвой, при примѣненномъ мною методѣ просачиванія, не могъ быть подведенъ во всѣхъ случаяхъ къ одному знаменателю, такъ какъ различныя физико-механическія свойства взятыхъ для опытовъ почвъ, естественно обуславливали собой то болѣе медленное, то болѣе ускоренное истеченіе жидкостей, а это, конечно, не могло не отражаться на энергіи изучаемыхъ процессовъ ¹⁾. Тѣмъ не менѣе, по отношенію къ каждому изъ взятыхъ типовъ почвъ, въ отдѣльности, качественная характеристика происходящихъ явленій получалась вполне опредѣленная.

Деградаціонные процессы изучались мною пока на слѣдующихъ типахъ почвъ:

1) На суглинистомъ черноземѣ (Тульской губ.) (по отношенію къ этой почвѣ, цифры анализовъ взяты изъ предыдущаго, описаннаго нами выше, опыта).

2) На деградированномъ суглинистомъ черноземѣ (Тульской губ.).

3) На сѣромъ лѣсномъ суглинкѣ (Рязанской губ.) и

4) на подзолистой суглино-супеси (Витебской губ.).

Ближайшую характеристику всѣхъ этихъ почвъ см. гл. II, стр. 159.

Опыты съ этими почвами были организованы совершенно аналогично тѣмъ опытамъ, которые были нами описаны выше, когда шла рѣчь о зависимости процессовъ деградаціи въ суглинистомъ черноземѣ отъ характера растительныхъ остатковъ. Въ качествѣ растительнаго объекта, служила молодая листва

¹⁾ Впрочемъ, особенно рѣзкой разницы мы не наблюдали, въ виду того, что всѣ взятые для опытовъ почвы принадлежали, по механическому составу, болѣе или менѣе къ одному типу, а именно, къ типу суглинистыхъ почвъ.

дуба (см. ея составъ выше), какъ обладающая болѣе энергичными деградационными свойствами (200 gr. листы и 1 kg. почвы). Отдѣльнаго сосуда съ листвою, для изученія того, что выщелачиваетъ изъ послѣдней вода, мы не ставили, а пользовались опять-таки соответствующими цифрами предыдущаго опыта. Параллельно тремъ сосудамъ, включавшимъ въ себѣ почву съ листовымъ покровомъ (въ качествѣ четвертаго такого же сосуда, служилъ сосудъ съ суглинистымъ черноземомъ предыдущаго опыта) поставлены были три сосуда, наполненные одной почвою, для изученія того, что вымываетъ изъ данныхъ почвъ дистиллированная вода. Опыты продолжались около 5 мѣсяцевъ. Воды для промыванія было употреблено во всѣхъ случаяхъ 12 литровъ.

Перейдемъ прямо къ полученнымъ даннымъ, и прежде всего обратимъ вниманіе на тѣ измѣненія, которыя произошли во взятыхъ почвахъ —

А) подъ вліяніемъ долговременнаго сквозного промыванія водой.

Количество гумуса въ ‰¹⁾:

	Передъ началомъ опытовъ	Спустя 5 мѣсяцевъ	Почва потемнѣла гумуса:
Черноземъ	9,89	8,09	1,80
Деградиров. черноземъ	7,33	4,24	3,09
Лѣсной суглинокъ	3,61	2,81	0,80
Подзолист. сугл.-супесь	2,12	1,71	0,41

¹⁾ Приводимыя въ этой таблицѣ цифры гумуса, полученные непосредственнымъ анализомъ данныхъ почвъ по способу Густавсона, какъ видимъ, снова не совпадаютъ съ тѣми цифрами, которыя должны были бы получиться путемъ соответствующаго вычисленія (см. слѣдующую таблицу, гдѣ приведено количество вымытыхъ водою органическихъ соединений изъ 1 kg. почвы). Согласно этому вычисленію мы должны были бы констатировать въ деградированномъ черноземѣ не 4,24‰ гумуса, а около 5,12‰ (исходя изъ того соображенія, что изъ 1 kg. почвы, содержащей въ себѣ 73,3 gr. перегноя, вода выщелочила 22,1006 gr. органич. соединений), въ лѣсномъ суглинкѣ не 2,81‰, а 3,30‰, и, наконецъ, въ подзолистой суглино-супеси не 1,71‰, а 2,05‰. Относительно чернозема мы уже говорили выше, что разница получилась еще болѣе крупная (вмѣсто 9,08‰

Количество вымытых зольных соединений:

Въ 10 литрахъ прозожившагося раствора изъ 1 kgr. почвы содержится (въ gr.).

	Черноземъ	Деградир. черн.	Лѣсной с.	Подз. сугл.-суп.
SiO_2	слѣды	сл.	—	сл.
CaO	4,0473	1,8326	0,2130	0,0526
MgO	1,0335	0,6345	0,1748	0,0475
P_2O_5	0,0030	0,0012	сл.	сл.
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0011	0,0014	сл.	сл.
K_2O	0,0125	0,0045	0,0020	сл.
Органич. вещ.	8,1311	22,1006	3,1703	0,7211

Принимая же во вниманіе валовой составъ всѣхъ этихъ почвъ (см. гл. II, стр. 159), мы видимъ, такимъ образомъ, что вода выщелочила изъ нихъ въ $\frac{0}{100}$ отъ первоначальнаго количества:

	Черноземъ	Деград. черн.	Лѣсной с.	Подз. сугл.-суп.
	%	%	%	%
SiO_2	сл.	сл.	—	сл.
CaO	21,07	14,43	3,18	1,88
MgO	12,75	10,94	3,72	2,16
P_2O_5	0,17	0,10	сл.	сл.
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0008	0,0014	сл.	сл.
K_2O	0,057	0,032	0,018	сл.

Прежде чѣмъ заняться разсмотрѣніемъ этихъ цифръ,—

В) Обратимся сначала къ составу тѣхъ растворовъ, которые вытекали изъ почвъ, покрытыхъ разлагающейся растительной массой.

найдено анализомъ 8,09% гумуса). Всѣ полученные разницы можно было бы, конечно, отпестить на счетъ разложившагося за время опытовъ перегноя, (непосредственный анализъ все время показывалъ меньшее количество гумуса въ почвѣ, чѣмъ слѣдовало бы ожидать на основаніи вычисленій), но естественнѣе объяснить ихъ, вѣроятно, погрѣшностью анализова, — особенно принимая во вниманіе характеръ обстановки, въ которой велись описываемые опыты.

Въ 10 литрахъ просочившагося раствора изъ 1 кгг. почвы содержится
(въ гг.)

	Черноземъ	Деградиров. черноз.	Лѣсн. сугл.	Подзол. сугл.-суп.
	гг.	гг.	гг.	гг.
SiO_2	0,9087	0,4077	0,8503	0,1801 (?)
CaO	18,3202	9,2857	2,9470	2,4545
MgO	5,1645	2,7098	1,0447	0,7412
P_2O_5	0,3826	0,2371	0,1462	0,1427
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	16,6044	11,3812	0,6757	0,0397 (?)
K_2O	2,6603	1,2392	0,8020	0,7592
Орган. вещ.	35,0291	50,0017	30,1213	29,0001

Произведя соотвѣтствующія вычисленія, (аналогично тому, какъ мы сдѣлали въ предыдущихъ опытахъ), получаемъ ¹⁾:

	Черноземъ.		Деградир. черн.		Лѣсной сугл.		Подзол. сугл. стп.	
	Сумма веществъ въ растворахъ изъ почвы и листьевъ	Въ растворѣ изъ комбинир. сосуда находится больше на	Сумма.	Въ растворѣ изъ комбинир. сосуда находится больше на	Сумма.	Въ растворѣ изъ комбинир. сосуда находится больше на	Сумма.	Въ растворѣ изъ комбинир. сосуда находится больше на
	гг.	гг.	гг.	гг.	гг.	гг.	гг.	гг.
SiO_2	0,1815	0,7272	0,1815	0,2262	0,1815	0,6688	0,1815	—
CaO	6,3874	11,9328	4,1727	5,1130	2,5531	0,3939	2,3927	0,0618
MgO	1,6670	3,4975	1,2680	1,4418	0,8083	0,2361	0,6810	0,0602
P_2O_5	0,1416	0,2410	0,1398	0,0973	0,1386	0,0076	0,1386	0,0041
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,0424	16,5620	0,0427	11,3385	0,0413	0,6844	0,0413	—
K_2O	0,6748	1,9855	0,6668	0,5724	0,6643	0,1377	0,6623	0,0969
Органич. вещ.	37,1353	—	51,1048	—	32,1745	—	29,7253	—

¹⁾ Составъ раствора, вытекающаго изъ разлагающихся листьевъ дуба, см. предыдущіе опыты.

Комбинированнымъ сосудомъ названъ въ прилагаемой таблицѣ для краткости тотъ сосудъ, въ которомъ находилась почва съ листовымъ покровомъ.

Въ первой графѣ названія каждой почвы приведена сумма веществъ, выведенная изъ сложения количества веществъ, находящихся въ водномъ растворѣ изъ дубовыхъ листьевъ съ количествомъ тѣхъ же веществъ, находящихся въ водномъ растворѣ изъ соотвѣтствующей почвы.

Принимая во вниманіе валовой первоначальный составъ всѣхъ этихъ почвъ (гл. II, стр. 159), мы, въ окончательномъ итогѣ, получаемъ слѣдующее количество различныхъ зольныхъ соединений, потерянныхъ почвами, подъ вліяніемъ растворимыхъ продуктовъ разложенія дубовыхъ листьевъ, въ ‰:

Почва, покрытая листвою, потеряла въ ‰				
	Черноземъ	Деградир. черн.	Лѣсной сугл.	Подзол. сугл.-суп.
SiO_2	0,11	0,03	0,08	?
CaO	62,15	40,26	5,88	2,21
MgO	43,18	24,86	5,03	2,74
P_2O_5	14,17	8,11	1,52	2,05
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	11,83	11,16	0,88	?
K_2O	9,14	4,06	1,23	0,85

Непосредственный анализъ на гумусъ (спос. Густавсона) показали:

	Черноз.	Деград. ч.	Лѣсн. сугл.	Подз. сугл.-суп.
Въ почвѣ, покрытой листвою спустя 5 мѣс. оказалось.	7,71	4,70	2,69	1,91
Въ почвѣ безъ листвен. покрова, подъ вліяніемъ промыванія чистой водою, спустя 5 мѣс. оказалось (см. стр. 257).	8,09	4,24	2,81	1,71
Передъ началомъ опытовъ было (см. стр. 159)	9,89	7,33	3,61	2,12

Прежде чѣмъ дѣлать тѣ или другіе выводы изъ всѣхъ вышеприведенныхъ аналитическихъ данныхъ, необходимо оговориться, что въ виду отсутствія въ литературѣ какихъ-либо аналогичныхъ данныхъ и фактовъ—представляется чрезвычайно труднымъ и рискованнымъ дѣлать какія-либо вполнѣ законченныя и опредѣленныя заключенія въ интересующей насъ области. Особенно затруднительнымъ является провести связь между химическимъ составомъ той или другой почвы и степенью ея деградаціонной, такъ сказать, склопности. Правда, изъ наблюдений, произведенныхъ непосредственно въ природѣ, мы имѣемъ нѣкоторые указанія на то, что, напр., мергелистыя породы оподзоливаются слабѣе породъ, не содержащихъ

CaCO_3 , что объясняется тѣмъ, что именно на CaCO_3 прежде всего направляютъ свое разлагающее дѣйствіе подвижныя перегнойныя кислоты; далѣе, есть основаніе предполагать, что породы, очень богатыя окислами желѣза, также оподзоливаются медленно и слабо. Проф. К. Глинка ¹⁾, въ качествѣ иллюстраціи къ этимъ двумъ положеніямъ, указываетъ на районы развитія верхняго валуннаго мергеля въ Германіи, на лёссовые районы Царства Польскаго, на примѣры слабого сравнительно оподзоливанія красноцвѣтныхъ суглинковъ Псковской губ. и т. п. Но чтобы выяснитъ, даже эти частные вопросы, путемъ экспериментальнымъ, требуется произвести массовые анализы, притомъ — при весьма трудной обстановкѣ самыхъ опытовъ. Я уже указывалъ выше на одинъ факторъ, который можетъ легко затемнитъ получаемые результаты, — это та или другая водопроницающая способность почвъ, обуславливающая собой опредѣленную продолжительность соприкосновенія съ послѣдней подвижныхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ. Далѣе, можно указать на присутствіе въ той или другой почвѣ цѣлаго ряда такихъ моментовъ, которые будутъ то способствовать деградирующей дѣятельности притекающихъ растворовъ, то, наоборотъ, парализовать ее и т. п. Выдѣлитъ всѣ эти моменты и учесть роль cadaго изъ нихъ въ отдѣльности представляетъ собой вопросъ пока чрезвычайной трудности.

Принимая въ соображеніе сдѣланную нами оговорку и возвращаясь теперь къ вышеизложеннымъ анализамъ, мы можемъ, все-таки, на основаніи ихъ, сдѣлать слѣдующія заключенія общаго характера:

1) во всѣхъ взятыхъ для опытовъ типахъ почвъ наблюдаются процессы деградации уже при воздѣйствіи на нихъ чистой воды (при необходимомъ, конечно, условіи — сквозного промыванія и уноса, такимъ образомъ, образующихся продук-

¹⁾ К. Глинка. Почвовѣдніе, 1908, стр. 400.

товъ изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ), т.-е. наблюдаемъ при этомъ обѣднѣніе почвъ гумусомъ и болѣею частью зольныхъ соединений ¹⁾).

А) Что касается потерн почвами, въ этихъ условіяхъ, своихъ перегнойныхъ соединений, то бросается въ глаза сравнительно сильное обѣднѣніе этими веществами деградированнаго чернозема (на 3,09⁰/₀); типичный же черноземъ потерялъ значительно меньше (1,80⁰/₀); весьма малую потерю гумуса наблюдаемъ мы у лѣсного суглинка (0,80⁰/₀) и, наконецъ, еще меньшую у подзолистой суглино-супеси (0,41⁰/₀). Получается такое впечатлѣніе, что черноземная почва, съ точки зрѣнія возможной потери ея части своего перегноя путемъ деградациі, является наиболѣе константнымъ объектомъ; но разъ нарушена эта константность, разъ какія-либо (во всякомъ случаѣ—рѣзкія) внѣшнія условія толкнули этотъ типъ почвы по пути деградациі, послѣдняя проявляться начинаетъ уже быстрыми и энергичными реакціями,—однако до извѣстнаго предѣла, когда тѣ же самыя условія оказываются уже безсильными проявить въ данной почвѣ мало-мальски существенныя измѣненія. Если мы вспомнимъ, что въ концѣ II-ой главы настоящей работы мы приводили доводы въ пользу существованія опредѣленнаго предѣла и „реградационныхъ“ явленій въ почвахъ, т. е., извѣстнаго предѣла насыщенія послѣднихъ гумусомъ,—то нельзя не отмѣтить полной логической связи между двумя подмѣченными фактами. Большой интересъ представляло бы собой изслѣдованіе хода уменьшенія перегнойныхъ веществъ въ томъ или другомъ типѣ почвъ подъ вліяніемъ промыванія водой — по отдѣльнымъ періодамъ времени, а не въ окончательномъ итогѣ, какъ это имѣло мѣсто

¹⁾ Полученные растворы нельзя, конечно, отождествлять съ обыкновенными, практикуемыми въ лабораторіяхъ, водными вытяжками: какъ время соприкосновенія почвы съ водой, такъ и характеръ взаимодѣйствія послѣднихъ другъ съ другомъ здѣсь совершенно иные.

въ нашихъ опытахъ; тогда можно было бы слѣдить и за постепеннымъ ходомъ интересующаго насъ процесса въ каждомъ изъ взятыхъ типовъ почвъ.

В) Что касается потери взятыми почвами своихъ зольныхъ соединений подѣ влияніемъ сквозного промыванія водой, то здѣсь мы наблюдаемъ нѣсколько иную картину, а именно: наибольшее количество выщелачиваемыхъ минеральныхъ соединений приходится на долю чернозема (особенно много CaO и MgO), и чѣмъ съ болѣе „низшимъ“ типомъ мы имѣемъ дѣло, тѣмъ меньшія сравнительно количества этихъ веществъ приходится открывать въ стекающихъ растворахъ. Въ этомъ отношеніи болѣе константными единицами являются, слѣдовательно, „низшіе“ типы почвъ.

Такимъ образомъ, деградационныя явленія въ типичныхъ черноземныхъ почвахъ сказываются, на сколько можно судить по вышеизложеннымъ опытамъ, прежде всего на процессахъ потери ими части минеральныхъ веществъ; что же касается обѣднѣнія ихъ при этомъ перегнойными соединениями, то явленіе это, повидимому, идетъ значительно болѣе медленнымъ темпомъ. Этимъ, быть можетъ, придется объяснить себѣ и упомянутый мною выше фактъ, что при массовыхъ сравнительныхъ анализахъ на гумусъ почвъ изъ подѣ искусственныхъ Велико-Анадольскихъ посадокъ и съ сосѣдней открытой степи—мнѣ не пришлось ни разу встрѣтиться съ явленіемъ обѣднѣнія чернозема гумусомъ.

Въ деградированныхъ же черноземахъ, при наличности внѣшнихъ благоприятныхъ къ тому условій,—обѣднѣніе ихъ перегноемъ и зольными соединениями идетъ, повидимому, одновременно, притомъ сравнительно легко и быстро. Наконецъ, метаморфозъ въ указанномъ смыслѣ лѣсныхъ суглинковъ, а тѣмъ болѣе подзолистыхъ почвъ представляется намъ, на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ, процессомъ въ высшей степени затрудненнымъ и медленнымъ.

2) Если мы обратимъ теперь вниманіе на тѣ измѣненія, которыя произошли во всѣхъ, взятыхъ для опыта, почвахъ подъ вліяніемъ воздѣйствія притекающихъ сверху растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ, то встрѣтимся съ характерными признаками деградациі опять-таки во всѣхъ, взятыхъ для опытовъ, типахъ почвъ. Но при этомъ замѣчаемъ нѣкоторые любопытныя особенности:

А) Зольныя соединенія оказываются вымытыми изъ всѣхъ типовъ почвъ въ большихъ количествахъ, чѣмъ при обработкѣ ихъ чистой водой; при этомъ разница эта тѣмъ существеннѣе, чѣмъ съ болѣе „выспимъ“ типомъ почвы мы имѣемъ дѣло; такъ, въ черноземной почвѣ указанная разница по отношенію почти къ каждому соединенію выражается весьма значительными цифрами; въ деградированномъ черноземѣ она уже значительно меньше; весьма малыми величинами сказывается она въ опытахъ съ лѣснымъ суглинкомъ, и, наконецъ, въ подзолистой суглино-супеси, по отношенію къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ зольнымъ соединеніямъ, разницы этой мы даже и не замѣчаемъ. Конечно, при болѣе продолжительномъ времени операціи промыванія почвы — разница быть можетъ и здѣсь сказала бы болѣе существенными цифрами; но необходимо подчеркнуть, при возможномъ перенесеніи указанныхъ выводовъ въ природу, тотъ фактъ, что, несмотря на сравнительно короткій промежутокъ нашихъ наблюденій (5 мѣсяцевъ), все же въ этихъ опытахъ умышленно введенъ былъ нами рядъ такихъ моментовъ, которые должны были бы, ради наглядности получаемыхъ результатовъ, именно форсировать изучаемые процессы (вспомнимъ, напр., соотношеніе между количествомъ взятой почвы (1 kgr.) и количествомъ растительной массы (200 gr.), или количество воды, примѣненной для промыванія и т. п.); такимъ образомъ, въ природѣ, при естественныхъ условіяхъ, гдѣ соотношеніе между всѣми упомянутыми моментами представляется въ большинствѣ случаевъ совершенно въ иномъ

видѣ, тамъ вообще мы должны, вѣроятно, ожидать, даже по отношенію къ типичнымъ черноземамъ, что деградаціонное дѣйствіе растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ не рѣзко будетъ отличаться отъ соотвѣтствующаго дѣйствія чистой воды.

В) Что касается перегнойныхъ соединений, то во всѣхъ взятыхъ почвахъ мы наблюдаемъ одну и ту же картину: подъ вліяніемъ притекающихъ сверху растворимыхъ продуктовъ разложенія растительныхъ остатковъ почва теряетъ перегноя (при прочихъ равныхъ условіяхъ) столько же, сколько теряетъ она (путемъ разложенія и выщелачиванія) при сквозномъ промываніи ея чистой водой, такъ какъ разница, найденная нами въ обоихъ случаяхъ, отклоняющаяся то въ ту, то въ другую сторону, не выходитъ за предѣлы ошибки анализовъ.

Такимъ образомъ, и изъ этихъ опытовъ мы убѣждаемся, что главное деградаціонное дѣйствіе сказывается подъ вліяніемъ растворимыхъ продуктовъ разложенія, вымываемыхъ въ почву, именно на зольныхъ соединеніяхъ почвы—на эти послѣднія они прежде всего и направляютъ свое растворяющее вліяніе. Что же касается перегноя, то процессъ обѣднѣнія имъ почвы, при описываемыхъ явленіяхъ, какъ бы запаздываетъ и протекаетъ съ той же энергіей и послѣдовательностью, какъ если бы почва промывалась все время лишь чистой водой.

Описанными опытами я заканчиваю изложеніе тѣхъ результатовъ, которые добыты мною при лабораторномъ изученіи какъ характера и свойствъ мертвыхъ растительныхъ остатковъ, такъ и той роли, которую призваны играть въ процессахъ почвообразованія растворимые продукты разложенія этихъ остатковъ.

Конечно, всѣ приведенные выше опыты имѣли своей задачей выяснить, по мѣрѣ возможности, лишь нѣкоторыя отдѣльныя стороны затронутого, весьма обширнаго по своему

содержанію, вопроса и представить лишь общую картину изучаемыхъ, весьма, какъ мы видѣли выше, сложныхъ явленій. Экспериментальная разработка большинства изъ затронутыхъ настоящей работой вопросовъ является въ настоящее время настолько еще незначительной (а чаще она и совсѣмъ отсутствуетъ), что сколько-ниб. исчерпывающій матеріалъ въ интересующей насъ области можетъ быть представленъ еще очень не скоро, притомъ — путемъ, конечно, лишь совмѣстныхъ усилій представителей различныхъ спеціальностей агрономическаго знанія, такъ какъ многія стороны даннаго вопроса требуютъ для себя, какъ мы видѣли выше, не только химическаго но и физиологическаго и бактеріологическаго освѣщенія.

Придерживаясь же намѣченныхъ общихъ рамокъ, мы, резюмируя теперь результаты всѣхъ приведенныхъ выше наблюдений и опытовъ, можемъ сдѣлать пока слѣдующія обобщенія:

1) Мертвые растительные покровы („лѣсная подстилка“, „степной войлокъ“ и т. п.), являясь посредствующимъ звеномъ между атмосферой и почвой, призваны играть весьма важную роль въ ходѣ всѣхъ тѣхъ физическихъ и химико-біологическихъ процессовъ, которыми живутъ дневные горизонты послѣдней.

2) Непосредственное изученіе водныхъ свойствъ различныхъ образцовъ лѣсныхъ подстилокъ и степного войлока (ихъ влагоемкости, водопроводимости, испаряемости и капиллярныхъ явленій) показываетъ, что объекты эти, даже при наличности неблагоприятныхъ внѣшнихъ условій, способствуютъ въ значительной степени сохраненію влаги въ поверхностныхъ горизонтахъ почвы.

3) Ближайшимъ и непосредственнымъ источникомъ переносимыхъ веществъ въ почвѣ являются растворимые въ водѣ продукты разложенія растительныхъ остатковъ.

4) Въ составъ этихъ продуктовъ входятъ между прочимъ

и такіа органическія соединенія, которыя являются неотъемлемой составной частью почвеннаго гумуса, т.-е., гуминовая, креновая и апокреновая кислоты.

5) Энергія и характеръ отщепленія водно-растворимыхъ соединеній изъ разлагающихся растительныхъ остатковъ находится въ прямой и непосредственной связи съ внѣшними условіями t° и увлаженія разлагающагося матеріала:

а) чѣмъ въ болѣе благоприятныхъ условіяхъ находится разлагающійся матеріалъ — тѣмъ меньшее количество отщепляется изъ него растворимыхъ въ водѣ органическихъ соединеній; по отношенію къ соединеніямъ зольнаго характера наблюдается обратная картина;

б) Комбинацію недостаточнаго увлаженія и высокой t° надо признать болѣе благоприятной для процессовъ минерализаціи разлагающихся объектовъ, чѣмъ сочетаніе избыточнаго увлаженія и низкой t° .

6) Энергія и характеръ отщепленія водно-растворимыхъ соединеній изъ разлагающихся растительныхъ остатковъ протекаетъ совершенно различно — въ зависимости отъ того, удаляются ли продукты эти изъ сферы взаимодѣйствія другъ съ другомъ и съ разлагающимся матеріаломъ, или нѣтъ:

а) въ первомъ случаѣ—въ разлагающейся массѣ въ изобиліи накапливаются продукты кислаго характера, угнетающіе дальнѣйшій ходъ процессовъ минерализаціи;

б) во-второмъ случаѣ—процессы распада органическаго вещества протекають, наоборотъ, весьма энергично;

с) явленія эти находятся въ связи со степенью потери разлагающимся объектомъ своихъ (главнымъ образомъ, щелочно-земельныхъ) основаній.

7) Растворимые въ водѣ органическіе продукты разложенія растительныхъ остатковъ могутъ прочно закрѣпляться почвой.

8) Каждый типъ почвы имѣетъ свой „предѣлъ насыщенія“ гумусомъ.

9) Почвы, весьма бѣдныя гумусомъ, а также и наиболѣе богатыя имъ, лишены способности поглощенія и закрѣпленія органическихъ веществъ.

10) „Реградационные“ процессы возможны только у такихъ типовъ почвъ, которые находятся въ болѣе или менѣе близкомъ генетическомъ родствѣ съ черноземомъ.

11) Изученіе процессовъ минерализаціи разлагающагося матеріала по количеству выделяющейся CO_2 часто можетъ вести къ ошибочнымъ заключеніямъ.

12) Ближайшее изученіе явленій минерализаціи разлагающагося матеріала при различныхъ условіяхъ t° , увлаженія и пр., показываетъ, что, параллельно процессамъ отщепленія зольныхъ соединений — въ разлагающейся массѣ могутъ идти одновременно процессы синтетическіе, регенерационные.

13) Наиболѣе рельефные результаты наблюдаются въ указанномъ смыслѣ по отношенію къ P_2O_5 .

14) Причины такого закрѣпленія P_2O_5 при разлагающемся матеріалѣ, главнымъ образомъ, — біологическаго характера.

15) Деградационныя явленія въ почвѣ — вплоть до подзолообразовательныхъ процессовъ, могутъ наблюдаться въ любомъ физико-географическомъ районѣ.

16) Типичныя деградационныя реакціи могутъ вызываться въ почвѣ при продолжительномъ сквозномъ промываніи ея уже чистой водой.

17) Съ этой точки зрѣнія — процессы эти могутъ имѣть мѣсто при такихъ сельско-хозяйственныхъ меліораціяхъ, какъ дренажъ почвъ, или, наоборотъ, ихъ орошеніе и т. п.

18) Степень деградированности почвы находится въ тѣсной зависимости отъ химическаго состава накапливающихся на поверхности послѣдней растительныхъ остатковъ.

M10667

S
593
K1

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

